

DE RIESGO EN RIESGO ME ARRIESGO

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL ITS

Las ITS son un conjunto de afecciones clínicas que se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual. Sin embargo, pueden transmitirse por uso de jeringas contaminadas o por contacto con la sangre o con otras secreciones, también pueden transmitirse desde la madre al hijo durante el embarazo, durante el parto o la lactancia.

COMO PREVENIRLAS

- Tener relaciones sexuales seguras.
- Usar el preservativo.
- Realizarse exámenes de ITS aunque no tenga síntomas.
- Evitar tener relaciones sexuales mientras se encuentra en tratamiento.
- Informar al compañero sentimental que se ha diagnosticado una ITS.

ALGUNAS ITS

SÍFILIS

Causada por una bacteria, se manifiesta en fases. En la primera aparece una úlcera en el lugar por el que ha entrado, aproximadamente a las 3 semanas. No suele doler y puede pasar inadvertida, pero puede transmitir la bacteria por contacto; desaparece por si sola sin dejar cicatriz. En la siguiente fase se pueden dar otros síntomas, el más común son erupciones en tronco, palmas de las manos y los pies, a veces fiebre y malestar general. Las fases tardías pueden ser graves, de ahí la importancia de realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento.

HEPATITIS B

Es una inflamación del hígado que a veces esta producida por virus. En las fases agudas, los síntomas mas comunes son malestar general, vómitos, delgadez, coloración amarilla de la piel y el blanco de los ojos. Puede no presentar síntomas y en la fase aguda la mayoría de las veces se cura sola. Hay 3 tipos: La hepatitis A solo se manifiesta de forma aguda y la hepatitis B y C que pueden hacerse crónicas y dar complicaciones en el futuro. Normalmente se diagnostican con un análisis de sangre.

