



ENTIDAD : CLINICA UROS S.A.S NIT 813011577
FECHA CUMPLIMIENTO : 16/05/2025
ITEM DE LA ORDEN : 3909139
PACIENTE : CC 7707295 - JOSE RICARDO JIMENEZ PEREZ
EDAD PACIENTE : 47 Años
PESO :
SERVICIO : AMBULATORIO
PLAN : EJERCITO ESM BAS09 REG. NEIVA - RESONANCIAS
883522 - RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (PELVIS. RODILLA, PIE Y/O CUELLO DE PIE)
SUBEXAMEN: GENERICO
RESULTADO PATOLOGICO

RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA. Datos Clínicos: Evaluación médica. Técnica: Se realizó resonancia magnética de rodilla izquierda utilizando secuencias ponderadas en T1, T2 y STIR (o equivalente sensible a líquido) en los planos axial, coronal y sagital. HALLAZGOS: En el cuerno posterior del menisco medial se observan imágenes globulares hiperintensas intrasustancia que no contactan con el margen articular ni con la periferia, sin evidencia de fractura. El resto de las porciones del menisco medial y lateral tienen forma, volumen e intensidad de señal normal. Las uniones menisco-capsulares sin alteraciones. Articulación femorotibial congruente con superficies regulares, cartílago de los sitios de carga sin alteraciones. Los tendones del poplíteo, cuádriceps y patelar, así como los ligamentos cruzados y colaterales, muestran tensión, dirección, grosor e intensidad de señal normal. Patela normal con base al índice de Insall-Salvati (1.12), en el plano axial se identifica adecuada congruencia patelofemoral; el cartílago de la patela se visualiza con defecto de espesor completo en el vértice que se extiende en 6 mm en su eje transversal, asocia cambios reactivos subcondrales por presencia de quistes subcondrales de 6 mm. El cartílago de la tróclea sin anomalías. Los retináculos son simétricos. Derrame articular leve sin sinovitis. La grasa de Hoffa y el Cojinete graso subcuadrípital normal. No se observan fracturas ni tumores óseos. Los músculos son de volumen e intensidad de señal habitual. Tejido blando superficial con incremento en la intensidad de la región pretibial. IMPRESION DIAGNOSTICA: Meniscopatía medial grado I. Condrosis patelo femoral grado IV de Outerbridge. Derrame articular leve sin sinovitis. Edema de tejidos blandos de la región pretibial. (El presente informe no constituye un diagnóstico final. Este será emitido por su médico tras la correlación con los hallazgos de este estudio de imagen con la historia clínica integral y, si procedieran, control evolutivo y/o pruebas complementarias adicionales. En caso de discrepancia clínico-radiológica, se aconseja reevaluación de las imágenes tras indicar el problema clínico).

DIAGNOSTICO PROFESIONAL :

Ramon Dario Garavito M.

RAMON DARIO GARAVITO MORALES
RADIOLOGIA

Firmado Electrónicamente.
Imprime: SISTEMAS
Fecha Impresión: 2025-05-19 07:05