ENTIDAD :	**CLINICA UROS S.A.S NIT 813011577**
FECHA CUMPLIMIENTO :	**16/07/2025**
ITEM DE LA ORDEN :	**4217516**
PACIENTE :	**CC 36172700 - LUZ STELLA PARRA CASTILLO**
EDAD PACIENTE :	**63 Años**
PESO :	
SERVICIO :	**AMBULATORIO**
PLAN :	**EJERCITO ESM BAS09 REG. NEIVA - RESONANCIAS**
	883101 - RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO SIMPLE

SUBEXAMEN: GENERICO

RESULTADO PATOLOGICO

INSUMOS USADOS PARA EL ESTUDIO
- 1 CATETER INTRAVENOSO 20
- 1 CONECTOR MICRO
- 1 EXTENSION PARA ANESTESIA ADULTO
- 3 JERINGA 10 CC
- 1 SOLUCION SALINA X 500 ML
- 1 CANULA NASAL ADULTO
- 4 ELECTRODOS ADULTOS PARA RESONANCIA

ESTUDIO REALIZADO BAJO SEDACI?N POR PARTE DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA.
TOTAL 1 HORA DE SEDACION.

RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO SIMPLE BAJO SEDACION

Datos clínicos: Vertigo

Estudios anteriores:No se cuenta con previos

Técnica:

En equipo superconductor de 1.5 T, se realiza estudio multiplanar y se obtienen múltiples secuencias centradas en el cerebro en fase simple bajo sedacion.

Hallazgos:

Se efectuó una resonancia magnética por imágenes del encéfalo, con cortes en los planos de axial, coronal y sagital, secuencias que ponderaron los tiempos de relajación T1 y T2 tisulares,

Los ventrículos laterales, el tercer y cuarto ventrículo son de morfología y topografía conservada.

Las cisternas axiales, basales y silvianas y espacios subaracnoideos de la convexidad son de características normales.

Configuración discretamente amplia del sistema ventricular.

Las cisternas silvianas, peritroncales y los espacios subaracnoideos de la convexidad se presentan

ensanchados.

Signos de leucoaraiosis periventricular

Línea media centrada. Cuerpo calloso presente de morfología conservada.

Ambas formaciones hipocampales se presentan conservada, sin evidencia de cambios de

intensidad de señal.

Se realizó secuencia de Difusión, sin evidenciarse área de restricción al movimiento de las moléculas de agua, descartándose de este modo la presencia de isquemias agudas.

Fosa posterior libre de imágenes agregadas.

Ensanchamiento de los espacios interfoliares a nivel cerebeloso.

Focos glióticos de la sustancia blanca bihemisferica de probable origen microangiopático

Fosa posterior sin imágenes agregadas.

OPINIÓN

Leucoaraiosis periventricular.

Se realizó secuencia de Difusión, sin evidenciarse área de restricción al movimiento de las moléculas de agua, descartándose de este modo la presencia de isquemias agudas.

Focos glióticos de la sustancia blanca bihemisferica de probable origen microangiopático

DIAGNOSTICO PROFESIONAL :



ADRIANA MARCELA MURCIA ESPINOSA
RADIOLOGIA
RM: 53161308