ENTIDAD :	**CLINICA UROS S.A.S NIT 813011577**
FECHA CUMPLIMIENTO :	**20/07/2025**
ITEM DE LA ORDEN :	**4226478**
PACIENTE :	**CC 12280646 - RULBER VALENCIA PERDOMO**
EDAD PACIENTE :	**44 Años**
PESO :	
SERVICIO :	**AMBULATORIO**
PLAN :	**EJERCITO ESM BAS09 REG. NEIVA - RESONANCIAS**

883522 - RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (PELVIS. RODILLA, PIE Y/O CUELLO DE PIE)

SUBEXAMEN: GENERICO
RESULTADO PATOLOGICO

RESONANCIA MAGNÉTICA SIMPLE DEL PIE (ANTEPIE) IZQUIERDO

INDICACIÓN: Masa entre 3 y 4 espacio intercostal

TÉCNICA: En unidad superconductora que opera a 1.5T , se realiza secuencias multiplanares multi secuenciales enfocadas en el pie (antepie).

HALLAZGOS:

Estructuras óseas del retropie: la señal de los demás huesos del retropie se encuentra conservada, sin edema medular o fracturas ocultas con relaciones articulares conservadas

Estructuras óseas del mesopie: sin edema medular o fracturas ocultas con relaciones articulares conservadas

Estructuras óseas del antepie: las cabezas de los metatarsianos se encuentran conservadas sin alteraciones o signos de osteonecrosis temprana, no hay evidencia de fracturas por estrés, las relaciones articulares se encuentran conservadas.

Estructuras ligamentarias: las diferentes estructuras ligamentarias en especial el complejo ligamentario de Lisfranc y Chopart se encuentran conservados.

Tendones: El curso plantar de los tendones flexores y extensores es normal, sin evidencia de tenosinovitis.

Músculos: en el compartimiento medial los vientres musculares del abductor y flexor corto de la hallux, en el compartimiento central de los músculos aductor del hallux, cuadrado plantar y flexor corto de los dedos y en el compartimiento lateral de los músculos flexor corto de los artejos y abductor del quinto artejo demuestran señal y morfología usual, sin reemplazo graso, sin lesiones focales.

Antepié:

En el aspecto dorsal del tercer y cuarto espacio interdigital, se identifica una imagen focal bien delimitada, de contornos lobulados de 28x25x18 mm (APxLxT), que presenta alta señal en secuencias T1, T2 y DP con supresión grasa (FAT SAT). La lesión se localiza entre las cabezas metatarsianas del 3.º y 4.º metatarsianos y presenta efecto de masa desplazando las estructuras adyacentes sin infiltrarlas, sin edema óseo evidente de las estructuras adyacentes.

No se identifican signos de fracturas, alteraciones degenerativas articulares marcadas ni colecciones líquidas francas.

No se observan signos claros de compresión de estructuras neurovasculares, aunque el tamaño y localización de la lesión podrían generar síntomas por efecto de masa.

Leve aumento del liquido en la articulación metatarso sesamoidea del primer dedo.

CONCLUSIÓN:

Imagen focal descrita en antepie parcialmente caracterizada en estudio simple, se sugiere considerar entre los diferenciales hemagioma, lipoma interdigital y neuroma de morton atipico, se sugiere estudio contrastado o ecografia para valorar vascularización.

DIAGNOSTICO PROFESIONAL :

John Campaña

JOHN FREDY CAMPANA DONCEL
RADIOLOGIA
RM: 1130621796

Firmado Eléctronicamente.
Imprime: JENNIFER LIZETH HERRERA CORTES
Fecha Impresión: 2025-08-06 10:08