



ENTIDAD : CLINICA UROS S.A.S NIT 813011577
FECHA CUMPLIMIENTO : 30/07/2025
ITEM DE LA ORDEN : 4285445
PACIENTE : CC 1006523421 - JOHN FREDY VALDERRAMA BARRIOS
EDAD PACIENTE : 38 Años
PESO :
SERVICIO : AMBULATORIO
PLAN : EJERCITO ESM BAS09 REG. NEIVA - RESONANCIAS
883522 - RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (PELVIS. RODILLA, PIE Y/O CUELLO DE PIE)

RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA IZQUIERDA

DATOS CLÍNICOS: GONALGIA.

ESTUDIOS PREVIOS: NO DISPONIBLE.

TÉCNICA: Practicado en planos sagital, axial y coronal secuencias T1, T2 y DP con fat sat.

HALLAZGOS:

Leve derrame articular.

Rótula bien centrada tipo II de Wiberg.

Presencia de cambios posquirúrgicos a nivel femoral distal y tibial proximal en relación a plastia del ligamento cruzado anterior que presenta continuidad de sus fibras.

Presencia de señal heterogénea del cartílago articular a nivel de ambas facetas de la rótula, manifestación de condropatía leve.

Pequeños fenómenos degenerativos y osteofitos a nivel de ambos cóndilos femorales, ambas mesetas tibiales y en la rótula.

Resto de la médula ósea presenta morfología e intensidad de señal habitual.

No hay trazos de fracturas, ni otras lesiones osteocondrales ni contusiones óseas.

Ligamento cruzado posterior tiene estructura fibrilar normal; se realizaron cortes finos angulados sobre el mismo que no evidenciaron lesiones.

Desgarro horizontal del cuerno anterior del menisco externo.

Desgarro complejo del cuerno posterior del menisco interno.

Retináculos patelares, ligamentos colaterales, tendones del cuádriceps y rotuliano, patelar, poplíteo y tendones de la pata de ganso sin evidencia de anormalidad.

Resto del cartílago articular en los tres compartimientos tiene grosor e intensidad de señal normal.

Hiperintensidad de señal a nivel de la grasa de Hoffa.

No se observa distensión anormal de las bursas de la rodilla y los vientres musculares conservan una intensidad de señal satisfactoria.

Partes blandas de la región poplíteo conservadas.

Edema del tejido subcutáneo en el sector anterior de la rodilla.

CONCLUSIÓN

Cambios posquirúrgicos a nivel femoral distal y tibial proximal en relación a plastia del ligamento cruzado anterior con continuidad de sus fibras.

Gonartrosis leve.

Leve derrame articular.

Condropatía focal leve (grado I) a nivel de ambas facetas de la rótula.

Hoffitis.

Desgarro horizontal del cuerno anterior del menisco externo.

Desgarro complejo del cuerno posterior del menisco interno.