ENTIDAD :	**CLINICA UROS S.A.S NIT 813011577**
FECHA CUMPLIMIENTO :	**25/07/2025**
ITEM DE LA ORDEN :	**4258688**
PACIENTE :	**CC 55155746 - LILIAN ESTER VARGAS ROJAS**
EDAD PACIENTE :	**55 Años**
PESO :	
SERVICIO :	**AMBULATORIO**
PLAN :	**EJERCITO ESM BAS09 REG. NEIVA - RESONANCIAS**

883512 - RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (CODO, HOMBRO Y/O PUÑO)

SUBEXAMEN: GENERICO
RESULTADO PATOLOGICO

RESONANCIA MAGNÉTICA DE HOMBRO IZQUIERDO

Información clínica: Sd del manguito rotador.

TÉCNICA:

En unidad superconductora que opera a 1.5T se realiza RM multiplanar y multisencuencial enfocada en el hombro.

HALLAZGOS:

Estudio de adecuada técnica.

MANGUITO DE LOS ROTADORES:

Tendón del supraespinoso: Tendón de calibre normal con focos de alta señal DP que representan tendinopatía, una ruptura focal que compromete la huella inserción en fibras anteriores, de 4 x 6 mm, sin reemplazo graso del vientre muscular.

Tendón del infraespinoso: Tendón de morfología usual, sin rupturas, sin reemplazo graso del vientre muscular.

Tendón del subescapular: Tendón engrosado con aumento de señal en DP por tendinopatía y pequeña ruptura parcial de 3 mm en la huella inserción en las fibras superiores, sin reemplazo graso del vientre muscular.

Tendón del redondo menor: el vientre muscular es normal, el tendón sin evidencia de alteraciones.

TENDÓN DE LA PORCIÓN LARGA DEL BÍCEPS E INTERVALO DE LOS ROTADORES:

Porción horizontal del tendón: En adecuada posición sin rupturas o tendinopatía.

Porción vertical del tendón: sin tenosinovitis.

Intervalo de los rotadores: Normal

LABRUM: En la valoración limitada del labrum , por no contar con medio de contraste intraarticular sin embargo se demuestra aumento difuso de señal del aspecto superior y anterior-medio de la labrum por probable ruptura

ARTICULACIÓN ACROMIO-CLAVICULAR: Con cambios artrósicos moderados.

ARTICULACIÓN GLENOHUMERAL: con relaciones articulares preservadas, adecuado espesor del cartílago articular.

BURSAS Y CÁPSULA ARTICULAR: No se demuestran signos de bursitis ni aumento del líquido en el interior de la cápsula articular

TEJIDOS BLANDOS: Normales

OTROS HALLAZGOS: Ninguno.

CONCEPTO:

Moderada tendinopatía del manguito los rotadores.

Lesión del labrum tipo Bankart.

Cambios artrósicos acromioclaviculares hipertróficos moderados.

DIAGNOSTICO PROFESIONAL :



JAVIER IGNACIO CASTANO QUINTERO
RADIOLOGIA
RM: 1015403826

Firmado Eléctronicamente.
Imprime: MIREYA LOZANO SERRATO
Fecha Impresión: 2025-07-30 01:07

ENTIDAD :	**CLINICA UROS S.A.S NIT 813011577**
FECHA CUMPLIMIENTO :	**25/07/2025**
ITEM DE LA ORDEN :	**4258688**
PACIENTE :	**CC 55155746 - LILIAN ESTER VARGAS ROJAS**
EDAD PACIENTE :	**55 Años**
PESO :	
SERVICIO :	**AMBULATORIO**
PLAN :	**EJERCITO ESM BAS09 REG. NEIVA - RESONANCIAS**

883512 - RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (CODO, HOMBRO Y/O PUÑO)

SUBEXAMEN: GENERICO
RESULTADO PATOLOGICO

RESONANCIA MAGNÉTICA DE HOMBRO IZQUIERDO

Información clínica: Sd del manguito rotador.

TÉCNICA:

En unidad superconductora que opera a 1.5T se realiza RM multiplanar y multisencuencial enfocada en el hombro.

HALLAZGOS:

Estudio de adecuada técnica.

MANGUITO DE LOS ROTADORES:

Tendón del supraespinoso: Tendón de calibre normal con focos de alta señal DP que representan tendinopatía, una ruptura focal que compromete la huella inserción en fibras anteriores, de 4 x 6 mm, sin reemplazo graso del vientre muscular.

Tendón del infraespinoso: Tendón de morfología usual, sin rupturas, sin reemplazo graso del vientre muscular.

Tendón del subescapular: Tendón engrosado con aumento de señal en DP por tendinopatía y pequeña ruptura parcial de 3 mm en la huella inserción en las fibras superiores, sin reemplazo graso del vientre muscular.

Tendón del redondo menor: el vientre muscular es normal, el tendón sin evidencia de alteraciones.

TENDÓN DE LA PORCIÓN LARGA DEL BÍCEPS E INTERVALO DE LOS ROTADORES:

Porción horizontal del tendón: En adecuada posición sin rupturas o tendinopatía.

Porción vertical del tendón: sin tenosinovitis.

Intervalo de los rotadores: Normal

LABRUM: En la valoración limitada del labrum , por no contar con medio de contraste intraarticular sin embargo se demuestra aumento difuso de señal del aspecto superior y anterior-medio de la labrum por probable ruptura

ARTICULACIÓN ACROMIO-CLAVICULAR: Con cambios artrósicos moderados.

ARTICULACIÓN GLENOHUMERAL: con relaciones articulares preservadas, adecuado espesor del cartílago articular.

BURSAS Y CÁPSULA ARTICULAR: No se demuestran signos de bursitis ni aumento del líquido en el interior de la cápsula articular

TEJIDOS BLANDOS: Normales

OTROS HALLAZGOS: Ninguno.


CONCEPTO:

Moderada tendinopatía del manguito los rotadores.

Lesión del labrum tipo Bankart.

Cambios artrósicos acromioclaviculares hipertróficos moderados.

DIAGNOSTICO PROFESIONAL :



JAVIER IGNACIO CASTANO QUINTERO
RADIOLOGIA
RM: 1015403826

Firmado Eléctronicamente.
Imprime: MAYERLY CASTELLANOS RAMIREZ
Fecha Impresión: 2025-07-31 09:07