ENTIDAD :	**CLINICA UROS S.A.S NIT 813011577**
FECHA CUMPLIMIENTO :	**18/06/2025**
ITEM DE LA ORDEN :	**4085285**
PACIENTE :	**CC 36065496 - LEIDY LUCERO MURCIA DIAZ**
EDAD PACIENTE :	**45 Años**
PESO :	
SERVICIO :	**AMBULATORIO**
PLAN :	**EJERCITO ESM BAS09 REG. NEIVA - RESONANCIAS**

883522 - RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (PELVIS. RODILLA, PIE Y/O CUELLO DE PIE)

SUBEXAMEN: GENERICO
RESULTADO PATOLOGICO

RESONANCIA MAGNÉTICA SIMPLE DE RODILLA IZQUIERDA

INDICACIÓN: Sospecha de lesión meniscal.

TÉCNICA: En equipo superconductor de 1.5 T se adquiere estudio multiplanar y se obtienen múltiples secuencias centradas en la rodilla.

HALLAZGOS:

ESTRUCTURAS ÓSEAS / CARTILAGO ARTICULAR

Cambios degenerativos tricompartimentales evidenciados por formación de osteofitos marginales, y edema óseo subcondral, con formación de algunos quistes subcondrales.

Compartimento femorotibial: Disminución del cartílago articular de predominio hacia el aspecto medial de la articulación con edema óseo subcondral en esta localización.

Compartimento patelofemoral: Disminución del cartílago articular con alteración de la señal hacia el vértice rotuliano con edema óseo subcondral escaso en esta localización, en relación a cambios por condromalacia grado IV.

MENISCOS

Menisco medial: Cambios degenerativos generalizados visualizando extrusión meniscal de 3,5 mm con rotura horizontal asociada en el cuerno anterior y rotura meniscal oblicua con contacto con superficie articular del cuerno posterior sin compromiso de la raíz meniscal.

Menisco lateral cambios por degeneración mixoide leves en relación a lesión meniscal grado I.

LIGAMENTOS CRUZADOS

Ligamentos cruzado anterior y posterior íntegros, sin lesiones o rupturas evidentes.

LIGAMENTOS COLATERALES

Ligamento colateral interno integro sin lesiones o rupturas.

Ligamento colateral lateral y estructuras de la esquina posterolateral integras, sin lesiones o rupturas.

MECANISMO EXTENSOR

El tendón del cuádriceps presenta leve aumento de su señal en porción insercional distal sin visualizar roturas en relación a cambios por tendinosis, el tendón rotuliano es de apariencia normal.

LÍQUIDO ARTICULAR

Leve aumento de líquido articular. Bursitis semimembranosa leve.

OTROS HALLAZGOS

La banda iliotibial, el tendón poplíteo y las demás estructuras musculotendinosas periarticulares no presentan alteraciones.

Edema de tejidos blandos de el aspecto lateral e inferior de la rodilla.

Quiste sinovial adyacente al aspecto postero inferior del platillo tibial medial con diámetros de 10 x 11 x 8 mm volumen de 0.45 cc.

CONCLUSIÓN:

Rotura compleja del menisco medial con extrusión meniscal asociada.

Cambios por condropatía importantes femorotibiales y patelofemorales.

Leve aumento de líquido articular asociado a leve bursitis semimembranosa.

Quiste sinovial adyacente al aspecto postero inferior del platillo tibial medial

DIAGNOSTICO PROFESIONAL :

John Campaña

JOHN FREDY CAMPANA DONCEL
RADIOLOGIA
RM: 1130621796