
RECUERDA QUE...

Sí presentas: Tos por más de tres semanas, con moco, sangre, dolor en el pecho, pérdida de peso, pérdida del apetito, sudoraciones en las noches y fiebres...

DEBES ACUDIR AL HOSPITAL

Elaborado por: Katherin Santafé Arce-
Enfermera ejecutora PIC

TEN PRESENTE SIEMPRE QUE UN DIAGNOSTICO A TIEMPO, MEJORA EL PRONOSTICO DEL TRATAMIENTO



Hospital Departamental San Rafael

PREVIENE LA TUBERCULOSIS



TUBERCULOSIS

Enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria que se aloja en los pulmones; esta bacteria es conocida como Mycobacterium Tuberculosis o Bacilo de Koch.



Se debe tener en cuenta que la Tuberculosis aún está presente entre la población mundial. es prevalente y puede afectar a cualquier persona, edad, género o raza.



¿Cómo prevenirlo?

1. La vacuna del BCG, es una de las primeras vacunas que nos aplican en la vida, es una dosis única.

2. Lavado de manos; es esencial para prevenir la Tuberculosis, ya que esta se contagia por microgotas de saliva que pueden sobrevivir hasta 3 hora en medio ambiente cerrado.



¿Cómo prevenirlo?

3. Mantener los espacios ventilados, hace que las microgotas mueran en el ambiente más rápido, lo que hace que sea más difícil el contagio.

4. Al contagiarse por microgotas en el ambiente, el uso del tapabocas es la principal herramienta que nos protege del contagio.

5. En caso de tener un familiar diagnosticado con Tuberculosis, se debe de tener aislamiento preventivo, no compartir objetos personales, evitando así el contagio entre los familiares.

