
Tabla No. 2 Dosificación del Hipoclorito de Sodio (NaClO) en la SDIS

...	Cantidad de agua	Cantidad de desinfectante (5.25%)	Tiempo de acción	Forma de Aplicación
Alimentos (frutas y verduras)	1 litro	1 ml	5 min	Inmersión
Frutas de cascara blanda*	1 litro	1 ml	3 min	Inmersión
Bolsas de leche, bolsas de pulpa de frutas y enlatados	1 litro	1 ml	2 min	Inmersión
Empaques de lácteos	1 litro	1 ml	2 min	Aspersión
Empaques de embutidos	1 litro	1 ml	5 min	Aspersión
Utensilios y equipos	1 litro	3 ml	8 – 10 min	Inmersión - Aspersión
Superficies	1 litro	4 ml	10 – 15 min	Directa – Aspersión
Puntos ecológicos.	1 litro	6ml	10 – 15 min	Directa
Papeleras de baños, contenedores de residuos, canecas, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos y Trampas de grasa	1 litro	8 ml	10 – 15 min	Directa - Aspersion
Paredes, techos y pisos	1 litro	6 ml	10 – 15 min	Directa - Aspersion
Puertas y ventanas	1 litro	3 ml	8 – 10 min	Aspersion – Directa
Malias y anjeos	1 litro	8 ml	10 – 15 min	Inmersión – Aspersion
Baños, area lava colas, implementos de aseo	1 litro	8 ml	10 – 15 min	Directa – Aspersion

Scanned with ACE Scanner



Scanned with ACE Scanner