Outlook

INFORMACION SOLICITADA

Desde Myriam, Gordillo Huertas <M1Gordillo@saludcapital.gov.co>
Fecha Mié 24/09/2025 6:12 AM
Para Gloria Ines, Gallo Tibaduiza <GIGallo@saludcapital.gov.co>

Buen día Dra. Gloria

Cordial saludo

Adjunto información solicitada para fines pertinentes.

Con relación al entorno de las personas con cáncer, si bien la carga genética es relevante en la clasificación de riesgo, variables como la presencia de signos de alarma, edad, comportamientos de consumo o exposiciones ambientales tienen relevancia para la clasificación del riesgo en Cáncer.

Tipo de cáncer	***Población Objeto***	***Signos de alerta***	***Adherente a tamizaje, diagnóstico y tratamiento***	***Comportamientos de consumo y exposiciones ambientales***	***Nivel de riesgo***
Cáncer de cuello uterino	Mujeres sintomáticas	Si	No aplica	No aplica	***Alto***
	Mujeres menores de 25 años con factores de riesgo 25-29 Años 30-65 Años	No	No	Con y sin	Moderado
		No	Si	Si	Bajo
		No	Si	NO	Sin riesgo
Cáncer de mama	Mujeres sintomáticas	Si	No aplica	No aplica	***Alto***
	Mujeres mayores de 40 años Mujeres de 50 a 69 años	No	No	Con y sin	Moderado
		No	Si	Si	Bajo
		No	Si	NO	Sin riesgo
Cáncer de colon y recto	Mujeres y Hombres sintomáticos	Si	No aplica	No aplica	***Alto***

	Mujeres y hombres entre los 50-75 años	No	No	Con y sin	Moderado
		No	Si	Si	Bajo
		No	Si	NO	Sin riesgo
Cáncer de Próstata	Hombres sintomáticos	Si	No aplica	No aplica	***Alto***
		No	No	Con y sin	Moderado
		No	Si	Si	Bajo
		No	Si	NO	Sin riesgo

Conducta según la clasificación del riesgo.

Nivel de riesgo	**Acción clínica**	**Acción preventiva / promocional**
Alto	***Atención medica prioritaria***	***Educación para la salud para lograr adherencia a diagnóstico y tratamiento.***
Moderado	No aplica	Cáncer de cuello uterino: Educación para la salud para fortalecer adherencia a prácticas saludables para reducir el riesgo.
		Cáncer de cuello uterino: Educación para la salud para fortalecer adherencia a pruebas de tamizaje Mujeres menores de 25 años con FR citología vaginal cada 3 años. Mujeres entre los 25-29 años citología vaginal cada 3 años. Mujeres entre los 30-65 años prueba del Virus del Papiloma Humano, cada 5 años)
		Cáncer de mama, colon y recto, próstata: Educación para la salud para fortalecer adherencia a prácticas saludables para reducir el riesgo. Tener en consideración Antecedentes familiares y personales.
		Cáncer de mama: Educación para la salud para fortalecer adherencia a pruebas de tamizaje Mujeres mayores de 40 años Examen Clínico de mama cada año Mujeres entre los 50-69 años mamografía bianual
		Cáncer de colon y recto: Educación para la salud para fortalecer adherencia a pruebas de tamizaje Mujeres y Hombres entre los 50-75 años sangre oculta cada 2 años.
		Cáncer de próstata: Educación para la salud para fortalecer adherencia a pruebas de tamizaje

		Hombres entre los 50-75 años Antígeno Prostático y Tacto rectal cada 5 años.
Bajo	No aplica	Educación para la salud para fortalecer adherencia a prácticas saludables para reducir el riesgo de cáncer.
Sin riesgo	No aplica	Educación para la salud para fortalecer el mantenimiento de las prácticas saludables.

Se recomienda al profesional o técnico preguntar por la presencia de los siguientes signos de alerta:

Signos de alerta Cáncer de Cuello Uterino

Sangrado vaginal anormal (intermenstrual, post menopaúsico, post coital)

Flujo vaginal fétido

Dolor pélvico o en las relaciones sexuales

Signos de alerta para cáncer de mama

Masas o bultos en los senos o axilas

Cambios en la apariencia del pezón, secreción anormal por el pezón

Cambios en la textura de la piel

Signos de alerta para cáncer de Colon y recto

Pérdida de peso.

Sangrado rectal

Materia fecal con sangre.

Masa palpable en abdomen.

Cambios en el hábito intestinal.

Signos de alerta para cáncer de próstata

Dificultad para orinar

Disminución del calibre del chorro

Intermitencia al orinar o sensación de no poder vaciar por completo

Sangre en la orina o en el semen

Dolor al eyacular u orinar

Se recomienda al profesional o técnico preguntar por la presencia de los siguientes signos de alerta:

Comportamientos de Consumo y exposiciones ambientales

Exposición al Virus del papiloma humano (infección persistente por VPH

Enfermedades autoinmunes como VIH (Cáncer de cuello uterino)

Sedentarismo

consumo de tabaco, derivados y vapeadores

consumo de alcohol

Bajo consumo de frutas y verduras.

Alimentos ultra procesados.

Obesidad.

Atenta a comentarios

Myriam Gordillo Huertas

Referente Cáncer

Subdirección Determinantes en Salud