ACTA N°

FECHA: Bogotá, 14 de agosto del 2025

HORA: 7:40 a.m. - 8:00 a.m.

LUGAR: Jardín Infantil FANA

TEMA: Consejería de la SAFL "Riesgos del uso del biberón y chupo de entretención"

ASISTENTES: profesional en atención a la primera infancia y madre de familia.

ORDEN DEL DÍA:

Bienvenida.

Consejería

DESARROLLO:

Siendo las 7:40 a.m. se inicia la consejería a al señor Erika Patricia Torres Roncancio en donde se le brinda orientaciones en cuanto a los riesgos del uso del biberón y chupo de entretención, para lo cual se inicia hablando con ella acerca de la rutina de ella con los niños en casa, lo hábitos alimenticios que practica y por qué aun le brinda tetero a su hijo, al escuchar lo que la mama manifiesta se le dan la siguiente información:

El uso prolongado del biberón puede conllevar riesgos como

Caries del biberón:

El contacto prolongado de los dientes con líquidos azucarados presentes en el biberón puede llevar a la formación de caries.

Dificultad en la lactancia materna:

El uso del biberón puede interferir con el agarre adecuado al pecho materno, especialmente en recién nacidos, dificultando la lactancia materna exclusiva.

Problemas en el desarrollo del habla:

Powered by CamScanner

La succión prolongada del biberón puede afectar el desarrollo de los músculos de la boca y la lengua, lo que a su vez puede influir en el desarrollo del habla.

Maloclusiones dentales:

El uso prolongado del biberón puede causar problemas de alineación dental y malformaciones en el paladar.

Otitis media:

El uso del biberón se ha asociado con un mayor riesgo de otitis media aguda, especialmente en niños con infecciones respiratorias.

Retraso en el habla:

La succión prolongada del biberón puede impedir los movimientos naturales de la lengua necesarios para el habla, retrasando su desarrollo.

Infecciones orales:

El biberón puede favorecer la aparición de infecciones orales, como la candidiasis oral y se le brindar la s siguientes opciones para que se practiquen en casa como los son:

Retiro del biberón: ofreciendo alternativas como vasos o tazas con boquilla.

Continuar ofreciendo lactancia materna como opción de apego y vinculo

Se le ofrece a ala señora Erika un folleto informativo.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Continuar el acompañamiento mediante consejerías y accesoriamente en la SAFL a los padres, madres y cuidadores de caminadores 3.	Profesionales en atención en primera infancia	Permanentemente

Powered by CamScanner

Consecuencias del uso prolongado de chupete y biberón

INFECCIONES DEL OÍDO

Loss menores que utilizan mucho el chupete suelen acostumbrarse a respirar por la boca La nariz cuenta con membranas y mucosa que filtran elementos. Al respirar por la boca, esto no sucede, pudiendo ocasionar infecciones


CARIES DENTALES


Si el menor ya cuenta con sus primeros dientes de leche, la continua exposición a la lactosa puede crear un ambiente adecuada para la multiplicación de bacterias, teniendo un riesgo mayor a contraer caries.

DIFUCLTAD DE HABLA

El menor puede sufrir dificultades al realizar y dominar los movimientos de su lengua a ocasio del uso excesivo del chupete. Esto traerá consecuencias al momento de pronunciar las palabras.







Powered by CamScanner


En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Elizabeth Jiz	Madre.	J. Jfana	Elizabeth J.

Anexos: folleto

Elaboró: Mónica Mendivelso

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner