De 2 meses a 5 años:

✓ Fiebre mayor de 38,5°C por más de 3 días.
✓ Sigue decaído después de que baja la fiebre.
✓ Respiración acelerada o con hundimiento de costillas.
✓ Sonidos en el pecho al respirar.
✓ No tolera alimentos o vomita todo.
✓ Somnolencia o dificultad para despertar.
✓ Convulsiones o ataques.
✓ Secreción o mal olor en los oídos.
✓ Color azulado en labios o cara.





Mayores de 5 años:

✓ Asfixia o dificultad para respirar.
✓ Dolor en el pecho al toser o respirar.
✓ Cansancio o decaimiento extremo.
✓ Fiebre mayor de 38,5°C por más de 3 días.
✓ Flema amarilla o con sangre.
✓ Color azulado en labios o cara.
✓ Incapacidad para mantenerse despierto.
✓ Convulsiones o ataques.

¡Actúa a tiempo!

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas
Gobierno de CALDAS

TOSFERINA

¡PREVENCIÓN Y ALERTA!

¿QUÉ ES?

Es una **enfermedad respiratoria** muy contagiosa que afecta especialmente a bebés y niños pequeños. Puede ser grave si **no se detecta a tiempo.**



¿CÓMO SE CONTAGIA?

Se transmite por el **aire a través de la tos o estornudos.** Los adultos pueden contagiarla a los bebés sin síntomas evidentes.

Se transmite por el **aire a través de la tos o estornudos.** Los adultos pueden contagiarla a los bebés sin síntomas evidentes.

¡La mejor prevención es la vacunación!



VACUNACIÓN

Bebés: Vacunas a los 2, 4 y 6 meses + refuerzos.

Embarazadas: Una dosis en cada embarazo.

Cuidadores y familiares cercanos a bebés: Refuerzo para evitar contagio.

Higiene: Lavado frecuente de manos y uso de tapabocas si hay síntomas.



SIGNOS DE ALARMA

¡Consulta al médico de inmediato!

Si identificas al menos uno de los siguientes síntomas:

Menores de 2 meses:

- ✓ Respiración acelerada.
- ✓ Disminución del apetito.
- ✓ Fiebre, aunque sea una sola vez.
- ✓ Sonidos en el pecho al respirar.
- ✓ Somnolencia o dificultad para despertar.
- ✓ Convulsiones o ataques.
- ✓ Color azulado en labios o cara.

