Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE
HSJ
AGUADAS - CALDAS
La calidad de un buen servicio al alcance de sus manos

LINEA: SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES

PIC DEPARTAMENTAL 2025
ENFERMERO
CARLOS VALENCIA

Reconozca las señales de gravedad





Práctica 16. Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

Conversemos:

¿Qué signos de alarma nos indican que debemos llevar de inmediato al niño al servicio de urgencias?

Lleve de inmediato al niño al servicio de salud si presenta uno o varios de los siguientes signos generales de peligro: no pueden mamar o tomar líquidos, vomita todo, tiene convulsiones, está como dormido y no puede despertar.

Señales de gravedad en recién nacidos:

- Letárgico o inconsciente
- No se ve bien
- Tiene convulsiones y temblores o se mueve menos de lo normal
- No puede tomar el pecho
- Vomita todo
- Tiene hipotermia (piel muy fría)
- Tiene fiebre
- Está muy pálido
- Hace ruido al respirar
- Hay presencia de sangre en heces
- Fontanela o mollera hundida
- Secreción purulenta por ojos, oídos o el ombligo

Señales de gravedad en mujeres embarazadas

- Presión arterial alta
- Presencia de contracciones
- Fiebre y vómito constante
- Palidez extrema
- Hinchazón en cara manos y/o piernas
- Si tiene hemorragia vaginal
- Disminución o ausencia de movimientos fetales

Continúa

Reconozca las señales de gravedad





Práctica 16. Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

Señales de gravedad en el niño menor de dos meses:

- No puede beber o tomar el pecho
- No se ve bien
- Tiene dificultad para respirar
- Presenta sangre en las heces
- Tiene fiebre o hipotermia
- Tiene vómito persistente

Señales de gravedad en el niño con infección respiratoria:

- Respiración rápida: dificultad para respirar o falta de aire
- Ruidos en el pecho
- Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar

Señales de gravedad en el niño con enfermedad diarreica:

- Ojos hundidos
- Fontanela o mollera hundida
- Boca seca o mucha sed
- Al pellizcar la piel en la zona abdominal, demora en recuperar su posición normal

Señales de gravedad en el niño con fiebre:

- Fiebre prolongada, de cinco días o más, que no cede al tratamiento
- Rigidez de nuca: no puede doblar el cuello
- Manifestaciones de sangrado: puntos rojos en la piel, sangrado por las encías, la nariz, las heces o en los vómitos.
- Brote generalizado en la piel: manchas en la cara, el cuello o todo el cuerpo, acompañadas o no de tos o enrojecimiento de los ojos.

Señales de peligro del oído



Señales de peligro con anemia



Práctica 16. Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

Señales de gravedad en el niño enfermo del oído:

- Dolor intenso que no cede al tratamiento
- Presencia de supuración por el oído
- Masa dolorosa detrás de la oreja

Señales de gravedad en el niño con desnutrición y anemia:

- Pérdida importante de peso
- Hinchazón de los pies o de la barriga
- Palidez generalizada, más evidente en las palmas de las manos o en los párpados inferiores

¿Qué aprendimos?

¿Cuáles son los principales signos de peligro de muerte cuando un niño está enfermo?



Si se presenta alguna de estas señales de gravedad, acuda inmediatamente a la institución de salud más cercana.

¿Conoces los signos y síntomas del cáncer infantil?



Aprendamos juntos


La detección temprana aumenta las posibilidades de salvar la vida de muchos niños.

OPS | OPS 120 Aniversario | Childhood Cancer International LATAM | St. Jude Children's Research Hospital | Juntos

¿El niño presenta alguna de estas señales?

Podría ser un signo o síntoma de cáncer infantil. Converse con sus padres para que sea atendido por el equipo de salud de inmediato.

#1



Sangrado repentino o persistente en nariz o encías

#2



Reflejo blanco en la pupila

#3



Ganglios abultados en cuello, axilas o ingle

#4




Aumento de volumen del abdomen

#5



Aumento de volumen o tumoración en cualquier parte del cuerpo

#6



Puntos rojos o moretones en la piel sin explicación

#7



Palidez de piel y mucosas

#8



Fiebre persistente o recurrente que no ceda a tratamientos comunes

#9



Dolor de cabeza, asociado a mareos y vómitos

#10



Dolor de huesos y articulaciones

¡Juntos podemos detectarlo a tiempo!

OPS
Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Américas

OPS 120 ANIVERSARIO

Childhood Cancer International LATAM

St. Jude Children's Research Hospital

Juntas

La importancia de la observación para una detección temprana

¿Qué debemos identificar?

1. Mancha blanca en el ojo



2. Petequias o puntos rojos en el cuerpo



3. Palidez marcada





OPS | OPS 120 Aniversario | Childhood Cancer International LATAM | St. Jude Children's Research Hospital | Juntas

Aprendiendo sobre Signos y síntomas del cáncer infantil

¿Qué buscamos durante la palpación?

1. Bolitas en el cuello, axilas o ingle
2. Bulto en alguna parte de la barriga
3. Hinchazón en alguna otra área del cuerpo





OPS | OPS 120 Aniversario | Childhood Cancer International LATAM | St. Jude Children's Research Hospital | Juntos

¡Escucha con atención!

A lo que el niño o la niña expresa

Detrás de palabras o actitudes, podría esconderse un tipo de cáncer infantil que necesita atención inmediata.



OPS | OPS 120 Aniversario | Childhood Cancer International LATAM | St. Jude Children's Research Hospital | Juntas

MUCHAS GRACIAS

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE
HSJ
AGUADAS - CALDAS
La calidad de un buen servicio al alcance de sus manos