


salud Colsubsidio

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIT 860.007.336-1

COLSUBSIDIO NIT 860007336-1

Consecutivo:	0003367115				
Nombre del Paciente	LILIANA CONCEPCION ZARATE PAJA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	57429766
Fecha de nacimiento	16/10/1970	Edad atención	55 años 0 meses	Sexo	Femenino
Episodio	93745188	Asegurador	FAM COLS FONTIBON	Categoría	A
Tipo de vinculación	RCT: Cotizante	Lugar de atención	CL OFTALMOLOGICA		
Fecha de impresión:	10/11/2025				

Incapacidad Médica

Hra Ingreso a Consulta: 13:20 — Fecha Ingreso a Consulta: 06/11/2025 — Clse Incapacidad: Enfermedad General

Modalidad de atención: Ambulatoria — Tipo incapacidad: Inicial

Fecha de Egreso: 10/11/2025 — Procedimiento Estético: NO

Días de Incapacidad: 15 QUINCE — Fecha Inicio Incapacidad: 10/11/2025 — Fecha Fin Incapacidad: 24/11/2025


Diagnóstico Principal: H251

Observaciones:

Firma del prestador:

Responsable: GODIN, FERNANDO — Número de identificación: 1102812432 — Especialidad: CORNEOLOGO

Vigilado Supersalud



Colsubsidio

DR. FERNANDO GODÍN - CÓRNEA-CATARATA
CIRUGÍA REFRACTIVA

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS POST-OPERATORIOS IMPORTANTES

- Debe aplicarse las gotas estrictamente formuladas **en el horario indicado Y CON UN ADECUADO LAVADO DE LA MANOS DE LA PERSONA QUE APLICA LAS GOTAS.**
- Puede tocarse ojo operado pero **No frotarse fuertemente**.
- Debe asistir a los controles ordenados **(llevar la medicación indicada).**
- No usar ningún cosmético (delineador o pestañina) durante las primeras dos (2) semanas.
- Usar gafas protectoras de sol durante la primera semana cuando salga a la calle.
- Evitar el sol, la piscina, sauna o baños turcos durante los primeros 15 días.
- Evitar golpes en los ojos y levantar objetos pesados.
- Evitar ambientes en los que haya mucho polvo, humo o contaminación.
- Evitar contacto con fogón y preparación de alimentos por dos (2) semanas.
- No realice ejercicios fuertes.

QUE PUEDE HACER:

- Ver televisión.
- Puede leer.
- Utilizar el computador.
- Comer normalmente.
- Puede subir escaleras y caminar.
- Puede lavarse la cara y cabeza pero procure que no le caiga jabón dentro del ojo.
- **Es probable que se sienta tentado a hacer más pero tómeselo con calma, lo acaban de operar.**

ES NORMAL QUE:

- Tenga picor, sensación de quemazón o de arenilla en el ojo.
- Tenga lagrimeo.
- Tenga la pupila dilatada.
- Puede notar visión de halos alrededor de las luces y visión borrosa.
- Lo habitual es que se necesiten de 4 a 8 semanas para la recuperación total del ojo intervenido, su visión irá mejorando cada día más.
- Después de aprox. En 1 mes se le formularán gafas (según sea su caso).

DEBE NOTIFICARNOS DE INMEDIATO:

- Si tiene mucho dolor
- Si presenta pérdida repentina de la visión
- Secreción ocular abundante