NEWCASTLE-BRONQUITIS INFECCIOSA®

*B1-Mass-Conn

Descripción

Vacuna a virus vivo para la prevención de las Enfermedades de Newcastle y la Bronquitis Infecciosa* de las aves.



POLLOS DE ENGORDE



AVES REPRODUCTORAS



POLLAS DE REEMPLAZO





Composición

Virus activo de la Enfermedad de Newcastle, cepa B1 tipo B1.
Virus activo de la Bronquitis Infecciosa cepas tipo Massachusetts y Connecticut.
Originada en cultivo celulares de embrión de pollo Libres de Patógenos Específicos (SPF).

Administración y dosis

Para ser aplicada por metodos masivos o individuales en la membrana del ala una vez reconstituida con el diluente a base de glicerina.

Masivos

Aspersión

- Abra y mezcle el contenido del frasco al momento de la vacunación.
- Utilice un equipo especialmente diseñado para vacunar SoloVac® o UlvaVac® (solicite el manual del equipo).
- Utilice agua desmineralizada.
- Siga las instrucciones de uso del equipo proporcionadas por Boehringer Ingelheim.

Água de Bebida

- Elimine la administración de medicamentos o desinfectantes en el agua de bebida por lo menos 72 horas antes de la vacunación.

Individuales

Gota Ocular

- Se requiere de un diluente de agua tri-destilada en volumen suficiente a razón de 0.03 ml por ave (no incluido con la vacuna).

Almacenamiento

Mantener en refrigeración de 2 a 7°C, protegida de la luz solar. No congelar.

Presentación

Frascos 50 x 1,000 dosis / 50 x 2,000 dosis / 25 x 5,000 dosis / 10 x 15,000 dosis.

Consulte al Médico Veterinario.

Boehringer Ingelheim ® 2019

Boehringer Ingelheim