FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Wescohex 270
Solución antiséptica

DESCRIPCIÓN GENERAL

Solución antiséptica que combina la rápida acción del alcohol y el efecto residual de la clorhexidina para prevenir de manera eficaz las infecciones de sitio operatorio y asociadas al uso de dispositivo venoso.

REGISTRO Y VIGENCIA

Colombia: INVIMA2019M-0013544-R1

ASPECTO

Liquido traslúcido naranja, con ausencia de partículas suspendidas

COMPOSICIÓN

Gluconato de clorhexidina.....2%
Alcohol etílico..... .....70%

MECANISMO DE ACCION

La clorhexidina genera disrupción en la membrana y precipitación del contenido celular.

PROPIEDADES ANTIBACTERIALES

Microorganismo	Tiempo de contacto	Reducción
Staphylococcus aureus (ATCC6538)	30 seg	99.9%
Escherichia coli (ATCC8739)		
Pseudomonas aeruginosa (ATCC15442)		
Candida albicans (ATCC 10231)		
Salmonella tiphymurium (ATCC14028)		

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Efectiva contra bacterias.
- Combina la rápida acción del alcohol y el efecto residual de la clorhexidina.
- Garantiza la asepsia de la piel sin necesidad de lavado previo.
- Lavado quirúrgico.

MODO DE USO

1. Delimite el área a tratar con el antiséptico.
2. Aplique la solución usando una técnica adecuada
3. Garantice un tiempo de aplicación entre 2 y 3 minutos dependiendo de las condiciones de la piel a intervenir.

Para tener en cuenta:
- Considerar si se requiere lavado prequirúrgico

Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
La Estrella, Antioquia

FICHA TÉCNICA

- Para secciones quirúrgicas secas (por ejemplo, abdomen o brazo): emplee una técnica adecuada durante mínimo 2 minutos.
- Para intervenciones quirúrgicas en zonas húmedas (p. Ej., Pliegue inguinal): emplee una técnica adecuada durante 3 minutos.
- Reduzca el vello en la zona a intervenir antes de usar el producto.
- Para reducir el riesgo de quemadura se debe esperar que la piel este completamente seca. Se recomienda un tiempo de espera de 3 minutos para piel sin vello y para áreas con vello asegurarse que el área este completamente seca.
- Mientras la solución no se seque por completo no se debe cubrir la piel con el campo quirúrgico ni se debe usar una fuente de ignición (por ejemplo, cauterio, láser).
- No se debe soplar la piel porque se puede retirar la solución o generar una contaminación del área.
- Para evitar el riesgo de ignición, se deben retirar los materiales que se encuentren humedecidos con la solución del área de preparación y reemplazarlos de ser necesario.

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.
- No fumar.

Para más información, remítase a la ficha de seguridad (FDS) o solicite asesoría de nuestros Representantes Técnico- Comerciales

PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto, si la irritación persiste consultar con el médico.

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

- El producto debe permanecer dentro de su envase original, cerrado y a una temperatura no mayor de 30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el producto, rasgue la etiqueta, y deseche en el contenedor asignado.

- No descargue el producto en afluentes, lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, a menos que se cumpla con los requisitos de los sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.

VIDA ÚTIL

2 años

PRESENTACIONES

Envase (60 mL, 120 mL, 500 mL)

PARTIDA ARANCELARIA

30.04.90.29.00

Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
La Estrella, Antioquia