# CÓMO RECIBIR BIEN A LOS POLLITOS DE UN DÍA EN SU NUEVO HOGAR

***Antes de que los pollitos bebé lleguen a su nueva casa, el avicultor debe realizar varias acciones para que las condiciones de bioseguridad sean óptimas.***

***Para reducir el riesgo de cualquier inconveniente a nivel biológico, los expertos en manejo de aves recomiendan algunas medidas de seguridad como:***

- ***- Tener el galpón y los equipos listos.***
- ***- Realizar una desinfección del galpón 24 horas antes de que lleguen los pollitos.***
- ***- Tener los bebederos con agua, los comederos con balanceado y las criadoras prendidas por lo menos con dos horas de anticipación (en condiciones de clima frio).***
- ***- Para recibir 1.000 pollitos, mínimo se necesita: 6 bebederos de campana, 6 bebederos de galón, 12 comederos de bandeja y cubrir con papel por lo menos el 25% del área de recepción.***
- ***- La temperatura debe estar alrededor de 33°C.***
- ***Llevar a los pollitos al galpón lo más rápido posible = HIDRATAR***
- ***- Recibir a los pollitos con Avisol o Min aviar en el agua (Vitaminas más electrolitos).***

***Como se trata de animales que apenas tienen un día de nacidos, no existen condiciones mínimas de salubridad ya que cualquier falla repercutirá en el desempeño del lote.***

***Sin embargo, es evidente que uno de los factores que más se debe cuidar es la correcta desinfección del lugar para evitar cualquier contaminación provocada por las aves que ocuparon el galpón anteriormente. Por eso, muchos avicultores suelen, literalmente, quemar el suelo. Es decir, después de que los animales se hayan ido, hay que pasar un soplete por el suelo para quemar la cascarilla remanente, plumas, y, de paso, matar virus y bacterias.***
***Otras consideraciones que se debe tomar en cuenta para preparar el galpón son:***

- ***- Sacar todas las aves del lote anterior.***
- ***- Quemar las plumas que quedan dentro del galpón.***
- ***- Evacuar el abono.***
- ***- Hacer un lavado interno y externo del galpón, en lo posible con agua a presión.***
- ***- Jabonar las paredes, techos y pisos del galpón con Bio gel o algún yodado.***
- ***- Enjuagar el galpón con agua pura.***
- ***- Hacer la primera desinfección con CID 20 Amonio cuaternario(Sodio, Hidrogeno, Azufre y Oxigeno): 2.5 / Lt. Agua o Hipoclorito de sodio.***

- ***- Lavar y desinfectar todo el equipo por separado.***
- ***- Armar el galpón (comederos, bebederos, criadoras, cortinas, etc.)***
- ***- Hacer una nueva desinfección con CID 20 un día antes de la llegada de los pollitos.***
- ***- Cerrar el galpón hasta la llegada de los pollitos.***
- ***- Hacer control de moscas y roedores.***

  ***Una vez que esté preparado el galpón, uno de los factores más importantes que no se debe perder de vista es la hidratación, que no por nada es considerado un factor crítico en el recibimiento de los pollitos. Se debe tener en cuenta que estas aves han sido transportadas durante varias horas en medio de diversos climas, lo que puede ocasionar que se deshidraten.***

  ***Un animal que no se hidrata, es un animal que tiene los días contados.***

  ***Cuando los pollitos llegan, lo mejor es bajarlos lo más rápido del camión hacia el galpón. Se tiene que considerar que la densidad óptima para la crianza de aves es de 8 a 10 por metro cuadrado.***

  ***BIOSEGURIDAD***
- ***- Manejar un esquema todo dentro, todo fuera.***
- ***- No tener aves de traspatio.***
- ***- No permitir el ingreso a la granja a personas extrañas.***
- ***- Desinfectar los vehículos que ingresan a la granja con CID 20.***
- ***- Utilizar desinfectante (CID 20) en los pediluvios a las entradas de los galpones.***
- ***- Realizar controles periódicos de roedores y moscas.***
- ***- Hacer vacíos sanitaros entre lote y lote de por lo menos 15 días.***
- ***- Hacer monitoreo constantemente de las aves.***
- ***- Mantener limpia toda la granja.***

***GRACIAS:***

***PROFESOR: EDUARDO AVILA MIRANDA***
***Instructor Pecuario SENA, Programa SER***
***Centro Agro empresarial y Acuícola, Riohacha.***
***Celular 3118000558***