

INMUNIDAD:

VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

Indicaciones

Está indicada para la inmunización activa contra la enfermedad de Newcastle en aves domésticas desde la primera semana de edad.

Fórmula

Virus activo de Newcastle Cepa La Sota

Dosis y vía de administración

Vía ocular, nasal y oral. Administrar 1 gota por ave. Para vacunar por vía ocular o nasal, reconstituya la pastilla con el diluyente adjunto y aplique una gota en el ojo o en el orificio nasal.

Vía oral. Para dosificar en agua de bebida mezcle la pastilla con el diluyente adjunto, una vez reconstituido diluya en el agua de bebida el volumen de vacuna que corresponda de acuerdo al número de aves a inmunizar. Agregar 2.5 g de leche descremada en polvo por cada litro de agua para estabilizar la solución. Utilizar siempre agua limpia y fresca, los recipientes deben estar limpios (no usar desinfectantes). Se recomienda restringir el agua de bebida previa vacunación para garantizar el consumo total de la solución.

Presentaciones

25 dosis (1 mL), 50 dosis (2 mL), 100 dosis (4 mL) y 1000 dosis (40 mL).

Precauciones

Una vez reconstituido el producto debe utilizarse inmediatamente todo el contenido.

El manejo o administración inadecuada puede causar modificaciones en los resultados esperados.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

NEWCASTLE B1: Vacuna a virus vivo indicada contra los signos clínicos causados por el virus de la Enfermedad de Newcastle, de uso en aves



COMPOSICION: Virus de la Enfermedad de Newcastle: Tipo B1, cepa B1. Estabilizador.

INDICACIONES: A Está indicada para la inmunización activa contra la enfermedad de Newcastle en aves domésticas.

DOSIS- VIA ADMINISTRACION:

Administración intranasal o intraocular: se recomienda para pollos de un día de edad o mayores. Restaurar 1.000 dosis del liofilizado con 30 mL de diluyente. Administrar una gota (0,03 ml) por ave.
En el agua de bebida: Para aves de 2 a 8 semanas de edad o mayores, diluir 1.000 dosis del producto en 9,5-19 litros de agua de bebida. Para aves de más de 8 semanas de edad, diluir 1.000 dosis del producto en 19-38 litros de agua de bebida.
Administración por aspersión: Utilizar 1.000 dosis para 1.000 aves solamente para revacunación a pollos desde las 4 semanas de edad.

ADVERTENCIA: Conservar entre 2 y 7ºC Leer bien el prospecto antes de utilizar siguiendo las instrucciones según la cantidad de aves a vacunar y vía de administración.
Como con todo medicamento, mantener fuera del alcance de los niños. No vacunar 21 días antes del sacrificio de las aves destinadas a consumo humano.

PRESENTACION: Frascos con 1.000, 2500, 5000 y 10000 dosis, presentado en forma liofilizada.