MEDICAMENTOS DE APOYO EN LA EXPLOTACION DE POLLOS ENGORDE



1. QUINOCALF ORAL 10% (ENROFLOXACINA)

DEFINICION: Antimicrobiano y Antimicoplásmico de amplio espectro.

INDICACIONES: En AVES (pollos de engorde, pollitas, pollonas y pavos) para el tratamiento y control de infecciones producidas por Bacterias Gram -, Gram + y Mycoplasmas.

DOSIFICACIÓN: Se emplea a la dosis de 10 mg/kg vía oral en el agua de bebida durante 3 -5 días. En la práctica: 1ml para 2 L de agua, 100 ml para 200 L de agua. Esto equivale a administrar 50 ppm. en dilución.

PRECAUCIÓN: Las aves tratadas no deben darse para consumo humano hasta 7 días después de finalizado el tratamiento.

PRESENTACIONES: Frasco x 1.000 mL o frasco gotero x 10 mL



2. MINAVIAR ANTIESTRES

USO TERAPÉUTICO: MULTIVITAMINICO- MINERAL.

PRINCIPIO ACTIVO: VITAMINA A, D, K3, K, C, B2, B12, CLORURO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO.

Especies:

INDICACIONES: Estrés por condiciones ambientales incorrectas: luz, temperatura y humedad inadecuadas dan origen al síndrome de adaptación que eleva las necesidades de vitaminas y electrolitos. Estrés por manejo de los animales en el plantel, en prácticas como despique y

vacunaciones. Estrés nutricional por deficiencia en la cantidad y regularidad del alimento y del agua, o por la calidad de los mismos. Estrés por condiciones patológicas infecciosas, parasitarias y metabólicas.

***DOSIS**: 100 g de Minaviar Antiestrés en 100 litros de agua de bebida.*

- ***MODO DE APLICACIÓN**: Polvo soluble*
- ***PRESENTACIÓN**: Caja por 40 sobres por 25 g. Sobres de 100 g.*



3. COMPLELAND B12 ORAL

USO TERAPÉUTICO: VITAMINICO MINERAL.

PRINCIPIO ACTIVO: VITAMINA B1, B2, B3, B5, B6, B12, BIOTINA, ACIDO PANTOTENICO, CALCIO.

ESPECIES:



INDICACIONES: sus componentes *constituyen importante factor de crecimiento. Su deficiencia se relaciona con anorexia, ulceración y necrosis intestinal, diarreas sanguinolentas, degeneración de la mielina de los nervios periféricos, crecimiento lento, incoordinación. Su deficiencia en aves ocasiona también retardo en el desarrollo del plumaje, dermatitis en las comisuras del pico, alrededor de párpados, en la cloaca y en las patas; en gallinas se presenta disminución en la incubabilidad de los huevos y los pollos de un día muestran mortalidades tempranas. Compleland*B12 ejerce también acción hidratante. Los glicerofosfatos de Calcio, Sodio, Potasio y Manganeso presentes en la fórmula de Compleland*B12 tienen propiedades Neurotónicas y constituyen fuentes de Calcio y Fósforo, factores que mejoran la conversión alimenticia, promueven el consumo de agua y ayudan a combatir el estrés presente en enfermedades de diversa etiología.*

***DOSIS**: Aves: 15 a 20 mL por litro de agua de bebida. En todos los casos el tratamiento deberá mantenerse durante 3 a 5 días, sin embargo, la dosis y la frecuencia pueden variar a criterio del Médico Veterinario según las necesidades de los animales y las fuentes de alimentación.*

***MODO DE APLICACIÓN**: Suspensión oral*

***PRESENTACIÓN**: Frasco inyectable por 100 mL, 1000 mL y 4.000 mL.*