OSPIROSIS

edad infecciosa bacteriana de
co, trasmitida a los humanos
contaminada de animales
silvestres, principalmente
ás común en zonas de climas
dos con altos índices de lluvia.

cto directo de piel lesionada o
on la orina y/o tejidos de
ectados.
cto con fuentes de agua, suelos
contaminados con orina de
ectados con leptospira.
sumo de agua y alimentos
os.

ía en humanos:

neral, fiebre y escalofríos.
beza y muscular.
arrea.

l y ojos amarillentos).




Principales síntomas en los animales:

En bovinos, ovejas, cabras, y cerdos puede producir fiebre y problemas reproductivos (abortos); en caballos, parpadeo constante por sensibilidad a la luz; en perros fiebre, vómito, dolor abdominal, diarrea, falta de apetito, debilidad, abatimiento, rigidez, y dolor muscular severo.

Se considera una enfermedad ocupacional en:

- Agricultores principalmente de arrozales y cañaverales.
- Trabajadores de la construcción, de alcantarillados.
- Personas dedicadas a la minería.
- Trabajadores del sector pecuario: mayordomos, ordeñadores, cuidadores de animales.



Consejos para prevenirla:

- Almacene adecuadamente los aliment para protegerlos de roedores que l contaminen con orina y heces.
- Cocine bien los alimentos.
- Lave bien frutas y verduras.
- Consuma únicamente agua potable hervida.
- Limpie los envases y enlatados antes consumirlos.
- Realice limpieza y desinfección de suel y superficies dentro de la vivienda.
- Mantenga la vivienda y alrededores libr de maleza y pasturas altas.
- Disponga adecuadamente los residu sólidos y aguas servidas para evitar proliferación de roedores.
- Evite caminar o permanecer descalzo e suelos húmedos, con aguas estancadas.
- Mejore los sistemas de agua alcantarillado.
- Haga control de roedores en las vivienda lugares de trabajo y alrededores.
- Los trabajadores potencialmen expuestos al agente deben utiliz elementos de protección.



