


RASTOP®



Efectivo en una sola dosis

CARACTERÍSTICAS DE RASTOP

- RASTOP, mata ratas y ratones al consumir su dosis letal en una sola ingesta.
- Mata aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.
- No provoca rechazos en la colonia.
- Posee excelente palatibilidad, debido a su atractivo olor, sabor y textura.
- Viene listo para usar.
- Es extremadamente seguro en su uso.
- No presenta grandes peligros ni riesgos de toxicidad aguda para humanos y animales.
- Posee un efectivo antídoto, la vitamina K1.
- Formatos disponibles: Pellets, Bloques y Mini Bloques.



Innovación y Soporte Permanente

ANASAC COLOMBIA LTDA. / Aut. Medellín Km 3,5 Vía Siberia / Centro Empresarial Metropolitano Mod 3 Bod 30
PBX: 8219039 - 821 91 85 - 821 91 86.
www.anasac.cl - www.anasac.com.co



RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

TRATAMIENTO RESIDUAL SOBRE SUPERFICIES

FORMULACIÓN	USO	LUGAR	DOSIS
RASTOP Pellets	Casas, edificios, hoteles, hospitales, restaurantes, lugares públicos, fábricas de alimentos, mataderos, frigoríficos	Interiores y exteriores protegidos como despensas, entretechos, closets, estanterías, subterráneos, bodegas, y otros lugares de guarda.	Para ratas: 1-2 sachets, cada 5-10 m. Para ratones: 1 sachet, cada 2-4 m.
RASTOP Bloques Parafinados	molinos, packakings, planteles avícolas y porcinos, lecherías, establos, entre otros.	Interiores y exteriores desfavorables como desagües, alcantarillas, canaletas y subterráneos. También en canales y acequias, orillas de ríos y lagunas.	Para ratas: 1-2 bloques, cada 5-10 m. Para ratones: 1 bloque, cada 2-4 m.
RASTOP Mimi Bloques			Para ratas: 2-4 mini bloques, cada 5-10 m. Para ratones: 2 mini bloques, cada 2-4 m.

CONSIDERACIONES DE USO



- La laucha o ratón doméstico consume bajas cantidades de alimento o cebo en cada ingesta, pero en forma frecuente durante el día. Para un buen resultado esparza pequeñas cantidades de cebo cada 2 a 4 metros en las áreas de mayor actividad. El cebo debe ubicarse cuidadosamente en zonas protegidas ya que las lauchas no se alimentan en espacios abiertos.
- Las ratas de alcantarilla y de tejado consumen alimento en forma menos frecuente, pero en mayor cantidad. Para un efectivo control coloque RASTOP cada 5 a 10 metros, obteniendo con esto una excelente cobertura.
- Se debe reponer los cebos consumidos en forma continua, hasta que cese el consumo. Luego retire los restos de cebo y los roedores muertos, enterrándolos para evitar cualquier problema posterior.
- Siempre se debe manipular el raticida con guantes, para evitar su contaminación con olores extraños.
- Para prevenir reinfestaciones elimine alimentos, agua y posibles refugios.
- En caso de actividad frecuente de roedores, se recomienda un cebamiento permanente disponiendo raticida a medida que se necesite.
- RASTOP además, puede ser usado en medios de transporte como navíos, trenes y otros.

REGISTRO PARA USO EN SALUD PUBLICA RSGP - 0232 - 2004
CONCEPTO TOXICOLÓGICO FAVORABLE MP-13391-2003
REGISTRO SANITARIO No. INVIMA 2006V-0003970



Innovación y Soporte Permanente

Adquiera Rastop de Anasac en principales Supermercados, Tiendas Especializadas y Centros de Atención Técnica Anasac.