Elaborado por: Mónica Álvarez	*Revisado por: Mónica Álvarez*	*Aprobado por: Mónica Álvarez*
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios

KASUGAMICINA 20 SL-DVA

Registro Nacional ICA No. 927
Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.

GENERALIDADES

Tipo de Producto: Fungicida Agrícola
Formulación: Concentrado Soluble-SL
Ingrediente Activo: Kasugamicina
Concentración: 20 g/L
Categoría Toxicológica: III – Ligeramente Peligroso
Cultivo: Arroz
Presentación Disponible: 1, 4 y 20 L

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

KASUGAMICINA 2.0 SL-DVA es un fungicida antibiótico aminoglucósido, con acción protectante y curativa de amplio espectro. Actúa mediante inhibición de la síntesis de proteínas, lo cual se traduce en una inhibición del crecimiento de las hifas del hongo en el cultivo.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:
Kasugamicina hidrocloruro hidrato……..20 g/L
D-chiro-Inositol, 3-O-(2-amino-4-((carboxyiminomethyl)amino)-2,3,4,6-tetradeoxy-α-D-arabino-hexopyranosyl)-monohydrochloride

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

RECOMENDACIONES DE USO

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Enfermedad	Dosis	P.C.	P.R.
Arroz	Piricularia (Pyricularia oryzae)	1.0-1.5 L/ha	30 días	6 horas

P.C: Periodo de Carencia: Intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.
P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar preventivamente, cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad, con base en los resultados de monitoreos. Aplicar máximo 3 veces por ciclo de cultivo o cosecha, dentro de un programa MIPE (rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico, para evitar la aparición de resistencia).

EQUIPO Y VOLUMEN DE LA MEZCLA

Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. Aplicar con equipo terrestre o aéreo de uso convencional.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Evite mezclas con agentes fuertemente oxidantes, ácidos o básicos. Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso indicadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas a pequeña escala.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Elaborado por: Mónica Álvarez	*Revisado por: Mónica Álvarez*	*Aprobado por: Mónica Álvarez*
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios



Formulado por:
SINOCHEM NINGBO LTD., CHINA
21 Jiangxia St., Ningbo 315000, China

Importado y Distribuido por:
DVA DE COLOMBIA LTDA.
Km. 1.5 Vía Chía – Cajicá
Centro Empresarial Oxus Oficina 509
PBX: 7427042
Chía (Cundinamarca) - Colombia