



Tecnología, Calidad y Eficiencia.

GONZALEZ VARELA RUBYS MARIA

Documento: 49774547

Edad: 55 A 5 m 9 d

Fecha: 13/11/2025

GAMAGRAFIA DE VACIAMIENTO GASTRICO EN FASE SOLIDA

Radiofármaco: ^{99m}Tc - NANOCOLOIDE

Dosis: 1mCi v.o. HUEVOS radiomarcados.

RESULTADO:

Prevía ingestión de 2 tajadas de pan + dos claras de huevo radiomarcados se procedió a realizar estudio estático durante 4 horas en proyección oblicua anterior izquierda.

Posteriormente se realizó cuantificación de la actividad retenida en estómago con áreas de interés y corrección por decaimiento.

Durante el tiempo del estudio se obtuvieron las siguientes cifras de retención, a la hora, dos horas y cuatro horas:

Retención a la hora.	76%	(VN: 30- 90%.)
Retención a las dos horas.	64%	(VN: menor de 60%.)
Retención a las cuatro horas.	28%	(VN: menor de 10%.)

OPINIÓN:

- VACIAMIENTO GÁSTRICO PARA SOLIDOS RETARDADO A LAS 2 Y 4 HORAS

DRA SARAI ELENA MORON ARAUJO

MEDICO NUCLEAR 1020742239

impresor por: SMORON Página 1/1

NO OLVIDE TRAER SUS ESTUDIOS ANTERIORES PARA SU PROXIMA CITA