



Tecnología, Calidad y Eficiencia.

BENAVIDES RODRIGUEZ MARIA ISABEL

Documento: 1065881706

Edad: 35 A 9 m 15 d

Fecha: 11/12/2025

VACIAMIENTO GASTRICO SOLIDOS

Radiofármaco: 99mTc - NANOCOLOIDE

Dosis: 1mCi v.o. HUEVOS radiomarcados.

RESULTADO:

Previo ingestión de 2 tajadas de pan + dos claras de huevo radiomarcados se procedió a realizar estudio estático durante 4 horas en proyección oblicua anterior izquierda.

Posteriormente se realizó cuantificación de la actividad retenida en estómago con áreas de interés y corrección por decaimiento.

Durante el tiempo del estudio se obtuvieron las siguientes cifras de retención, a la hora, dos horas y cuatro horas:

Retención a la hora.	66%	(VN: 30- 90%.)
Retención a las dos horas.	39%	(VN: menor de 60%.)
Retención a las cuatro horas.	6%	(VN: menor de 10%.)

OPINIÓN:

- VACIAMIENTO GÁSTRICO PARA SOLIDOS DENTRO DE LÍMITES NORMALES.

DRA SARAI ELENA MORON ARAUJO

MEDICO NUCLEAR 1020742239

impresor por: SMORON Página 1/1

ANTERIORES PARA SU PROXIMA CITA

NO OLVIDE TRAER SUS ESTUDIOS