MEDICINA NUCLEAR

Tecnología, Calidad y Eficiencia.

ROMERO DE GOMEZ CARMEN ELISA
Documento: 23739036
Edad: 77 A 11 m 26 d **Fecha:** 06/02/2026

GAMAGRAFÍA DE TIROIDES

Radiofármaco: 99mTcO4
Dosis: 2.3 mCi i.v.

Resultado:
Se obtuvo una imagen estática de la glándula tiroides en proyección anterior durante 5 minutos, 15 minutos después de la administración endovenosa del radiotrazador.

La glándula tiroides se encuentra en posición y situación habituales, de tamaño conservado. Presenta distribución heterogénea del radiotrazador, en relación con áreas nodulares con captación relativamente mayor en comparación con el resto del parénquima tiroideo, localizadas en el tercio medio del lóbulo tiroideo derecho y en el polo inferior y tercio medio del lóbulo tiroideo izquierdo, sin evidencia de hipercaptación focal intensa.

Diámetros obtenidos: LD: 3.9x2.2 cm y LI: 3.8x2.0 cm.
Peso estimado en gramos: 17.5
Índice de atrapamiento: 2.3 (VN 2.5 - 4.5)

OPINIÓN:
- BOCIO MULTINODULAR CON INDICE DE ATRAPAMIENTO DIMISMUIDO

Nota: correlacionar con ecografía y perfil tiroideo.

Mauricio Hinojosa V.

Dr. MAURICIO ANDRES HINOJOSA VIDAL
MEDICO NUCLEAR 1065646963 impresor por: MHINOJOSA Página 1/1

NO OLVIDE

TRAER SUS ESTUDIOS ANTERIORES PARA SU PROXIMA CITA