
MATERIAL EDUCATIVO

GUIAS TRIAGE-ACV Y FIEBRE AMARILLA










www.dosquebradas.gov.co

¿Cómo se previene?

La vacunación es fundamental


La vacuna es muy eficaz y causa protección de por vida.


La inmunidad se adquiere de **10 a 14 días** después de la fecha de vacunación, por eso si va a viajar a **zonas de riesgo** debe **vacunarse mínimo quince días previos.**



¿Quién no debería vacunarse?

- Los lactantes de menos de 9 meses.
- Las embarazadas.
- Enfermedad febril aguda.
- Mayores de 60 años.
- Las personas con alergia grave a las proteínas del huevo.
- Quienes hayan recibido en las tres semanas anteriores vacuna de cólera o fiebre tifoidea.
- Las personas con inmunodeficiencias graves: antecedentes de timectomía, leucemia, linfomas, cáncer, o en terapia de larga evolución con corticoides, quimio o radioterapia, así como en personas afectadas de infección por el VIH.





www.dosquebradas.gov.co









www.dosquebradas.gov.co

ESCALA DE NIHHS

Berge E, Whiteley W, Audebert H, et al. Eur Stroke J. 2021;6(1):I-LXII.

NIHSS:

- ✓ Nivel de conciencia.
- ✓ Respuesta a preguntas.
- ✓ Comprensión de órdenes.
- ✓ Mirada conjugada.
- ✓ Campos visuales.
- ✓ Simetría facial.
- ✓ Función motora (4 extremidades).
- ✓ Ataxia de extremidades.
- ✓ Sensibilidad.
- ✓ Lenguaje (afasia).
- ✓ Habla (disartria).
- ✓ Extinción o inatención.

Puntaje: 0 a 42.

VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL DÉFICIT NEUROLÓGICO:

11 Variables □ 0 a 42 puntos (0= nulo déficit neurológico)

Gravedad:

1. **Leve** : < 4 puntos
2. **Moderado:** < 16 puntos
3. **Severo:** < 25 puntos
4. **Muy severo** > 25 puntos (contraindicación para iniciar terapia trombolítica)

Valora pronostico – indicación de manejo endovascular con más de 6 puntos


Berge E, Whiteley W, Audebert H, et al. Eur Stroke J. 2021;6(1):I-LXII.



Figura 3

Escala CORRE +
Fuente: cortesía del autor, Luis Roa. (29)

www.dosquebradas.gov.co





www.dosquebradas.gov.co