FICHA TÉCNICA

Gel cucarachicida

Insecticida en gel a base de Sulfluramida
Registro para uso en Salud Pública: RGSP 334-2014
Registro INVIMA: 2014V-0005079
Concepto Toxicológico: MP- 14533-2012
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Tipo: Insecticida
Ingrediente activo: Sulfluramida
Concentración: 1 %
Grupo Químico: Sulfonamida
Modo de acción: Ingestión.
Categoría toxicológica: Cat. III

Fórmula:
Cada Kg de producto contiene:
Sulfluramida …….…… 10 g
Benzoato de denatonio …… 0,05 g
Excipientes c.s.p. ……..……. 1 Kg

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

BELL® Gel cucarachicida, es un atractivo cebo para el control de todo tipo de cucarachas (*Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana*), y puede utilizarse en cualquier lugar residencial, comercial, industrial o donde se produzcan o manipulen alimentos. BELL® Gel se destaca por su efecto prolongado, manteniéndose activo por 30 ó 40 días según las condiciones o área de aplicación.

BELL® Gel esta formulado con un potente y eficaz ingrediente activo que actúa sobre el metabolismo energético de las cucarachas, a nivel de las mitocondrias, interrumpiendo la producción de ATP, conduciendo a su muerte.

Luego de la ingesta, las cucarachas no presentan síntomas inmediatos, lo que permite que retornen a sus madrigueras, donde a través del traspaso de alimento de boca en boca, por

medio del consumo de sus heces (coprofagia) o por su canibalismo (necrofagia), contaminan en forma progresiva a otros adultos y ninfas, produciéndose la muerte 48 a 72 horas post ingesta.

BENEFICIOS:

- BELL® Gel es de amplio espectro de acción contra todo tipo de cucarachas, con buen control y efectividad en lugares de refugio de estos insectos.
- BELL® Gel es de fácil manejo y aplicación, es estable y posee excelente adherencia en todo tipo de superficies.
- BELL® Gel, se mantiene estable y palatable por periodos superiores a 30 días.
- BELL® Gel, posee además benzoato de denantonium, sustancia amargante que evita la ingestión humana accidental, otorgando mayor seguridad en el uso en lugares sensibles.
- No mancha las superficies en donde es aplicado, prácticamente sin olor.
- No es inflamable, no es corrosivo.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para optimizar la aplicación de BELL® Gel, se recomienda una buena limpieza del área a tratar para eliminar los posibles factores que compitan con el cebo y que favorecen la presencia de cucarachas.

El sellado de grietas y hendiduras disminuirá las posibilidades de refugio.

Ideal para áreas sensibles. No es necesario retirar elementos u objetos en el momento de la aplicación.

DOSIS DE APLICACIÓN:

PLAGA	DOSIS	LUGARES	FRECUENCIA
Cucaracha alemana (*Blatella germanica)*	1 ó 3 gotas/mt2	Hogares, aviones, cocinas, industrias, hoteles, hospitales, clínicas, oficinas, restaurantes, clubes, fábricas, etc	Realizar una segunda aplicación aproximadamente a los 30 – 35 días
Cucaracha americana (*Periplaneta americana)*	1 ó 2 gotas/mt2		
Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*)	1 ó 2 gotas/mt2		

- LEER LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- Después de aplicar lavarse con agua y jabón.

- Verificar a los 7 días el estado de las gotas aplicadas.
- Si existe consumo repetir aplicaciones.
- Evitar cualquier contaminación sobre BELL® Gel para no generar un posible rechazo al cebo (principalmente insecticidas líquidos).
- No lavar o quitar las gotas de BELL® Gel.

RECOMENDACIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:

- Conservar este producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible.
- Al aplicar usar guantes, ropa protectora, tapabocas, gafas y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Asegurarse de que no se encuentren presentes personas sin protección adecuada ni animales domésticos durante la aplicación.
- No ingerir el producto y evitar que el producto entre en contacto con la piel, ojos y ropa.
- No aplicar sobre alimentos ni artefactos de cocina.
- No utilizar BELL directamente sobre alfombras y tapices
- Una vez utilizado todo el producto, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

ALMACENAMIENTO:

- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave, de difícil acceso a niños y animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos y forrajes
- Mantenga en su empaque original.

MANEJO DE INTOXICACIONES:
Síntomas de intoxicación:
De ocurrir algún malestar o algún signo de intoxicación durante la aplicación, el operario debe suspender inmediatamente su trabajo y debe recibir atención médica.
De presentarse un mal uso del producto o por descuidos en la aplicación, se pueden presentar síntomas de intoxicación no específicos tales como: en algunos casos se presenta hormigueo el cual desaparece en poco tiempo, salivación, letargo, fluido por nariz y falta de apetito; frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto.

Primeros Auxilios:
Retirar al paciente del área.
Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso
• En caso de ingestión: Traslade al paciente al centro hospitalario más cercano, llevando el envase o la etiqueta del producto. Administre dos tazas de agua. NO PROVOQUE VÓMITO.
No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre Carbón activado suspendido en agua.

• En caso de contacto cutáneo : Bañar al paciente con abundante agua y jabón. Cambiarlo de ropa mantenerlo en reposo y abrigado.
• Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
Notas para el medico: La Sulfluramida tiene baja toxicidad tanto dermal como inhalatoria. Este producto básicamente no irrita ojos y la irritación en piel es mediana. Se recomienda un tratamiento sintomático y administrar medidas de soporte.

ANTÍDOTO:
No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático bajo supervisión médica.

- Tiempo de reingreso: No aplica; por norma, 2 horas después de la aplicación.
- BELL® Gel, está disponible en presentación de Jeringa x 6g, 12g y 30g
- Efectúe disposición de envases según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org
- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Importado y Distribuido por:
Anasac Colombia Ltda - Sanidad Ambiental
Autopista Medellín Km 3,5 vía Bogotá - Siberia Centro Empresarial Metropolitano, Modulo 2. Bodega 40
Tels: PBX (57) (1) 821 90 39.
Cota - Cundinamarca - Colombia
www.anasac.co

Formulado por:
Gleba S.A.
Av. 520 y Rta. Prov. 36 (1903)
Tel. +54-2 214 913 062
Melchor Romero La Plata
Buenos Aires, Argentina

- El presente documento, anula versiones anteriores.