



Tecnología, Calidad y Eficiencia.

OSMAN JOSE PEREZ PEREZ

Documento: 1065618837

Edad: 17 A 2 m 17 d

Fecha: 20/05/2025

GAMAGRAFIA DE PERFUSION TESTICULAR

Radiofármaco: 99mTc

Dosis: 3mCi i.v.

Técnica:

Prevía aplicación del trazador por vía intravenosa se obtuvieron inicialmente imágenes dinámicas de la región inguino-escrotal en proyección anterior (fase de perfusión durante de 20 minutos con imágenes cada 30 segundos), e imagen estáticas tisulares a los 30 y 60 minutos.

Hallazgos:

La secuencia dinámica muestra circulación normal del radionúclido a través de los vasos ilíacos y femorales, captación difusa en pelvis y muslos con actividad en contenido escrotal de igual intensidad.

La imagen tisular revela una captación simétrica y homogénea en la región escrotal.

CONCLUSIONES:

- ESTUDIO DENTRO DE LIMITES NORMALES.

Nota: En casos de criptorquidia la gammagrafía de perfusión testicular puede mostrar un patrón normal ya que su principal indicación es cuando existe sospecha en alteración del flujo sanguíneo testicular como en la torsión testicular, sin embargo, no se observan captaciones anormales en región inguinal o intraabdominal que sean sugestivas de testículo ectópico.

Atentamente,

DR. JOSE ALBERTO CALDERON A.

MEDICO NUCLEAR MD 2350

impresor por: YPIMENTEL Página 1/1

NO OLVIDE TRAER SUS ESTUDIOS ANTERIORES PARA SU PROXIMA CITA