

Aprendiendo a identificar signos y síntomas de las enfermedades que se previenen con las vacunas

Búsqueda Activa Comunitaria (BAC) en
eventos prevenibles por vacuna



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD





Introducción:

A través de esta herramienta se busca brindar educación a la comunidad en aspectos generales de la enfermedad, al igual que la identificación de los principales síntomas de los eventos inmunoprevenibles Parálisis Flácida Aguda, Sarampión – Rubeola, Síndrome de Rubeola Congénita, Tétanos Accidental, Tétanos neonatal, Tos ferina, Difteria, meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica.

De igual manera se brindan recomendaciones preventivas y de autocuidado con el fin de evitar complicaciones, la transmisión a los contactos y así evitar brotes en la comunidad.

Tabla de contenido:

Introducción.....2

Parálisis Flácida Aguda.....3

Sarampión – Rubeola.....6

Síndrome de Rubeola Congénita.....9

Tétanos Accidental.....11

Tétanos neonatal.....14

Tos ferina.....17

Difteria20

Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica.....23



1

PARALISIS FLACIDA AGUDA



PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA)

¿QUÉ ES LA PFA?

La Parálisis Flácida Aguda (PFA) es una condición en la que un niño o niña pierde fuerza en brazos o piernas de forma repentina causada por el poliovirus.

- **¿Como se transmite?**

No se transmite directamente de persona a persona, puede contagiarse por agua o alimentos contaminados y por falta de higiene en las manos.





PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA)

SINTOMAS:

- Debilidad o parálisis en brazos o piernas
- Dificultad para caminar
- Pérdida repentina de fuerza
- El brazo o la pierna “se pone flojita”
- Adicional el menor puede presentar o no fiebre.





MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES



**Vacune a los niños
contra la poliomielitis**



Lávese las manos



Alimentos limpios



**Si presenta síntomas, acudir
al centro de salud y
seguir las indicaciones del médico**

Se debe vacunar con La vacuna Poliomielitis

2

SARAMPIÓN Y RUBÉOLA



¿Que es el sarampión y la rubéola?




Son enfermedades infecciosas muy contagiosas que se presenta en todos los grupos de edad, especialmente en niños.



¿Como se transmite?

Cuando una persona infectada tose o estornuda, el virus puede permanecer en el ambiente y las superficies hasta por **2 horas**

Facilitando la entrada a nuestro cuerpo cuando respiramos o nos tocamos la cara con las manos sin lavar.



Sarampión-Rubéola

- ○ Sarpullido que aparece 3 a 5 días después de que empiezan los síntomas
- ○ Este sarpullido son puntitos rojos que comienzan en la cabeza, extendiéndose al resto del cuerpo



Tos



Fiebre alta



Ojos llorosos y rojos



Manchas blancas dentro de la boca



Secresiones nasales (moqueo)

Complicaciones



Infección del oído

Neumonía



Ceguera

Crisis convulsivas febriles



Diarrea

Inflamación del cerebro



El sarampión puede ser peligroso, sobre todo en los bebés y niños pequeños



Vacunación



La forma **más efectiva de prevención** es la vacuna **Vacuna triple viral (SRP)** (sarampión, rubéola y paperas).

MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Uso de tapabocas



Limpieza de superficies



Consumo abundante de líquidos



Lavado de manos



Ventilación de espacios cerrados



Evitar la automedicación


ANTE PRESENCIA DE SINTOMAS IMPORTANTE



Evitar asistir a el colegio
trabajo o visitar lugares
públicos



Permanecer en el lugar donde vive o
hospeda



Evitar contacto cercano
con otras personas


Comunicarse
con su EPS para
recibir
orientación
médica



Seguir las
recomendaciones
medicas



Evitar viajar






3

SÍNDROME RUBÉOLA CONGÉNITA

¿Que es el Síndrome de rubéola congénita?

Es una infección que se da durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, puede ser causa de aborto espontáneo, muerte fetal, muerte prenatal o malformaciones congénitas.



Corazón:
Persistencia del
conducto arterioso



Orejas: sordera
neurosensorial



Ojos:
catarata
congénita



Cabeza: microcefalia



MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES



Seguimiento control prenatal

Contacto con persona con fiebre y brote consultar a medico



Seguimiento crecimiento y desarrollo en el bebe





Esquema vacunación gestante

Gestantes	Influenza estacional	Única anual a partir de la semana 14	Enfermedades respiratorias asociadas al virus de la influenza
	Tdap (Tétanos, Difteria, Tosferina acelular)	Única por cada gestación. Entre la semana 26 y preferiblemente antes de la semana 36	Tétanos neonatal, difteria y Tos ferina neonatal
	Virus sincitial Respiratorio	Única por cada gestación. Entre la semana 28 y preferiblemente antes de la semana 36	Contra que previene el VRS Infecciones respiratorias en niños, bronquiolitis y neumonia





4

TÉTANOS ACCIDENTAL



QUÉ ES EL TÉTANOS ACCIDENTAL?

El tétanos accidental es una enfermedad grave causada por la bacteria (*Clostridium tetani*) que vive en la tierra, el polvo y objetos sucios u oxidados.

 La bacteria entra al cuerpo a través de heridas, cortes o pinchazos.

¿CÓMO SE TRASMITE?

- Pinchazos con clavos, alambres u objetos oxidados
- Cortes con machetes, cuchillos o herramientas
- Heridas que presento contacto con tierra, estiércol o basura
- Mordeduras o quemaduras mal tratadas





SIGNOS Y SÍNTOMAS



**Dificultad para
abrir la boca**
(mandíbula rígida)



**Rigidez en cuello,
espalda o abdomen**



**Espasmos musculares
dolorosos**



**Dificultad para tragar
o respirar**



MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES



Vacunarse contra el tétanos



Limpiar y cubrir las heridas



• Acudir al centro de salud.



• No aplicar remedios caseros



Usar calzado y protección



Evitar objetos oxidados o contaminados



• Mantener las vacunas al día.



• Seguir indicaciones médicas.

Se debe vacunar con La vacuna Td (tétanos y difteria)



5

TÉTANOS NEONATAL



¿QUÉ ES EL TÉTANOS NEONATAL?

El tétanos neonatal es una enfermedad grave que afecta a los bebés recién nacidos, causada por una bacteria (*Clostridium tetani*) que entra al cuerpo a través del ombligo.

¿CÓMO SE TRASMITTE?

- El parto no se realiza en condiciones limpias
- El ombligo se corta con objetos no esterilizados
- Se aplican sustancias caseras en el ombligo (café, ceniza, tierra, plantas)

 La bacteria vive en la tierra y el polvo.



Se recuerda que dentro de la estrategia de parto digno y humanizado tienes derecho a un parto en la institución prestadora de servicios de salud.

SIGNOS Y SÍNTOMAS



- El bebé no puede comer
- Llanto débil o continuo
- Rigidez del cuerpo
- Espasmos o sacudidas
- Dificultad para respirar



MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES



Se debe vacunar con La vacuna Td (tétanos y difteria)

6 | TOS FERINA





¿Qué es la TOS FERINA?

Es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa, producida por una bacteria llamada *Bordetella pertussis*. Causa ataques fuertes de Tos que, dificulta la respiración, puede ser muy grave especialmente en los bebés y niños.

¿Cómo se transmite?

A través de gotas producidas al toser o estornudar, así mismo por el contacto directo con las secreciones respiratorias (saliva, mocos) de una persona enferma.





¿Cuáles son los síntomas de la Tosferina?

Los **Síntomas** son parecidos a un resfriado común:

- ✓ Moqueo nasal
- ✓ Ojos llorosos
- ✓ Fiebre baja o sin fiebre
Tos leve que va empeorando
- ✓ Ataques de tos seguidos sin poder respirar bien
- ✓ Sonido característico al inhalar después de toser (como un "gallo" o "silbido")
- ✓ Vómito después de la tos
- ✓ Fatiga extrema





MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES

Vacunación

Menor de 5 años



Pentavalente

protege contra cinco enfermedades:
difteria, tos ferina, tétanos, Hepatitis B
y *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib)

DPT

Protege contra: difteria, tos ferina y tétanos

Gestantes



Tdap

Protege contra: Tétanos, difteria y
tosferina acelular

Medidas preventivas



Uso de tapabocas



Lavado de manos



Tratamiento profiláctico con antibiótico para
los contactos estrechos de un caso

 **Importante:** Si alguien presenta síntomas,
especialmente un bebé, es urgente consultar al
médico.

7

DIFTERIA






¿Qué es?

La difteria es una **enfermedad grave** causada por una bacteria **que se puede prevenir con la vacunación**, afecta principalmente la nariz y la garganta y hace que la persona no pueda respirar.

¿Como se transmite?

La difteria se contagia principalmente por gotas respiratorias al toser, estornudar o hablar cerca de alguien infectado, ya que la bacteria se aloja o vive en nariz y garganta.



Ahora veamos cuales son sus síntomas






Capa blanca o gris pegada en la garganta que sangra al intentar retirarla y no se desprende fácilmente



Dolor de garganta intenso



Dificultad para respirar, respiración ruidosa o sensación de ahogo



Dificultad para tragar



Fiebre y malestar general o decaimiento



SECRETARÍA DE
SALUD





MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES

Vacunación



La vacuna que previene la Difteria es la **Pentavalente** incluida en el esquema de vacunación en menores de 5 años.



Seguir las recomendaciones medicas



Requiere tratamiento profiláctico con antibiótico para los contactos estrechos de un caso de Difteria.




Evitar contacto cercano con otras personas

Si ha presentado los anteriores síntomas tenga en cuenta lo siguiente:



Consulte de inmediato al servicio de salud.



Permanecer en el lugar donde vive o hospeda y evite visitar lugares públicos

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES



Uso de tapabocas



Limpieza de superficies



Consumo abundante de líquidos



Ventilación de espacios cerrados




Evitar la automedicación



Lavado de manos

8

MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCOCICA



¿Qué es?

La meningitis bacteriana es una enfermedad grave que ocurre cuando bacterias causan inflamación de las membranas o capas que cubren el cerebro y la médula espinal.

Puede afectar a personas de cualquier edad, avanzar rápidamente y poner en riesgo la vida si no se atiende a tiempo.

La vacunación protege contra las principales bacterias que causan meningitis.

¿Cómo se transmite?

La meningitis bacteriana se transmite de persona a persona en las siguientes situaciones:

Gotas de saliva al toser, estornudar o hablar muy cerca de alguien infectado.



Besos



Compartir utensilios como vasos, botellas o cubiertos.



**Acompáñame,
veamos
cuales son
sus síntomas**

Ten en cuenta que No se transmite por el aire a larga distancia ni por tocar objetos sin contacto directo con secreciones.



Síntomas iniciales


Dolor de cabeza fuerte o que no se va después de tomar medicamento para el dolor



Cuello rígido o dificultad para moverlo



Fiebre alta mayor de 38 °C y repentina




Manchas rojas o moradas en la piel que no desaparecen al presionarlas





Náuseas, vómito



No tolera la luz o el ruido



Somnolencia excesiva



Confusión o desorientación



Agresividad



Dificultad para despertarse

En niños pequeños:



Llanto constante o inconsolable



**Fontanela (molleja)
abombada**



Rechazo al alimento o succión débil



SECRETARÍA DE
SALUD



MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES

Vacunación



Las vacunas que previenen la meningitis bacteriana son:

- **Pentavalente** incluida en el esquema de vacunación en menores de 5 años.
- **Neumococo** incluida en el esquema de vacunación en menores de 5 años.
- **Meningococo no** incluida en el esquema de vacunación, se adquiere de forma particular.



Requiere tratamiento profiláctico con antibiótico para los contactos estrechos de un caso de meningitis bacteriana por las bacterias *streptococcus pneumoniae* y *neisseria meningitidis*.




Evitar contacto cercano con otras personas

Si ha presentado los anteriores síntomas tenga en cuenta lo siguiente:



Consulte de inmediato al servicio de salud.



Permanecer en el lugar donde vive o hospeda y evite visitar lugares públicos

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES



Uso de tapabocas



Limpieza de superficies



Consumo abundante de líquidos



Ventilación de espacios cerrados



Evitar la automedicación



Lavado de manos



Seguir las recomendaciones medicas



Gracias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD

