

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
	Código:	SDS-PGE-FT-021	Versión:	
Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez				

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Comportamiento de la Varicela en Bogotá D.C.

Definición del evento

La varicela es una enfermedad infecciosa aguda de origen viral causada por el virus varicela-zóster (VVZ), perteneciente a la familia Herpesviridae. Se caracteriza clínicamente por la aparición de un exantema vesicular generalizado, pruriginoso y de evolución progresiva, acompañado frecuentemente de fiebre moderada y malestar general. Las lesiones cutáneas se presentan típicamente en diferentes estadios evolutivos: máculas, pápulas, vesículas y costras.

La transmisión ocurre principalmente por vía aérea mediante gotas respiratorias o por contacto directo con el líquido de las lesiones vesiculares de personas infectadas. Adicional a lo anterior es posible la transmisión por vía transplacentaria durante el embarazo (primer trimestre del embarazo y principios del segundo), que puede dar lugar a varicela congénita (infección que ocurre desde unas semanas previas hasta algunos días posteriores al parto).

Desde el punto de vista epidemiológico, la varicela es considerada una enfermedad altamente contagiosa, con mayor incidencia en población infantil, se considera una enfermedad prevenible mediante vacunación, con vacuna incluida dentro de los programas de inmunización.

El período de incubación es 10 a 21 días. La persona infectada puede transmitir el virus desde uno a dos días antes del comienzo del exantema hasta que todas las lesiones cutáneas se encuentren en fase de costra. La transmisión se ve favorecida en entornos de alta interacción social ya que el hacinamiento es un factor de riesgo importante, el cual se evidencia en lugares con poblaciones confinadas.

En el marco de la vigilancia en salud pública, el evento varicela se define operativamente como la presencia de un cuadro clínico caracterizado por erupción cutánea aguda de tipo maculo-papular durante pocas horas y vesicular durante tres o cuatro días, que deja costras granulosas, acompañada de fiebre moderada. Los casos pueden clasificarse como confirmados por clínica o confirmados por nexa epidemiológico.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la incidencia de la Varicela en la población residente de Bogotá D.C.

Meta

No aplica

Forma de cálculo

Numero de casos nuevos notificados durante un periodo epidemiológico residente en Bogotá D.C.

Casos nuevos / Proyección poblacional para el periodo * 100.000 habitantes.

Unidad de medición

Tasa por 100.000 habitantes

Periodicidad de la actualización

Semestral

Fuente de información

- Numerador:
SIVIGILA 4.0 evento 831
- Denominador:
Proyecciones de Población por Localidad Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con base en CNPV DANE 2018.

Serie disponible

Años 2019 - 2025

Responsable

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
 observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Stefani Katusca Florez Trujillo
 Subdirección de vigilancia en salud pública
 Grupo transmisibles

Observaciones

Datos finales 2019 - 2024, preliminares 2025.

- Instituto Nacional de Salud de Colombia. *Protocolo de vigilancia en salud pública: Varicela*. Bogotá: Instituto Nacional de Salud; 2024. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Varicela.pdf