**INFORMACIÓN GENERAL**

- **Nombre del producto**

MAX PERFORMANCE ADULTO POLLO & ARROZ

- I**ngredientes**

Harina de menudos de pollo, Maíz integral molido, Germen de maíz desgrasado, Arroz medio grano, Sorgo integral, Afrecho de soya, Afrecho de gluten de maíz 60, Grasa de pollo, Carne de pollo mecánicamente separada, Levadura seca de cervecería (Saccharomyces cereviciae), Fosfato dicálcico, Semilla de linaza, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Manano oligosacáridos, Propionato de calcio, Extracto de Yucca schidigera, Hidrolizado de pollo e hígado de cerdo, Aditivo antioxidante BHA y BHT, Suplemento vitamínico mineral (Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina D, Vitamina E, Selenito De Sodio, Ácido Fólico, Ácido Pantoténico, Sulfato De Cobre, Sulfato De Hierro, Yodato De Calcio, Cloruro De Sodio, Cloruro De Potasio, Oxido De Manganeso, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina H, Vitamina K, Vitamina PP, Óxido De Zinc).

- **COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| ANÁLISIS NUTRICIONAL | |
|---|---|
| Proteína bruta (Mín.) | 23 % |
| Grasa (Mín.) | 12 % |
| Fibra (Máx.) | 4 % |
| Humedad (Máx.) | 12 % |
| Cenizas (Máx.) | 11 % |
| Calcio (Máx.) | 2.4 % |
| Fósforo (Mín.) | 0.8 % |
| Manano oligosacáridos (Mín.) | 0.1% |

- **Presentaciones**:

70g, 100 g, 500 g, 2Kg, 15 Kg, 20 Kg

- **Indicación del producto**

Alimento completo para perros adultos de todas las razas.

- **Cantidad a suministrar**:

| **Peso del perro** | **Cantidad de suministro diario** |
|---|---|
| 3.5 – 7 Kg | 76 – 112 g |
| 7 – 13.5 Kg | 112 – 184 g |
| 13.5 – 22 Kg | 184 – 265 g |
| 22 – 38 Kg | 265 – 399 g |
| 38 – 48.5 Kg | 399 – 479 g |

**- Condiciones y plazo de conservación:** 18 meses a partir de la fecha de elaboración conservar en un lugar fresco y seco.

| **1. IDENTIFICACION DE PRODUCTO Y EMPRESA** |
|---|
| Nombre del producto: SPLEND SHAMPOO |
| Titular del Registro: INDUSTRIA COLOMBIANA FARMACEUTICA ICOFARMA S.A. |
| Dirección y Teléfonos: Cra. 21 N° 70A-39, PBX: 3474624 - 2554985 |

| **2. COMPOSICION/INGREDIENTES** | |
|---|---|
| Tipo de producto: | Insecticida (Shampoo) |
| Ingrediente Activo: | Permetrina + Irgasan DP 300 |
| Nombre Químico: | -Permetrina:(cis+trans)-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate (IUPAC)<br>- Irgasan DP 300: 2,4,4 – Trichloro – 2 - hydroxy diphenyl eter (Triclosan) |
| N° CAS | - Permetrina: 52645-53-1<br>- Irgasan DP 300: 3380-34-5 |
| Concentración: | - Permetrina: 0,15 g / 100 ml<br>- Irgasan: DP 300: 0,2 g / 100 mL |
| Clasificación Química: | Piretroide |
| Formula Química: | - Permetrina: $C_{21}H_{20}Cl_2O_3$ (ingrediente activo)<br>- Irgasan DP 300: $C_{12}H_7Cl_3O_2$ |
| Registro ICA No.: | 5889-DB |
| USO: | SPLEND SHAMPOO, está indicado para la limpieza e higiene de la piel y el pelo de los animales, se indica como antiséptico, desodorizante, aromatizante para perros, gatos y equinos. Controla ectoparásitos como pulgas (Ctenocephalides sp), garrapatas (Ripichephalus sp), piojos (Trichodectes sp). Útil en programas de higiene, junto con los baños secos.<br>Su uso elimina las bacterias más frecuentes de la piel, que, junto con los ectoparásitos, causan la foliculitis y enfermedades seborreicas de la piel.<br>Elimina de la dermis sustancias irritantes y pruriginosas metabólicas y alérgicas de bacterias y ectoparásitos, previniendo así la dermatitis atópica.<br>Remueve la grasa descompuesta y suciedad que sirve de sustrato para los diferentes microorganismos evitando así el mal olor de la mascota. |

| **3. IDENTIFICACION DE RIESGOS** | |
|---|---|
| Clasificación riesgo del Producto: | Categoría Toxicológica III. Medianamente tóxico. |
| Carcinogénesis: | No carcinogénico |
| Mutagénesis: | No mutagénico. |
| Efectos Agudos: | Signos y Síntomas de sobre exposición. |
| Ojos: | Evitar contacto con los ojos. |
| Piel: | H317 puede causar una reacción alérgica en la piel. Evitar contacto con la piel. |
| Ingestión: | H302 es nocivo si se ingiere. No ingerir. |
| Organismos acuáticos | H400 muy tóxica para la vida acuática, H410 es muy tóxica para la vida acuática con efectos de larga duración. |

| **4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS** | |
|---|---|
| Ojos: | Lavar con abundante agua o solución fisiológica durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona posee lentes de contacto, quitarlas de ser posible. Posterior control oftalmológico. |
| Piel: | Lavar con abundante agua y jabón. Si hay irritación y persiste, llamar al médico. |

info@soydelcampo.com

ANTIHELMINTICO

# CANNEX

LABORATORIOS BUSSIE S.A.



Vademécum Veterinario

## CANNEX

ANTIHELMINTICO




Laboratorio

**LABORATORIOS BUSSIE S.A.**

Av Calle 19 No 34-76 Bogotá - Colombia
Teléfono: (571) 3648060 018000111851
Sitio web: www.bussie.com.co

**Uso terapéutico:** ANTIHELMINTICO

**Principio Activo:** PIRANTEL PAMOATO, PRAZIQUANTEL, FEBANTEL

**Especies:** Caninos

**Descripcion:**

***CANNEX*** *es un Antihelmíntico de amplio espectro*

- ***ACCIÓN**: Antihelmíntico*
- ***INDICACIONES**: Antihelmíntico en forma de suspensión para administración oral, a base de Pirantel pamoato, Praziquantel y Febantel, de amplio espectro de acción antiparasitaria contra nemátodos y cestodos, en perros. Tiene efecto adulticida, larvicida y ovicida. **CANNEX** está indicado para el tratamiento y control de parasitismos gastrointestinales de los perros.*
  *Nemátodos: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Ancylostoma braziliense.*
  *Cestodos: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Multiceps multiceps, Joyeuxiella pasqualei, Mesocestoides sp.*

- ***DOSIS**: 1 mL por cada 10 kilos de peso corporal.*
- ***TIEMPO DE RETIRO**: No aplica*
- ***CONTRAINDICACIONES**: Manténgase fuera del alcance de los niños. Utilizar con precaución en animales jóvenes o intensamente parasitados.*
- ***MODO DE APLICACIÓN**: Suspensión oral*
  ***PRESENTACIÓN**: Jeringas por 2 mL, 5 mL y 10 mL. Frascos por 200 mL*
- ***REGISTRO**: 6803 MV*

---

AVISO LEGAL: La información y contenidos presentados son a título informativo y educativo y no deben emplearse para la utilización de los productos. La información e indicaciones es suministrada por el fabricante o importador, no se asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones de los contenidos aquí publicados ni por el uso o decisiones que tome el usuario de la información. Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido o diseño de esta página. Soy del Campo, su logotipo y nombre son marcas registradas.

---

Gracias por consultar CANNEX en nuestro vademécum Veterinario, esperamos que CANNEX sea lo que estaba buscando. Recuerde que en nuestro vademécum Veterinario podrá encontrar toda la información de cualquier producto tal cual se muestra la de CANNEX.

Buscar

## Filtros

Vedemécum Productos

Veterinario

Agrícola

Especies

## PRODUCTOS DESTACADOS




**BRILLAPEL EMULSION**
VITAMINICO MINERAL ACIDOS GRASOS, Veterinario




**OLIVITASAN**
VITAMINICO MINERAL, Veterinario

**ENERGYN**

SUSPENSIÓN ORAL

# Canisan-D

## Diclazuril

Fenbendazol + Prazicuantel + Diclazuril

**Eficaz contra:**

- *Huevos*
- *Larvas*
- *Adultos*

- *Tenias*
- *Giardia*
- *Coccidias*
- *Nemátodos*
- *Otros protozoarios*

**COMPOSICIÓN**

Cada mL de Canisan-D contiene:

| | |
|---|---|
| Fenbendazol | 250 mg |
| Prazicuantel | 50 mg |
| Diclazuril | 75 mg |
| Excipientes c.s.p. | 1 mL |

- **Control y tratamiento contra Giardia Neospora y Toxoplasma.**
- **Nematicida, Tenicida y Antiprotozoario, en todos sus estadios.**
- **Eficacia máxima en el control de los parásitos internos de perros y gatos**



## Una sola dosis es suficiente para el control completo de los parásitos




**Único con Diclazuril para el control y tratamiento de las coccidias**

*¡Actúa donde se necesita!*

Provet

Eficacia ante todo.

SUSPENSIÓN ORAL

# Canisan-D

Fenbendazol + Prazicuantel + Diclazuril

## Diclazuril



## SABOR A COCO

**La más confiable prevención de la coccidiosis**

**El más completo antiparasitario para perros y gatos.**

**El fin de la diarrea y las coccidias**

**Como preventivo y curativo**





**PROGRAMA DE DOSIFICACIÓN:**

**Para el control del parasitismo:**
Vía oral; 1 mL por cada 5 kg, única dosis.

**Para el tratamiento de coccidiosis:** Vía oral 1 mL por cada 5 kg cada 24 horas, durante dos días consecutivos y repetir el día 7 y 14.

**Para el tratamiento de giardiosis:** Vía oral 1 mL por cada 5 kg de peso cada 24 horas durante 3 - 5 días consecutivos.

**Contraindicaciones**
No administrar en cachorros menores de 4 semanas de edad y gatos menores de 6 semanas de edad.

**Presentación:**
Jeringa dosificadora de uso oral por 2.5 mL, 5 mL y 10 mL.

Provet

Eficacia ante todo.

www.laboratoriosprovet.com




FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

# Baxidin

Solución Antiséptica

## Descripción

**BAXIDIN** es un antiséptico de uso veterinario a base de Clorhexidina Digluconato en vehículo acuoso, lo que permite un uso seguro, pues no irrita. Puede ser utilizado tanto en perros, gatos,

bovinos, equinos y porcinos como antiséptico de uso externo e interno o como desinfectante de instrumental quirúrgico y equipos de diagnóstico veterinario.

---

## Beneficios

- Gracias a su base acuosa, no irrita la piel.
- Efecto bactericida altamente efectivo aún en presencia de material orgánico, sangre, suero, pus o tejido necrótico.
- Se puede utilizar como antiséptico con seguridad y sin irritar, aún sobre mucosas, heridas y ulceraciones de la piel.
- Baxidin posee efecto residual.
- Transparente, no mancha y listo para su uso.

---

## Modo de uso

Consultar ficha técnica.

---

## Presentación

– Frasco por 60 mL con válvula

– Frasco por 120 mL con válvula

– Frasco por 300 mL con válvula tipo gatillo

– Frasco por 1 litro

– Garrafa por 4 litros

– Garrafa por 20 litros

---

## Registros

Reg. ICA N° 3392-DB

Reg. N° 2A-10523-AGROCALIDAD

Reg. N° CO34-15-01-3462

# meloxic®

**Meloxicam. 0,5% Inyectable.**

## COMPOSICIÓN:

Cada mL meloxic 0.5 % contiene
Meloxicam ..... 5 mg

meloxic 0.5 % es un fármaco antiinflamatorio no esteroide (AINEs) inhibidor COX-2 preferencial, enzima que induce la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos responsables del dolor, la inflamación y la fiebre; ejerciendo de este modo efectos antiinflamatorios, analgésicos, antiexudativos y antipiréticos.



## MELOXIC PERROS

- Es el fármaco de elección cuando el componente inflamatorio es predominante.
- Su registro de seguridad supera a los AINEs degeneraciones anteriores.
- Puede emplearse para el control del dolor post-operatorio o en casos de dolor crónico durante el período de tiempo prescripto.

## MELOXIC GATOS

- Hay un potencial considerable de toxicidad sobre los AINEs en gatos, sin embargo con una dosis apropiada y a intervalos adecuados, el meloxicam se puede utilizar de manera segura.
- Se usa ampliamente para el dolor agudo en el período perioperatorio y después del trauma.




## DOSIS

**PERROS:**
Dosis única de 0,2 mg/kg (0,4 mL/10 kg).
Vía intravenosa o subcutánea .

**GATOS:**
Dosis única de 0,3 mg/kg (0,6 mL/10 kg).
Vía subcutánea

**NOTA:** Como continuación del tratamiento inyectable, aplicar meloxic 0.15% suspensión oral, a partir del segundo día, a dosis de 0.1 mg / Kg. (1 gota /kg), cada 24 horas, durante 5 a 7 días, o según criterio del Médico Veterinario.

## PRESENTACIÓN:

Caja que contiene Frasco de 10 mL

www.laboratoriosprovet.com

Provet
Eficacia ante todo.

# GASA TEJIDA

## FICHA TÉCNICA

Medical Supplies

# GASA TEJIDA
## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| 1 NOMBRE PRODUCTO | Gasa tejida |
| 2 REGISTRO SANITARIO | INVIMA 2017DM-0000734-R1 |
| 3 MODALIDAD | Importar y vender |
| 4 VIGENCIA | 30/03/27 |
| 5 VENCIMIENTO | 5 años |
| 6 CLASIFICACIÓN DE RIESGO | IIa |
| 7 FABRICANTE | HUADA MEDICAL DRESSING CO.,LTD con domicilio en China<br>KINGSTAR MEDICAL (XIANNING) CO., LTD con domicilio en China |
| 8 COMPOSICIÓN | Producto 100% hilaza de algodón orgánico / 100% absorbente / Gasa tipo iv- vii- viii |
| 9 ASPECTO | Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas |
| 10 COLOR | Blanco |
| 11 OLOR | Inoloro |
| 12 TIPOS | Producto estéril y no estéril en gasas precortada, compresas, rollos compactos con radiopaco y sin radiopaco |
| 13 EMPAQUE | Papel con etiqueta, papel grado medico y bolsa plastica pigmentada |
| 14 USOS | Absorber sangre y fluidos, limpiar en operaciones quirúrgicas y también sirve para asistir heridas, también se utiliza en ginecología, urgencias, asepcia para sondas vesiculares, urología |

# GASA TEJIDA
## FICHA TÉCNICA

Medical Supplies

**15 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en un lugar fresco y seco. El producto no está estéril, si el paquete está abierto, dañado o húmedo

**16 DISPOSICIÓN FINAL**

No reutilizar. Eliminar como desecho orgánico

**17 LEGISLACIÓN APLICABLE**

NTC 2140 y USP vigente

**18 PRESENTACIONES COMERCIALES**

Gasa tejida 7.5x7.5 cm (3"x3") 8 pliegues paquete x 200 unidades no estéril
Gasa tejida 10x10 cm (4"x4") 8 pliegues paquete x 200 unidades no estéril
Gasa tejida 10x10 cm (4"x4") 16 pliegues paquete x 100 unidades no estéril
Rollo de gasa tejida 1x1 yardas 24 hilos - gasa aséptica hospitalaria x 1 und hilo de algodón 100%
Rollo de gasa tejida 1x5 yardas 24 hilos - gasa aséptica hospitalaria x 1 und hilo de algodón 100%
Rollo de gasa tejida 1/2x1 yardas 24 hilos - gasa aséptica hospitalaria x 1 und hilo de algodón 100%
Rollo de gasa tejida 1/2x5 yardas 24 hilos - gasa aséptica hospitalaria x 1 und hilo de algodón 100%
Rollo de gasa tejida x 100 yardas 24 hilos - gasa aséptica hospitalaria x 1 und hilo de algodón 100%
Rollo de gasa tejida x 100 yardas con hilo radiopaco 28 hilos - gasa aséptica hospitalaria x 1 und hilo de algodón - hilo radiopaco
Rollo de gasa tejida x 100 yardas 28 hilos - gasa aséptica hospitalaria x 1 und hilo de algodón 100%
Compresa 45cm x 45cm 4 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco paquete x 100 unidades no estéril
Compresa 45cm x 45cm 4 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco paquete x 5 unidades estéril
Gasa tejida 7.5x7.5 cm (3"x3") 8 pliegues sb x 2 unidades estéril
Gasa tejida 7.5x7.5 cm (3"x3") 8 pliegues sb x 3 unidades estéril
Gasa tejida 7.5x7.5 cm (3"x3") 8 pliegues sb x 5 unidades estéril
Gasa tejida 7.5x7.5 cm (3"x3") 8 pliegues sb x 10 unidades estéril
Gasa Tejida 10x10 cm (4"x4") 8 Pliegues Sb x 2 unidades estéril
Gasa Tejida 10x10 cm (4"x4") 8 Pliegues Sb x 3 unidades estéril
Gasa Tejida 10x10 cm (4"x4") 8 Pliegues Sb x 5 unidades estéril
Gasa Tejida 10x10 cm (4"x4") 8 Pliegues Sb x 10 unidades estéril
Gasa Tejida 10x10 cm (4"x4") 16 Pliegues Sb x 3 unidades estéril
Gasa Tejida 10x10 cm (4"x4") 16 Pliegues Sb x 4 unidades estéril
Gasa Tejida 10x10 cm (4"x4") 16 Pliegues Sb x 5 unidades estéril
Gasa tejida con radiopaco 7.5cm x 7.5cm (3"x3") 8 pliegues sb x3 estéril
Gasa tejida con radiopaco 7.5cm x 7.5cm (3"x3") 8 pliegues sb x 4 estéril
Gasa tejida con radiopaco 7.5cm x 7.5cm (3"x3") 8 pliegues sb x 5 estéril
Gasa tejida con radiopaco 7.5cm x 7.5cm (3"x3") 8 pliegues sb x 10 estéril
Gasa tejida con radiopaco 7.5cm x 7.5cm (3"x3") 16 pliegues sb x 3 estéril
Gasa tejida con radiopaco 7.5cm x 7.5cm (3"x3") 16 pliegues sb x 4 estéril
Gasa tejida con radiopaco 7.5cm x 7.5cm (3"x3") 16 pliegues sb x 5 estéril

# GASA TEJIDA
## FICHA TÉCNICA

Medical Supplies

### 18 PRESENTACIONES COMERCIALES

Gasa tejida con radiopaco 10cm x 10cm (4"x4") 8 pliegues sb x 4 estéril
Gasa tejida con radiopaco 10cm x 10cm (4"x4") 8 pliegues sb x 5 estéril
Gasa tejida con radiopaco 10cm x 10cm (4"x4") 8 pliegues sb x 10 estéril
Gasa tejida con radiopaco 10cm x 10cm (4"x4") 16 pliegues sb x 3 estéril
Gasa tejida con radiopaco 10cm x 10cm (4"x4") 16 pliegues sb x 4 estéril
Gasa tejida con radiopaco 10cm x 10cm (4"x4") 16 pliegues sb x 5 estéril
Gasa tejida con radiopaco 10cm x 10cm (4"x4") 16 pliegues sb x 10 estéril
Compresa 45cm x 45cm 6 capas con y manija sujeción y cinta radiopaco paquete x 100 producto no estéril
Compresa 45cm x 45cm 6 capas con y manija sujeción y cinta radiopaco 1 unidad producto estéril
Compresa 45cm x 45cm 6 capas con y manija sujeción y cinta radiopaco 2 unidad producto estéril
Compresa 45cm x 45cm 6 capas con y manija sujeción y cinta radiopaco 5 unidad producto estéril
Torunda de gasa con radiopaco sb x 4 estéril
Torunda de gasa con Radiopaco sb x 5 estéril
Torunda de gasa con radiopaco sb x 6 estéril
Rollo de gasa x 90 yardas 24 hilos x 1 unidad no estéril
Rollo de gasa x 90 yardas 28 hilos x 1 unidad no estéril
Rollo de gasa x 90 yardas 28 hilos con radiopaco x 1 unidad no estéril
Compresa 45cm x 45cm 4 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco sb x 1 estéril
Compresa 45cm x 45cm 4 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco sb x 2 estéril
Compresa 45cm x 45cm 4 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco sb x 3 estéril
Compresa 45cm x 45cm 6 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco sb x 1 estéril
Compresa 45cm x 45cm 6 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco sb x 2 estéril
Compresa 45cm x 45cm 6 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco sb x 2 estéril
Rollo de gasa tejida x 100 yardas - gasa aséptica hospitalaria hilo de algodón 100%

# FICHA TÉCNICA

## 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Cefalexina Normon 500 mg cápsulas duras.

## 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada cápsula de **Cefalexina Normon 500 mg cápsulas duras** contiene 500 mg de cefalexina como cefalexina monohidrato.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

## 3. FORMA FARMACÉUTICA

Cápsulas duras de color verde opaco/amarillo opaco y tamaño nº 0L

## 4. DATOS CLÍNICOS

### 4.1. Indicaciones terapéuticas

La cefalexina está indicada en adolescentes (de 12 a < 18 años) y en adultos en el tratamiento de las siguientes infecciones debidas a microorganismos sensibles, (ver sección 5.1. Propiedades farmacodinámicas):

- Faringoamigdalitis causada por *Streptococcus* del grupo A y otitis media aguda.
- Exacerbación de la bronquitis crónica y neumonía leve o moderada adquirida en la comunidad.
- Impétigo, celulitis, Erisipela.
- Absceso cutáneo complicado, Foliculitis extensa, Forúnculo abcesificado.
- Cistitis y prostatitis aguda.

Se deben tener en cuenta las las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de los agentes antibacterianos.

### 4.2. Posología y forma de administración

Posología
La dosis y pauta de administración se establecen según la gravedad de la infección, la sensibilidad del microorganismo responsable, la edad, el peso y el estado general del paciente.

*Adultos y adolescentes de 12 años y mayores*
La dosis recomendada oscila entre 1 a 4 g al día en dosis fraccionadas. La mayoría de las infecciones responden a la dosis de 500 mg cada 8 horas. Para infecciones de piel y partes blandas, faringoamigdalitis estreptocócica e infecciones respiratorias leves no complicadas la dosis habitual es de 250mg cada 6 horas ó 500 mg cada 12 horas.

En infecciones más graves o en las causadas por microorganismos menos sensibles puede ser necesaria la administración de dosis mayores. Cuando sea necesario administrar dosis superiores a 4g de cefalexina, se debe considerar la administración de una de las cefalosporinas inyectables a las dosis apropiadas.

La duración habitual del tratamiento es de 7 a 14 días. En infecciones casusadas por *Streptococcus* del grupo A, la duración del tratamiento debe ser de al menos 10 días.

Insuficiencia renal
Es necesario ajuste de dosis en insuficiencia renal de moderada a grave (ver sección 4.4).

Pacientes de edad avanzada
La dosis recomendada en pacientes de edad avanzada con función renal normal es la misma que para adultos. En caso de  caso de insuficiencia renal, ver sección 4.4.

Población pediátrica
*Recién nacidos, lactantes y niños menores de 12 años*

El uso de Cefalexina cápsulas no es adecuado para el tratamiento de niños menores de 12 años o para adolescentes que no puedan tragar las cápsulas enteras.

La dosis diaria recomendada es de 25 a 50 mg/kg dividida en varias dosis iguales.

En las infecciones graves, estas dosis pueden aumentarse a 50-100 mg/kg divididas en varias dosis iguales.

En el tratamiento de la otitis media  cuando el microorganismo causal no haya sido determinado, se recomiendan dosis diarias de 75 mg a 100 mg por kg de peso, fraccionados en 2 a 4 dosis.

En ningún caso se debe superar la dosis máxima recomendada para adultos.

Forma de administración

Cefalexina Normon se administra por vía oral. Las cápsulas se deben tragar enteras.

## 4.3. Contraindicaciones

Hipersensibilidad a cefalexina, a cualquier otra cefalosporina o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

## 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo

Antes de empezar el tratamiento con Cefalexina Normon 500 mg cápsulas duras, se debe tratar en lo posible, de determinar si el paciente ha experimentado anteriormente reacciones de hipersensibilidad a cefalexina, cefalosporinas, penicilinas u otros medicamentos. Si se considera imprescindible administrar este fármaco en pacientes alérgicos a la penicilina, deberá hacerse con extrema precaución ya que se han documentado reacciones cruzadas de hipersensibilidad, incluyendo anafilaxia, entre los antibióticos β-lactámicos.

También debe ser administrado con cautela a cualquier paciente que haya mostrado alguna forma de alergia.

Si se produce una reacción alérgica a cefalexina se debe suspender el tratamiento antibiótico e instaurar el tratamiento adecuado.

Al igual que con otros antibióticos de amplio espectro, se han descrito casos de colitis pseudomembranosa. Por tanto, es importante considerar este diagnóstico en los pacientes que desarrollen una diarrea durante o después del tratamiento con antibióticos. La gravedad de la colitis puede ir de leve a fatal. Los casos leves de colitis pseudomembranosa normalmente se resuelven con la suspensión del tratamiento antibiótico. En los casos moderados o graves puede ser necesario instaurar las medidas terapeuticas adecuadas. Los medicamentos que inhiben el peristaltismo están contraindicados en esta situación.

Al igual que con otros antibióticos, la utilización prolongada de cefalexina puede ocasionar una proliferación de microorganismos no sensibles. Es esencial la vigilancia atenta del paciente. Si se produjera una sobreinfección durante el tratamiento, se deben tomar las medidas apropiadas.

Cefalexina no se debe usar para el tratamiento de infecciones causadas o que se sospeche que son causadas por *Haemophilus influenzae.*

Cefalexina debe ser administrado con precaución a los pacientes con una marcada insuficiencia de la función renal; dichos pacientes deben ser observados de cerca y se deben efectuar pruebas analíticas, dado que la dosis apropiada puede ser menor que la dosis habitual recomendada.

Interferencias con pruebas de laboratorio
Se han detectado pruebas de Coombs directa positivas durante el tratamiento con las cefalosporinas, por lo que puede haber interferencia en estudios sanguíneos y en las pruebas de compatibilidad sanguínea.

Cefalexina puede generar falsos-positivos en los test utilizados para medir la glucosa en la orina, cuando se utilizan las soluciones de Benedict, Fehling o con las tabletas de sulfato de cobre.

Se ha notificado pustulosis exantemática generalizada aguda (PEGA) asociada al tratamiento con cefalexina.

En el momento de la prescripción, se debe informar a los pacientes de los signos y síntomas y vigilarles de forma cuidadosa por si aparecen reacciones cutáneas.

Si aparecen signos y síntomas que sugieran estas reacciones, se debe retirar de forma inmediata cefalexina y considerar un tratamiento alternativo.
La mayoría de estas reacciones se producen con mayor probabilidad durante la primera semana tratamiento.

## 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Como en el caso de otros betalactámicos la administración concomitante con probenecid inhibe la excreción renal de cefalexina.

La administración concomitante de determinados fármacos, como los aminoglucósidos, furosemisa u otros diuréticos de potencia semejante pueden aumentar el riesgo de toxicidad.

En un estudio con 12 sujetos sanos a los que se les administraron dosis únicas de 500 mgde cefalexina y metformina, se observó un incremento medio de la $C_{máx}$ y AUC de metformina en plasma, del orden del 34% y 24% respectivamente así como un descenso medio en la aclaración renal de metformina del 14%. La significación clinica de este estudio no está clara, ya que no se han notificado casos de acidosis láctica con la administración concomitante de cefalexina y metformina.No se dispone de información sobre la interacción entre cefalexina y metformina tras la administración de dosis múltiples.

Se han descrito casos aislados de disminución de la eficacia de los anticonceptivos orales que contienen estrógenos por la cefalexina.

## 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia

Embarazo

Cefalexina atraviesa la barrera placentaria.
Los estudios realizados en animales de experimentación no han indicado efectos nocivos sobre el feto. Sin embargo, no existen estudios adecuados y perfectamente controlados en mujeres embarazadas. Puesto que los estudios en animales no siempre predicen la respuesta en humanos, cefalexina solamente se debe administrar durante el embarazo si es claramente necesario.

Lactancia

Cefalexina se excreta en pequeñas cantidades por la leche materna. Tras la administración de una dosis de 500 mg, el fármaco alcanzó un nivel máximo de 4 mcg/ml, disminuyendo a continuación de forma gradual, y habiendo desaparecido a las 8 horas de su administración. Se debe administrar con precaución a mujeres en periodo de lactancia (ver apartado 5.2).

## 4.7. Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria

La influencia de Cefalexina Normon sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

## 4.8. Reacciones adversas

Los efectos adversos que han sido notificados en ensayos de cefalexina están categorizados debajo, de acuerdo a las clases de órganos de sistemas y frecuencias.
Las diferentes frecuencias son definidas como:

-Muy frecuentes (≥ 1/10);
-Frecuentes (≥1/100, < 1/100)
-Poco frecuentes (≥1/1.000, < 1/100);
-Raras (≥ 1/10.000, < 1/1.000)
-Muy raras (<1/10.000),
-Frecuencia desconocida (no pueden ser estimado a partir de datos disponibles)

Los efectos adversos para cefalexina ocurren con una frecuencia del 3-6%

| | |
|---|---|
| **Exploraciones complementarias:** | |
| Poco frecuentes | Incremento del ASAT y ALAT (reversible) |
| Frecuencia no conocida | Prueba directa de Coombs positiva. Falso positivo a la glucosa en la orina |
| **Trastornos de la sangre y del sistema linfático** | |
| Poco frecuentes<br>Raras | Eosinofilia<br>Neutropenia, trombocitopenia, anemia hemolítica |
| **Trastornos del sistema nervioso** | |
| Raras: | Mareos, dolor de cabeza |
| **Trastornos gastrointestinales** | |
| Frecuentes<br>Raras | Diarrea, náuseas<br>Dolor abdominal, vómitos, dispepsia, colitis pseudomenbranosa |
| **Trastornos renales y urinarios** | |
| Raras | Nefritis intersticial reversible |
| **Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo** | |
| Poco frecuentes | Rash cutáneo, urticaria, prurito |
| Raras | Síndrome de Stevens-Johnson, eritema fultiforme, Necrólisis epidérmica tóxica |

| | |
|---|---|
| Frecuencia no conocida | (Síndrome de Lyell)<br>Pustulosis exantemática generalizada aguda (PEGA) |
| **Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo** | |
| Frecuencia no conocida | Artralgia, artritis |
| **Infecciones e infestaciones** | |
| Raras<br>Frecuencia no conocida | Prurito anal y genital, vaginitis<br>Candidiasis vaginal |
| **Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración** | |
| Raras<br>Frecuencia no conocida | Cansancio,<br>Fiebre |
| **Trastornos del sistema inmunológico** | |
| Raras: | Anafilaxia |
| **Trastornos hepatobiliares** | |
| Raras: | Hepatitis, ictericia colestásica |
| **Trastornos psiquiátricos** | |
| Frecuencia no conocida | Alucinaciones, agitación, confusión |

**Notificación de sospechas de reacciones adversas**
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es.
Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento

### 4.9. Sobredosis

Sígnos y síntomas .Pueden aparecer náuseas, vómitos, molestias epigástricas, diarrea y hematuria.

Tratamiento: En presencia de cualquiera de estos síntomas se aconseja prestar al paciente los cuidados de soporte adecuados. La absorción de fármacos desde el aparato gastrointestinal puede verse disminuida al administrar carbón activado. La diuresis forzada, diálisis peritoneal, la hemodiálisis o la hemoperfusión con carbón activado no han demostrado ser beneficiosos en el tratamiento de una sobredosis de cefalexina.

## 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

### 5.1. Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: Antibacterianos de uso sistémico, cefalosporinas de primera generación.
Código ATC: J01DB01

Mecanismo de acción
Al igual que otros fármacos betalactámicos, la cefalexina ejerce una acción bactericida, ya que inhibe la síntesis de peptidoglicano de la pared celular bacteriana mediante la unión a las proteínas de unión a penicilinas (PBPs) lo que conduce a la muerte y lisis de la célula bacteriana.

Mecanismo de resistencia

La resistencia bacteriana a cefalexina puede ser debida a uno o más mecanismos de los siguientes:

- Hidrósisis por betalactamasas. La cefalexina puede ser hidrolizada por ciertas betalactamasas de espectro extendido (BLEEs) y por la betalactamasa cromosómicamente AmpC.

- Disminución de la afinidad de las proteínas que se unen a penicilinas (PBPs) por cefalexina.
- Disminución de la permeabilidad de la membrana externa, lo que dificulta el acceso de la cefalexina a las PBPs en microorganismos.

**Sensibilidad**

*Puntos de corte de sensibilidad*
Los puntos de corte de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), establecidos por el "European Committe on Susceptibility Testing (EUCAST) para cefalexina son los siguientes (versión 7, enero 2017):

| | **CMI (mg/L)** | |
|---|---|---|
| **Microorganismo** | **Sensible** | **Resistente** |
| Enterobacteriaceae spp[1]. | ≤ 16 | > 16 |

1. Solamente para infecciones del tracto urinario no complicadas

La sensibilidad de *Staphyloccus* spp. a cefalexina se infiere de la sensibilidad a cefoxitina..
La sensibilidad de *Streptococcus* de los grupos A, B, C y G a cefalexina se infiere de su sensibilidad a bencilpenicilina.

La prevalencia de resistencias adquiridas puede variar geográficamente y con el tiempo para especies determinadas, siendo deseable obtener información de resistencias a nivel local, particularmente cuando se trata de infecciones graves. La información que se proporciona a continuación solamente constituye una guía aproximada sobre las probabilidades de que los microorganismos sean sensibles o no a cefalexina.

| **Sensibilidad** |
|---|
| ***Especies comunmente sensibles*** <br><br> **Gram-positivos aerobios** <br> *Staphylococcus aureus* (cepas sensibles a meticilina) <br> *Streptococcus pneumonia*e(cepas sensibles a penicilina) <br> *Streptococcus pyogenes* <br> *Streptococcus agalactiae* <br><br> **Gram-negativos aerobios** <br> *Escherichia coli* <br> *Klebsiella spp* <br> *Proteus mirabilis* <br><br> **Anaerobios** <br> *Peptostreptococcus* spp |
| ***Especies comunmente resistentes*** <br><br> **Gram-positivos aerobios** <br> Enterococcus faecalis <br> Estafilococos meticilin-resistentes <br> *Streptococcus pneumoniae* resistentes a penicilina <br><br> **Gram-negativos aerobios** <br> *Pseudomonas* spp. <br> *Proteus vulgaris* <br> *Morganella morganii* <br> *Acinetobacter* spp <br> *Enterobacter spp* <br> *Haemophilus influenzae* <br> *Moraxella catarrhalis* <br> *Citrobacter spp* |

El *Streptococcus pneumoniae* resistente a penicilina presenta normalmente una resistencia cruzada a los antibióticos β-lactámicos.

### 5.2. Propiedades farmacocinéticas

Absorción:

La cefalexina es estable en medio ácido. Se absorbe casi por completo en el tubo digestivo y produce una concentración plasmática máxima de alrededor de 18 µg/ml 1 hora después de una dosis oral de 500 mg. Si se dobla la dosis, se dobla la concentración máxima. Si la cefalexina se toma con alimentos, la absorción se puede retrasar, pero la cantidad total absorbida no se altera apreciablemente. Hasta el 15% de una dosis se una a las proteínas plasmáticas. La semivida en plasma es de alrededor de 1 hora y se incrementa en caso de alteraciones de la función renal.

Distribución:

La cefalexina se distribuye ampliamente en el organismo, pero no alcanza el LCR en cantidades significativas. Atraviesa la barrera placentaria y se elimina en pequeñas cantidades por la leche materna.

Metabolismo:

La cefalexina no se metaboliza

Eliminación:

Aproximadamente, el 90% o más de una dosis se excreta inalterada por la orina en las primeras 8 h, por filtración glomerular y secreción tubular. Se alcanzan concentraciones urinarias mayores de 1 mg/ml después de una dosis de 500 mg. El probenecid retrasa la excreción urinaria. Pueden encontrarse concentraciones terapéuticamente eficaces en la bilis, y una parte se excreta por esta vía.

### 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad

Carcinogénesis, mutagénesis y alteración de la fertilidad.- Los estudios de fertilidad y comportamiento reproductivo en ratas y ratones no se vieron afectadas por dosis orales de cefalexina de 250 ó 500 mg/kg.

## 6. DATOS FARMACÉUTICOS

### 6.1. Lista de excipientes

- Estearato de magnesio.
- Cápsula de gelatina:
    - gelatina,
    - carmín de índigo (E-132),
    - amarillo de quinoleína (E-104),
    - óxido de hierro amarillo (E-172) y,
    - dióxido de titanio.

### 6.2. Incompatibilidades

Es incompatible la administración simultánea de este preparado con bacteriostáticos, anticoagulantes, potentes diuréticos (furosemida, ácido etacrínico) y agentes con nefrotoxicidad potencial.

### 6.3. Período de validez

2 años.

### 6.4. Precauciones especiales de conservación

Conservar por debajo de 30º C.

### 6.5. Naturaleza y contenido del envase

Envases tipo blister de PVC/Al conteniendo 12 y 500 comprimidos (envase clínico).

### 6.6. Precauciones especiales de eliminación

Ninguna especial.

## 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS Normon, S.A.
Ronda de Valdecarrizo, 6 – 28760 Tres Cantos – Madrid (ESPAÑA)

## 8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

54.302

## 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/REVALIDACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Fecha primera Autorización: 1 de Septiembre 1978.
Fecha última Revalidación: Junio de 2008.

## 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO

Mayo 2018

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/

# FICHA TÉCNICA

ROXICAINA 2% EPINEFRINA VIAL X 50 ML
AR 411 ANEXO No. 084 A V.00

| | |
|---|---|
| Titular Registro Sanitario | ROPSOHN THERAPEUTICS SAS |
| Registro Sanitario | INVIMA 2009M-010167-R2 / Fabricar y vender |
| Vía de administración | Infiltrativa - Bloqueos |
| Indicaciones | Anestésico local |
| Presentación comercial | Caja x 1 frasco vial x 50 mL |
| Composición | Cada 1 mL contiene Lidocaína Clorhidrato Monohidrato equivalente a Lidocaína Clorhidrato 20 mg; Epinefrina Bitartrato equivalente a Epinefrina base 5 mcg |



info@soydelcampo.com

CICATRIZANTE

# ALFA 3 CREMA

LABORATORIOS ZOO S.A.S.



Vademécum Veterinario

## ALFA 3 CREMA

CICATRIZANTE




Laboratorio

**LABORATORIOS ZOO S.A.S.**

Dg. 30 C 3 A - 36 BogotÃ¡ - Colombia
Teléfono: +(571)5665397
Fax: +(571)2887323
Mail: laboratorioszoo@laboratorioszoo.com
Sitio web: www.laboratorioszoo.com

**Uso terapéutico:** CICATRIZANTE

**Principio Activo:** OXIDO DE ZINC, ACEITE DE PINO, ACIDO FENICO

**Especies:** Bovinos, Caninos, Caballos, Caprinos, Ovinos, Porcinos

| | |
|---|---|
| *Ácido fénico* | *1.5 g* |
| *Óxido de zinc* | *7 g* |
| *Aceite de pino* | *2 g* |
| *Excipientes csp* | *100 g* |

- ***ACCIÓN**: Cicatrizante, secante, desinfectante y repelente de insectos*
- ***INDICACIONES**: En bovinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos y caninos como cicatrizante, antiséptico, secante y repelente de insectos.*
  *Desinfección, secado y estimulación de la cicatrización en todo tipo de heridas. Actúa como repelente de insectos, impide el desarrollo de miasis (gusaneras). Útil en desgarres de la piel, heridas y grietas en glándula mamaria (ubres y pezones), úlceras causadas por sillas y arneses, infecciones del ombligo (onfalitis), caudectomías (corte de cola en ovejas), y en heridas quirúrgicas, para lograr una cicatrización rápida sin infección.*
  *Alfa-3 mezclado con productos insecticidas de uso tópico que contengan coumafós, diazinón, metrifonato y diclorvós es útil para el tratamiento de las miasis (gusaneras).*
- ***DOSIS**: Aplicar una cantidad suficiente para cubrir el área afectada con una capa uniforme de crema.*
  *Aplicar uniformemente sobre la herida, 3 - 5 veces al día, durante 7 días seguidos como mínimo. En caso de heridas contaminadas: lavar la zona afectada con jabón o soluciones antisépticas, secar y aplicar AlfaA-3 hasta la cicatrización de la herida.*
- ***TIEMPO DE RETIRO**: No posee*
- ***CONTRAINDICACIONES:** Cuando se utilice en glándula mamaria, aplicar después del ordeño. No aplicar en gatos. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.*
- ***MODO DE APLICACIÓN**: Crema tópica*
- ***PRESENTACIÓN**: Tubo colapsible por 30 mL Frasco plástico por 250 mL.*
- ***REGISTRO**: 1869 DB*

AVISO LEGAL: La información y contenidos presentados son a título informativo y educativo y no deben emplearse para la utilización de los productos. La información e indicaciones es suministrada por el fabricante o importador, no se asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones de los contenidos aquí publicados ni por el uso o decisiones que tome el usuario de la información. Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido o diseño de esta página. Soy del Campo, su logotipo y nombre son marcas registradas.

Gracias por consultar ALFA 3 CREMA en nuestro vademécum Veterinario, esperamos que ALFA 3 CREMA sea lo que estaba buscando. Recuerde que en nuestro vademécum Veterinario podrá encontrar toda la información de cualquier producto tal cual se muestra la de ALFA 3 CREMA.

Buscar

## Filtros

Vedemécum Productos −

Veterinario

AgrÃcola

Especies +

## PRODUCTOS DESTACADOS




**BRILLAPEL EMULSION**
VITAMINICO MINERAL ACIDOS GRASOS, Veterinario



**NOFLAI**
INSECTICIDA, Veterinario



**AMINOACIDOS VIT**
VITAMINICO MINERAL AMINOACIDOS, Veterinario



**AUROVITEL**
VITAMINICO MINERAL, Veterinario

info@soydelcampo.com

ECTOPARASITICIDA

# AMITRAZ 20.8% EC AGROZ

AGROQUIMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA S.A. AGROZ S.A.



Vademécum Veterinario

## AMITRAZ 20.8% EC AGROZ

ECTOPARASITICIDA




Laboratorio

### AGROQUIMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA S.A. AGROZ S.A.

Km 1 Vía Espinal Ibague Colombia
Teléfono: +(82)485584
Fax: +(82)483930
Mail: info@agroz.com.co
Sitio web: www.agroz.com.co

**Uso terapéutico:** ECTOPARASITICIDA

**Principio Activo:** AMITRAZ

**Especies:** Bovinos

**Descripcion:**

***AMITRAZ 20.8% EC AGROZ*** *es un baño insecticida*

| Composición | Contenido |
|---|---|
| Amitraz | 208 g |
| Aditivos csp | 1.000 ml |

- ***ACCIÓN****: Garrapaticida*
- ***INDICACIONES****: Garrapaticida con mayor poder en control de Boophilus microplus y Amblyomma cajenense, usar en sistema de aspersión.*
- ***DOSIS****: Mezclar 1 Litro de amitraz E.C. 20.8% AGROZ por 1000 Litros de agua, inmediatamente antes de bañar el ganado, para evitar que el producto se degrade. Las cantidades que sobren después del baño deben eliminarse. Para el control de Boophilus microplus bañar cada 21 días. Para el control de Amblyomma cajennense bañar cada 7 días. Aproximadamente con 4 Litros de la mezcla es suficiente para bañar un animal adulto.*
- ***TIEMPO DE RETIRO****: Los animales tratados con el producto no deben ser sacrificados para el consumo humano dentro de 14 días siguientes al tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.*
- ***CONTRAINDICACIONES Y PRECUACIONES:*** *Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No use el producto en animales diferentes a los bovinos. No trate animales menores a tres meses.*
- ***MODO DE APLICACIÓN****: Concentrado emulsionable*
- ***PRESENTACIÓN****: Frasco por 20 ml, 100, 500 y 1.000 ml*
- ***REGISTRO****: 6236 MV*

AVISO LEGAL: La información y contenidos presentados son a título informativo y educativo y no deben emplearse para la utilización de los productos. La información e indicaciones es suministrada por el fabricante o importador, no se asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones de los contenidos aquí publicados ni por el uso o decisiones que tome el usuario de la información. Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido o diseño de esta página. Soy del Campo, su logotipo y nombre son marcas registradas.

Gracias por consultar AMITRAZ 20.8% EC AGROZ en nuestro vademécum Veterinario, esperamos que AMITRAZ 20.8% EC AGROZ sea lo que estaba buscando. Recuerde que en nuestro vademécum Veterinario podrá encontrar toda la información de cualquier producto tal cual se muestra la de AMITRAZ 20.8% EC AGROZ.

Buscar

## Filtros

Vedemécum Productos −

Veterinario

Agrícola

Especies +

## PRODUCTOS DESTACADOS




**BRILLAPEL EMULSION**
VITAMINICO MINERAL ACIDOS GRASOS, Veterinario




**OLIVITASAN**
VITAMINICO MINERAL, Veterinario




**ENERGYN**
VITAMINICO, AMINOACIDOS, Veterinario




**NOFLAI**
INSECTICIDA, Veterinario




**AMINOACIDOS VIT**
VITAMINICO MINERAL AMINOACIDOS, Veterinario

# COMPLEMIL ORAL

VITAMINICO MINERAL




Laboratorio

## KYROVET LABORATORIES S. A.

KR 65 B 17 - 59 Bogotá - Colombia

Teléfono: (571)7424842

Fax: (571)4176375

Mail: kyrovet@kyrovet.com

Sitio web: www.kyrovet.com

**Uso terapéutico:** VITAMINICO MINERAL

**Principio Activo:** VITAMINA B1, B2, B3, B6, B12, CALCIO, POTASIO, SODIO, MANGANESO

**Descripcion:**

***COMPLEMIL ORAL*** *es un vitamínico* y mineral

| Composición | Contenido |
|---|---|
| Tiamina | 150 mg |
| Riboflavina | 72 mg |
| Piridoxina | 72 mg |
| Cianocobalamina | 1.4 mg |
| Nicotinamida | 550 mg |
| Glicerofosfato de calcio | 1.000 mg |
| Glicerofosfato de manganeso | 100 mg |
| Glicerofosfato de sodio | 1.800 mg |
| Glicerofosfato de potasio | 100 mg |
| Excipientes csp | 100 ml |

- ***ACCIÓN****: Vitamínico* y mineral
- ***INDICACIONES****: COMPLEMIL ORAL es un multivitamínico y multimineral en solución, el cuál favorece la recuperación de animales en estado consuntivo derivado de enfermedades parasitarias e infecciosas, así como proveniente de las deficiencias de los minerales y vitaminas presentes en la formulación. Coadyuvante en el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas y minerales presentes en la fórmula y en el tratamiento de enfermedades infecciosas o parasitarias. El producto está indicado en periodos de gestación a las dosis sugeridas.*
- ***DOSIS****: La frecuencia y duración de la administración es a criterio del médico veterinario.*

  *Se recomiendan las siguientes dosis promedio:*
  *Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos: 20 mL por cada 100 kg*
  *Perros razas pequeñas: Cachorros 2- 5 mL Adultos 5-10 mL*
  *Perros razas grandes: Cachorros 5-10 mL Adultos 10-15 mL*
  *Gatos 2-5 mL*
  *Aves 1 litro por 400 litros de agua de bebida.*

- ***TIEMPO DE RETIRO****: No tiene tiempo de retiro*
- ***CONTRAINDICACIONES****: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en lugar fresco y seco, protegido de la luz.*
- ***MODO DE APLICACIÓN****: Solución oral*
- ***PRESENTACIÓN****: Frasco por 100, 1.000 y 4.000 mL*
- ***REGISTRO****: DB*

# FICHA TECNICA

Medtronic

## POLYSORB
## MULTIFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE

LAT-CO-SI-0006-R1



| 1. Información General | |
|---|---|
|  | |
| Producto (Según Registro Sanitario) | Sutura Absorbible Trenzada Polysorb |
| Nombre Comercial | Polysorb Multifilamento Sintetico Absorbible |
| Marcas | Polysorb, Covidien, Medtronic |
| Fabricante Legal | Medtronic INC, USA |
| Número de Registro Sanitario | INVIMA 2017DM-0000578-R2 |
| Fecha de expiración del Registro Sanitario | 6-Marzo- 2027 |
| Clasificación del riesgo | III |
| Código GMDN | 17471 |
| **2. Especificaciones** | |
| Composición | Copolimero de Glicolido de Lactato/Láctido. Copolimero de Caprolactona/Glicolida y Estearoil Lactilato de Calcio. |
| Presentación Comercial | Caja por 1, 2 y 3 docenas |
| Condiciones de Almacenamiento | Temperatura 20-25°C<br>Humedad relativa permanente Máximo 65%.<br>No debe exponerse a luz solar directa, ni luces brillantes. Almacenarse en estibas de madera o plástico a 10 cm del suelo. |
| Método de esterilización | Óxido de Etileno |
| Vida Útil | 5 Años |
| Referencias | |

**Asuntol® Jabón**
Coumaphos
Jabón
Uso tópico
**REGISTRO:** 3B1-5310-AGROCALIDAD

**DESCRIPCIÓN:**
Jabón ectoparasiticida (uso tópico) para el tratamiento, limpieza y protección del perro.
El efecto ectoparasiticida de Asuntol® Jabón se manifiesta rápidamente, y los aceites esenciales contenidos en su formulación confieren brillo y olor agradable al pelaje de sus animales.
El Asuntol® Jabón es perfectamente tolerado y es un valioso auxiliar en el tratamiento de la sarna superficial y otros ectoparásitos de los perros.
Su efecto residual permanece por varios días, sin embargo, en casos de reinfestaciones puede repetirse el tratamiento tan seguido como sea necesario.
Asuntol® Jabón no es arrastrado por el agua de lluvia, una vez seco el animal.

**USO:**
Perros

**COMPOSICIÓN:**
Cada jabón contiene coumaphos 1g, aceites esenciales y perfume.

**INDICACIONES:**
Asuntol® Jabón está indicado para la limpieza, tratamiento y protección del perro contra pulgas (*Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis*), piojos (*Trichodectes canis, Linognathus setosus*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*).

**MODO DE EMPLEO**
Inicialmente se debe mojar bien al perro, enjabonarlo hasta obtener abundante espuma. Dejar actuar por 5 minutos, luego enjuagar con bastante agua y repetir la operación.

**PRECAUCIONES:**
Lea la etiqueta antes de usar el producto.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No utilizar en Gatos
Antídoto: Sulfato de atropina al 1%. Dosis de atropina para humanos: 0,2 ml (2 mg) cada hora hasta la desaparición de los síntomas.Vía intramuscular.

**ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:**
Mantener en un lugar seco y fresco.

ÓTICOS

# OFTALMOSYN®

**Solución Ótico-Oftálmica**




Gato Perro

## Indicaciones

En Perros y Gatos indicado en el tratamiento de afecciones de ojos y oídos como: Blefaritis, conjuntivitis, queratitis y otitis externa y media en donde estén involucrados microorganismos sensibles a la Gentamicina.

## Composición

Cada mL de solución contiene:
Gentamicina Base (Como Gentamicina Sulfato 5 mg).....3 mg
Dexametasona Fosfato Sódico.....1 mg
Lidocaína Clorhidrato.....5 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

## Uso en

Caninos y Felinos.

## Dosis y administración

Instilar en el ojo afectado 1 a 2 gotas, 2 o 3 veces por día. En casos de otitis administrar en el oído 4 a 5 gotas, 2 ó 3 veces por día. Previa limpieza del canal auditivo. La frecuencia y duración del tratamiento se hará según criterio del médico veterinario.

**Precauciones**

No utilizar en presencia de úlceras cornéales

**Presentación**

Frasco gotero por 10 mL.

**REGISTRO ICA No. 3098 DB**

Leer menos ▲

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Filtrar ▼




EASOTIC®

Leer más




EPIOTIC® SIS

Leer más

Todos los productos complementarios

🚚 Realizamos envíos a todo Ecuador 🚚

Código PRIMERACOMPRA en tu primer pedido




Contacto

1 / 1

# Ceruline Solución auricular por 120ml

$11.00 USD

Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

Cantidad

− 1 +

EN EXISTENCIAS

Agregar al carrito

Comprar ahora

Retiro disponible en Guayaquil Centro-Sur

Normalmente está listo en 1 hora

Ver información de la tienda

Ceruline es una solución cuyos principios activos están debidamente protegidos en una base de agentes emulgentes que atenúan la acción irritante de los ácidos, evitando que el producto final irrite los tejidos del canal del oído. Se presenta en un frasco de plástico blanco, con una tapa dosificadora que facilita la aplicación con el sistema Open-Twist-Close, en donde el pico superior gira de izquierda a derecha y permite la salida del líquido en forma gradual.

COMPOSICIÓN Cada 100 ml contienen Acido bórico 2 g Acido acético 2 g Acido salicílico 0.1 g Excipientes c.s.p. 100 ml

INDICACIONES Y USOS En Perros y Gatos, limpiador auricular y como adyuvante para remover material celular y cerumen. Limpieza de rutina y control de olores en el canal del oído. También puede emplearse después del baño y para facilitar el examen de oído

Comparte

**Asesoramiento de compra**

**A la puerta de tu casa en menos de 24 horas**

**Envíos seguros**

**Entregas sólo en Ecuador**

## Otros productos para




**Nexgard Spectra 7.5 a 15kg Desparasitante para perros interno y externo**

$25.35 USD




**Orenda solución ótica para mascotas de 100ml**

$12.50 USD




**Rivolta 12% para perros de 20-40kg**

$14.25 USD




**Otiflex C de 25 ml**

$16.50 USD

## Únete a nuestro newsletter

y obtén noticias y promociones exclusivas.

Email

## Cosas aburridas :/

Búsqueda

Métodos de pago

Términos del servicio

Política de reembolso

Políticas de Envío

Políticas de Privacidad

Horarios de atención

© 2026, AvicMartin Farmacia Veterinaria Tecnología de Shopify · Política de reembolso · Política de privacidad · Términos del servicio · Política de envío · Información de contacto

# JERINGA CON AGUJA 5mL

| | |
|---|---|
| SAPCODE | JD-05L2138-JB |
| ASOCIADO AL GRUPO | Dispositivos de Inyección |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | Jeringa con aguja 5mL |
| PROPÓSITO | Se utilizan para para la inyección intercutánea, hipodérmica intramuscular y venosa de fluidos y medicamentos. |



## 1. PRODUCTO
Jeringa con aguja 5mL

## 2. MARCA
Nipro

## 3. FABRICANTE Y ORIGEN
Jiangsu Jichun Medical Devices CO. LTD. China.

## 4. REGISTRO SANITARIO

| | |
|---|---|
| REGISTRO SANITARIO INVIMA No. | **2018DM-0018552** |
| VIGENCIA | 04 de septiembre de 2028 |
| CLASIFICACIÓN DE RIESGO | IIA (Riesgo Moderado) Es un dispositivo médico de riesgo moderado, sujeto a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. |

## 5. PARTES PRINCIPALES Y COMPONENTES

| No | PARTES | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Émbolo | PP (polipropileno) |
| 2 | Barril | PP (polipropileno) |
| 3 | Anillo | Látex natural / Caucho sintético (sin látex) |
| 4 | Aguja | Acero Inoxidable |
| 5 | Escala | Tinta |

| Elaborado por: | | Revisado por: | | Aprobado por: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Liliana Maria Tello Irreño<br>Directora de Calidad y Asuntos regulatorios<br>Direccion Tecnica<br>NIPRO MEDICAL CORPORATION COLOMBIA SAS | |
| Nombre: | Sandra Cortés | Nombre: | Julio Pedraza | Nombre: | Liliana María Tello Irreño |
| Cargo: | Inspectora de calidad | Cargo: | Gerente División Hospitalaria | Cargo: | Director Técnico |
| Fecha: | 13-01-2023 | Fecha: | 13-01-2023 | Fecha: | 13-01-2023 |

COPIA CONTROL

# Bismo-pet®

**Subsalicilato de Bismuto**

*Perros, Gatos, Terneros y Potros*

***Bismo-pet®** es la efectiva suspensión bactericida a base de Subsalicilato de Bismuto en un vehículo debidamente estabilizado y saborizado que **INVET®** ha desarrollado para el tratamiento de desórdenes digestivos en Perros, Gatos,Terneros y Potros.*

## INTRODUCCIÓN

El Subsalicilato de bismuto ha sido empleado en medicina humana durante muchos años y en medicina veterinaria por más de 20 años, especialmente en Estados Unidos gracias a su acción en el tratamiento de desórdenes gastrointestinales asociados a cuadros de hipersecreción e hipermotilidad, debido a que presenta un efecto protector, antienterotoxigénico, antibacteriano, antisecretorio y antiinflamatorio, a través de un mecanismo antiprostaglandínico.

Por otra parte se ha comprobado que puede ser utilizado de manera segura hasta por 3 a 4 semanas empleando dosis continuas.

## COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contienen

| | | |
|---|---|---|
| Subsalicilato de bismuto | 1,75 | g |
| Excipientes c.s.p. | 100 | mL |

## DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

El **Subsalicilato de bismuto** es una sal insoluble en agua. Es hidrolizado en el estómago por acción del jugo gástrico, convirtiéndose en Acido salicílico y en Oxicloruro de bismuto, sal insoluble. El Salicilato liberado se absorbe en un 90% y es excretado por la orina. El Bismuto, en contraste, se absorbe en mínima cantidad, ligándose a la bacteria para luego ejercer una acción bactericida conjunta, impidiendo la adherencia a la mucosa del TGI, donde ejercería su acción patógena. El Ácido salicílico a través de mecanismos antiprostaglandínicos, ejerce una acción antienterotoxémica, antibacteriana, antisecretora y antiinflamatoria.

Estas acciones se incrementan en pH ácido.

## DEL PRODUCTO

**Bismo-pet®** es un producto veterinario, debidamente estabilizado para uso oral. Es una suspensión de buen sabor para el control de diarreas no específicas. Protege la mucosa intestinal, disminuyendo el peristaltismo y neutralizando la irritación por enterotoxinas en el tracto gastrointestinal de terneros, equinos, perros y gatos.

## CARACTERÍSTICAS

- Antidiarréico, no antibiótico.
- Suspensión homogénea.
- Antidiarréico de fácil administración.
- Acción bactericida segura (sin barrido de microbiota intestinal)
- Acción rápida.
- Sabor agradable.

## INDICACIONES

En Perros, Gatos, Terneros y Potros como coadyuvante en el control y tratamiento de diarreas y enteritis no específicas.

**Venta bajo fórmula del Médico Veterinario**

## OTROS USOS

- Diarreas por hipersecreción producida por enterotoxinas.
- Protección de la mucosa gastrointestinal por disminución del peristaltismo y por irritación de toxinas.
- Antiácido y antiinflamatorio.
- Tratamiento de desórdenes gastrointestinales en general.

## DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía oral, a razón de 20 mg de activo por kg de peso, 3 veces al día.
*En la práctica administrar*:
**Perros y Gatos:** *20 ml por cada 15 kg, tres (3) veces al día.*
**Potros y Terneros** (*85 a 130 kg): 100 a 50 ml en tres (3) tomas al día.*
**Porcinos:**
**Lechones:** *1 a 3 ml, tres (3) veces al día, durante 3 días.*
**Adultos:** *20 a 30 ml, tres (3) veces al día, durante 5 días.*

Administrar con jeringa apropiada de plástico o con sonda, evitando la aspiración pulmonar.

La duración del tratamiento depende de la severidad de la enfermedad y del criterio del Médico Veterinario.

## PRECAUCIÓN

Debe usarse con precaución en gatos y en animales menores de un mes de edad.

## ATENCIÓN

Este producto contiene Salicilato.
En casos de diarrea severa y/o inflamación gastrointestinal puede ser necesaria hospitalización e hidratación oral o parenteral. Si persisten los síntomas de depresión, fiebre, vómito, diarrea o molestia abdominal, Consultar al Médico Veterinario.
La administración de **Bismo-pet®** puede dar lugar a un oscurecimiento de las heces y la parte posterior de la lengua, lo cual no debe confundirse con melena.

**IMPORTANTE:** Agitar antes de usar.

## PRESENTACIÓN

Frasco por 120 ml
Frasco por 240 ml
Frasco por 1 Litro

## BIBLIOGRAFÍA


1. BIERER, D.Ws. "*Bismuth Subsalicylate: History, Chemistry and Safety*". Rev. of Inf Dis. V 12, No 1, 1990.
2. ERISCSSON, Ch. D.; TANNENBAUM, C.; TERRY, T.T. "*Antisecretory and Antiinflammatory Properties of Bismuth Subsalicylate*". Rev. of Inf Dis. V 12, No. 1. 1990.
3. MANHART, M.D. "*In Vitro Antimicrobial Activity of Bismuth Subsalicylate and other Bismuth Salts*". Rev. of Inf. Dis. V 12, No. 1. 1990.
4. SOX, T.E. & OLSON, C.A. "*Binding and Killing of Bacteria by Bismuth Subsalicylate*". Antimicrobial Agents and Chemotherapy V 33, No. 12 ,1989.



**Reg. ICA 5945-DB**
**Ecuador:5G2-8977-AGROCALIDAD**
**Panamá: MV-2742 MIDA**
**Costa Rica: MV-7555**
**Perú:F.050.002.I.00018 SENASA**
**Rep.Dominicana:13939 DIGEGA**



**INVET S.A.S.**
**www.invetcolombia.com.co**
**Colombia**




Laboratorio

## VIRBAC COLOMBIA LTDA

Carrera 54 76 20 Bogotá Colombia
Teléfono: (+571)2252100 018000122100
Mail: clientescolombia@virbac.com.mx
Sitio web: http://www.virbac.co/contactenos

**Uso terapéutico:** BIOLOGICO

**Principio Activo:** VIRUS DE MOQUILLO, HEPATITIS, PARVOVIRUS, PARAINFLUENZA, RABIA, LEPTOSPIRA

**Especies:** Caninos

## Descripcion:

***CANIGEN SEXTUPLE*** *es una vacuna multivalente*

| Composición |
|---|
| Virus de Moquillo canino vivo modificado cepa Lederle. |
| Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan |
| Parvovirus canino atenuado cepa Cornell |
| Parainfluenza canina atenuada cepa Manhattan. |
| Leptospira interrogans serovar canicola cepa Instituto Pasteur |
| Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae cepa ATCC |
| Virus rábico inactivado cepa Pasteur VP 12 |
| Excipientes c.s.p. |

- ***ACCIÓN**: Biológico*
- ***INDICACIONES**: Para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Parvovirus, Complejo Respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza; Leptospirosis y Rabia canina. Vacuna multivalente con alto poder inmunogénico, **Canigen® Séxtuple** es la primera que logra la asociación de seis antígenos, capaz de conferir una protección equivalente a la desarrollada por antígenos individuales, lo que permite proteger a los perros con una sola revacunación. Todas las fracciones contienen Altos títulos, lo que permite sobrepasar la inmunidad materna en condiciones normales. Una vacuna con antígenos activos atenuados e inactivos y una selección de Cepas de Alta Infectividad mundialmente reconocidas, generan una respuesta inmune más intensa tanto de tipo Humoral como de tipo Celular, además de tener el número de pasajes adecuado para que sea totalmente segura y no diseminar el virus al medio ambiente.*
- ***DOSIS**: Vía Subcutánea ó Intramuscular. Unidosis de 1.5 mL. Se recomienda para la revacunación anual en perros adultos y se puede utilizar como la última vacuna del calendario de vacunación de cachorros (animales mayores de tres meses de edad). A criterio del Médico Veterinario.*
- ***TIEMPO DE RETIRO**: No aplica.*
- ***CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES**: Mantenga el producto en refrigeración entre 2 y 8 °C, en estricta protección de la luz solar directa. No permita el congelamiento.*
- ***MODO DE APLICACIÓN**: Inyectable*
- ***PRESENTACIÓN**: Frasco unidosis de 1.5 mL..*
- ***REGISTRO**: 8626 BV*

AVISO LEGAL: La información y contenidos presentados son a título informativo y educativo y no deben emplearse para la utilización de los productos. La información e indicaciones es suministrada por el fabricante o importador, no se asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones de los contenidos aquí publicados ni por el uso o decisiones que tome el usuario de la información. Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido o diseño de esta página. Soy del Campo, su logotipo y nombre son marcas registradas.

Public

# FICHA TÉCNICA

## Bravecto®

Registro ICA No. 9561-MV
USO VETERINARIO

1

### COMPOSICIÓN

Cada 1000 mg de producto contienen:

| | |
|---|---|
| Fluralaner | 136,4 mg |
| Excipientes c.s.p. | 1.000 mg |

Cada tableta masticable contiene:

| Bravecto® tableta masticable | Fluralaner |
|---|---|
| para perros muy pequeños 2- 4.5 kg | 112,5 mg |
| para perros pequeños >4.5- 10 kg | 250 mg |
| para perros de tamaño mediano > 10-20 kg | 500 mg |
| para perros grandes >20- 40 kg | 1.000 mg |
| para perros muy grandes >40- 56 kg | 1.400 mg |

### INDICACIONES

En perros para el tratamiento y control de infestaciones por pulgas *Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis* y garrapatas *Rhipicephalus sanguineus*.
Hace parte de la estrategia para control de Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulgas (DAPP).
Previene la transmisión de *Babesia canis*, como mínimo 12 semanas.
Tratamiento de demodicosis (*Demodex spp*.) y de sarna sarcóptica (*Sarcoptes spp*.) e infestaciones por ácaros *Otodectes spp*.
Un solo tratamiento previene por 12 semanas la transmisión de *Dipylidium caninum* de pulgas infectadas a perros susceptibles.

### ESPECIE DESTINO

Perros

### FORMA FARMACÉUTICA

Tabletas/Comprimidos masticables

### DOSIS, VÍA Y MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN

Para uso oral
Bravecto® tabletas masticables se debe administrar de acuerdo con la siguiente tabla (correspondiente a una dosis de 25-56 mg de Fluralaner/kg de peso corporal dentro de una franja de peso):

| Peso (Kg) del perro | Concentración y numero de tableta a ser administradas | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bravecto® 112.5 mg | Bravecto® 250 mg | Bravecto® 500 mg | Bravecto® 1000 mg | Bravecto® 1400 mg |
| 2 - 4.5 | 1 | | | | |
| >4.5 - 10 | | 1 | | | |
| >10 - 20 | | | 1 | | |
| >20 - 40 | | | | 1 | |
| >40 - 56 | | | | | 1 |



Para perros con un peso corporal superior a 56 kg, utilizar una combinación de dos tabletas que coincidan lo más posible a su peso corporal.

**Recomendaciones sobre la administración correcta**
Las tabletas masticables no se deben romper o dividir.
Administrar Bravecto® tabletas masticables a la hora o cerca de la hora de comer.
Bravecto® es una tableta masticable y es bien aceptada por la mayoría de los perros. Si el perro no acepta la tableta voluntariamente, también se puede administrar con la comida o directamente en la boca. Se debe observar al perro durante la administración para confirmar que la tableta se ingirió.

**Esquema de tratamiento:**
Para un óptimo control de la infestación de pulgas y garrapatas, el producto medicinal veterinario se debe administrar en intervalos de 12 semanas. El Producto se puede administrar todo el año.

**PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES**
El producto no se debe administrar en intervalos más cortos a 8 semanas debido a que no se ha estudiado la seguridad para intervalos más cortos.

Los medicamentos no deben desecharse a través de agua residual o desechos domésticos.
La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.
Pregúntele a su veterinario sobre cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el ambiente.

**Contraindicaciones**
No utilizar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes.

**Reacciones Adversas**
Casos únicos (1 ,6%) de síntomas gastrointestinales leves y transitorios tales como diarrea/ vómito/ inapetencia/ babeo relacionados con la vía de administración del producto, se observaron en estudios clínicos.
Si usted observa algún efecto serio u otros efectos no mencionados, por favor informar a su veterinario.
Muy rara vez, en reportes espontáneos se ha notificado letargia, tremores musculares, ataxia y convulsión. La mayoría de las reacciones adversas reportadas fueron autolimitantes y de corta duración.

MSD Salud Animal



**ADVERTENCIAS ESPECIALES**

Advertencias especiales para la especie objetivo

El riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por parásitos se reduce sustancialmente debido al rápido inicio de la acción acaricida e insecticida. Los parásitos deben iniciar la alimentación en el huésped para estar expuestos al Fluralaner; por lo tanto, no se debe excluir el riesgo de transmisión de las enfermedades transmitidas por parásitos si las condiciones son desfavorables.

Precauciones especiales a adoptarse por la persona que administra el producto medicinal veterinario a animales:

Mantener el producto en el empaque original hasta su uso, con el fin de prevenir que los niños tengan acceso directo al producto.

No comer, tomar bebidas o fumar mientras se manipula el producto. Lavar las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

El producto se puede utilizar en la reproducción, gestación y lactancia de perros.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Fluralaner tiene una alta unión a las proteínas plasmáticas y podría competir con otros medicamentos de alta unión a proteínas tales como los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y la warfarina derivada de la cumarina. La incubación del fluralaner en presencia del carprofeno o warfarina en el plasma del perro, en concentraciones plasmáticas máximas esperadas, no reduce la unión a proteínas del fluralaner, carprofeno o warfarina.

Durante las pruebas clínicas de campo, no se observaron interacciones entre Bravecto® tabletas masticables para perros y los productos medicinales veterinarios utilizados de forma rutinaria.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia. antídotos):

La seguridad se demostró en la reproducción, gestación y lactancia de animales tratados con sobredosis hasta de 3 veces la dosis máxima recomendada.

La seguridad se demostró en cachorros de 8-9 semanas de edad y un peso de 2,0-3,6 kg tratados con sobredosis hasta de 5 veces la dosis máxima recomendada en tres ocasiones en intervalos más cortos a los recomendados (intervalos de 8 semanas).

El producto medicinal veterinario fue bien tolerado en perros Collies con deficiencia de la Proteína 1 de resistencia a múltiples medicamentos 1 (MDR 1 -/-) después de una administración oral única de 3 veces la dosis recomendada

Incompatibilidades:

Ninguna conocida

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Public

**ALMACENAMIENTO**
No almacenar por encima de 30°C

**PRESENTACIÓN COMERCIAL**
Caja con 1 blíster que contiene 1, 2 o 4 tabletas masticables.
No todos los tamaños de empaque se pueden comercializar.

4

**FABRICADO POR**
Intervet GesmbH
Austria

**IMPORTADO POR**
MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia

CREMA DERMATOLOGICA

# CUTAMYCON LOCION

LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. SALUD ANIMAL



Vademécum Veterinario

## CUTAMYCON LOCION

CREMA DERMATOLOGICA




Laboratorio

### LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. SALUD ANIMAL

Carrera 106 15 25 MZ 6 Bogotá - Colombia
Teléfono: +(571)7245090
Fax: +(571)7245090
Mail: gciaveterinaria@chalver.com.co
Sitio web: www.chalver.com

**Uso terapéutico:** CREMA DERMATOLOGICA

**Principio Activo:** GENTAMICINA SULFATO, BETAMETASONA VALERATO, CLOTRIMAZOL

**Especies:** Caninos, Gatos

**Descripcion:**

| | |
|---|---|
| Betametasona | 0.04 g |
| Excipientes csp | 100 ml |

- ***ACCIÓN**: Bactericida, Fungicida y Antiinflamatoria*
- ***INDICACIONES**: Acción tópica polivalente: Bactericida, Fungicida y Antiinflamatoria, para afecciones e inflamaciones de la piel de los animales domésticos. Hongos: Trichophyton verrucosum, Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton flocosum, Microsporum canis, Microsporum gypseum y Candida albicans. Bacterias Gram positivas: Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Bacterias Gram negativas: Proteus spp., Aerobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Shigella spp. En intertrigo, alopecia areata, onicomicosis, otitis externa, y afecciones dérmicas de etiología micótica y bacterianas. Reduce los síntomas de prurito y edemas, evitando excoriaciones y automutilaciones generadas por la actividad pruriginosa.*
- ***DOSIS**: Aspersión tópica en forma generosa, sobre la región de la piel afectada, garantizando un buen contacto. Prolongar la aplicación durante varios días, después de la resolución de los síntomas, para asegurar el resultado del tratamiento.*
- ***TIEMPO DE RETIRO**: No posee*
- ***CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No mancha la piel, ni la irrita y por su vehículo oleo-alcohólico se absorbe a los pocos segundos.*
- ***MODO DE APLICACIÓN**: Loción externa*
- ***PRESENTACIÓN**: Frascos por 50 y 100 mL.*
- ***REGISTRO**: 5972 MV*

---

AVISO LEGAL: La información y contenidos presentados son a título informativo y educativo y no deben emplearse para la utilización de los productos. La información e indicaciones es suministrada por el fabricante o importador, no se asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones de los contenidos aquí publicados ni por el uso o decisiones que tome el usuario de la información. Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido o diseño de esta página. Soy del Campo, su logotipo y nombre son marcas registradas.

---

Gracias por consultar CUTAMYCON LOCION en nuestro vademécum Veterinario, esperamos que CUTAMYCON LOCION sea lo que estaba buscando. Recuerde que en nuestro vademécum Veterinario podrá encontrar toda la información de cualquier producto tal cual se muestra la de CUTAMYCON LOCION.

Buscar

Filtros

Vedemécum Productos —

**INFORME DE FARMACOLOGIA**

# OMEPRAZOL 20 mg

**COMPOSICIÓN:** Cada cápsula contiene Omeprazol pellets 8,5% equivalente a Omeprazol base 20 mg

**FORMA FARMACÉUTICA:** Cápsula dura

**CONCENTRACIÓN:** Cada cápsula dura contiene 20 mg de Omeprazol

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**INDICACIONES:** úlcera péptica y duodenal, esofagitis por reflujo, síndrome de Zollinger-Ellison. Coadyuvante en la erradicación del Helicobacter pylori en úlcera péptica. Reflujo gastroesofágico sintomático. Dispepsia ácida. Úlceras o erosiones gástricas y duodenales relacionadas con AINES.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad conocida a omeprazol o a bicarbonato de sodio, benzoimidazoles substitutos, o a cualquiera de los excipientes del producto. Omeprazol, como otros inhibidores de la bomba de protones (PPIs por sus siglas en inglés) no debe usarse concomitantemente con nelfinavir.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**
Las formas farmacéuticas con cubierta entérica no deben ser trituradas o masticadas, puesto puede alterar su absorción, eficacia y seguridad.

**Malignidad Gástrica:**
La respuesta sintomática al tratamiento con Omeprazol no excluye la presencia de una neoplasia maligna gástrica. Ante la presencia de cualquier síntoma de alarma (por ejemplo, pérdida significativa de peso no intencional, vómito recurrente, disfagia, hematemesis o melena) y cuando se sospeche o esté presente úlcera gástrica, debe excluirse malignidad, ya que el tratamiento puede aliviar la sintomatología y retrasar el diagnóstico.

**Absorción de vitamina B12:**
Omeprazol, como todos los fármacos bloqueadores de ácido, puede reducir la absorción de vitamina B12 (cianocobalamina) debido a hipo o aclorhidria. Esto debe tomarse en cuenta en el tratamiento a largo plazo de pacientes con reservas bajas o factores de riesgo para absorción reducida de vitamina B12.
Pregúntele a su médico o farmacéutico sobre el uso de este medicamento si usted está tomando warfarina, clopidogrel o cilostazol (anticoagulantes) o antirretrovirales recetados (medicamentos para la infección por VIH).

**Hipomagnesemia:**
Se ha reportado hipomagnesemia grave en pacientes tratados con inhibidores de la bomba de protones (PPIs) como omeprazol por un mínimo de tres meses, y un año en la mayoría de los casos. Las manifestaciones de hipomagnesemia grave tales como fatiga, tetania, delirio, convulsiones, mareo y arritmia ventricular pueden iniciar insidiosamente y no ser notados. En la mayoría de los pacientes afectados, la

hipomagnesemia mejora después del remplazo con magnesio y la discontinuación del PPI. Para los pacientes en los que se espera un tratamiento prolongado o que toman PPIs con digoxina o fármacos que pueden causar hipomagnesemia (por ejemplo, diuréticos), los profesionales del cuidado de la salud deben considerar la medición de los niveles de magnesio antes de iniciar y durante el tratamiento con PPI.

**Riesgo de fractura:**
Los inhibidores de la bomba de protones, especialmente si se usan en dosis altas y por períodos prolongados (>1 año), puede aumentar el riesgo de fractura de cadera, muñeca y columna espinal, predominantemente en ancianos o en presencia de otros factores de riesgos reconocidos. Estudios observacionales sugieren que los inhibidores de la bomba de protones pueden aumentar el riesgo general de fractura en un 10-40%. El aumento de éste puede deberse a otros factores de riesgo. Pacientes en riesgo de osteoporosis deberían recibir cuidados de acuerdo a las actuales guías clínicas y deben tener un adecuado aporte de vitamina D y calcio.

**Riesgo de infecciones gastrointestinales:**
La disminución de la acidez gástrica aumenta los conteos gástricos de bacterias que están presentes normalmente en el tracto gastrointestinal. El tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, eleva ligeramente el riesgo de infecciones gastrointestinales como aquellas causadas por Salmonella y Campylobacter.

**Tratamientos de largo plazo:**
Como con todos los tratamientos de largo plazo, especialmente cuando el período de tratamiento excede 1 año, los pacientes deben mantenerse bajo supervisión regular**.**

**Diarrea asociada a Clostridium difficile:**
Los estudios observacionales publicados sugieren que la terapia con PPI puede asociarse a un aumento en el riesgo de diarrea asociada a Clostridium difficile, especialmente en pacientes hospitalizados. Este diagnóstico debe tomarse en cuenta en diarrea que no mejora. Los pacientes deben usar las dosis más bajas y la duración más corta del tratamiento con PPI apropiado a la condición a ser tratada.

**Gastritis atrófica:**
Ocasionalmente se ha notado gastritis atrófica en biopsias de cuerpo gástrico de pacientes tratados a largo plazo con omeprazol.

**Investigaciones de tumores neuroendocrinos:**
El aumento de CgA puede interferir con las investigaciones de tumores neuroendocrinos. Para evitar esta interferencia debe suspenderse temporalmente cinco días el tratamiento con omeprazol antes de la medición de CgA.

**Síndrome de Lupus Eritematoso cutáneo subagudo (LECS):**
Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) se asocian a casos infrecuentes de una reacción conocida como Lupus Eritematoso Cutáneo Subagudo (LECS), esta reacción se caracteriza por lesiones eritematosas en zonas expuestas al sol acompañadas de artralgias. En caso de presentarse, se debe solicitar atención médica y considerar la interrupción del tratamiento con Omeprazol. La aparición de LECS con el tratamiento de INP previo, puede aumentar el riesgo de LECS con otros IBP.

**Uso concomitante con atazanavir:**
No se recomienda la co-administración de atazanavir con inhibidores de la bomba de protones. Si se considera inevitable la combinación de atazanavir con un inhibidor de la bomba de protones, se recomienda un estrecho monitoreo clínico (por ejemplo, carga viral) junto con un aumento en la dosis de atazanavir a 400 mg y 100 mg de ritonavir; no debe excederse 20 mg de omeprazol.

**Uso concomitante con clopidogrel:**
Omeprazol es un inhibidor CYP2C19. Cuando se inicie o termine tratamiento con omeprazol, deben tomarse en cuenta las potenciales interacciones con fármacos metabolizados por la enzima CYP2C19. Se ha observado una interacción entre clopidogrel y omeprazol. La relevancia clínica de esta interacción es incierta. Como precaución, debe descartarse el uso concomitante de omeprazol y clopidogrel.

**Uso concomitante con la hierba de San Juan o rifampicina:**
Los fármacos que pueden inducir CYP2C19 o CYP34A (tales como la hierba de San Juan o la rifampicina) pueden disminuir substancialmente las concentraciones de omeprazol. Evite el uso concomitante de la hierba de San Juan o la rifampicina.

**Uso concomitante con metotrexate:**
La literatura sugiere que el uso de PPIs con metotrexate (principalmente a dosis altas) puede elevar y prolongar los niveles séricos de metotrexate y/o sus metabolitos, llevando posiblemente a toxicidades de metotrexate. En la administración de dosis altas, en algunos pacientes puede considerarse una suspensión temporal de PPI.

**Embarazo, lactancia y fertilidad:**
**Embarazo**
Los resultados de tres estudios epidemiológicos prospectivos (más de 1000 casos de exposición) no han mostrado evidencia de efectos indeseables del omeprazol en el embarazo o en la salud del feto/recién nacido. El omeprazol se puede utilizar durante el embarazo.
**Lactancia**
El omeprazol se excreta en la leche materna, pero es poco probable que afecte al niño a dosis terapéuticas.
**Fertilidad**
Los estudios en animales no han mostrado evidencia de un efecto sobre la fertilidad cuando se administra por vía oral.

**Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:**
Es poco probable que omeprazol afecte a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Pueden producirse efectos secundarios como mareos y alteraciones visuales.

**DOSIFICACIÓN Y GRUPO ETARIO:**

**<u>Adultos</u>**

**Tratamiento de las úlceras duodenales:**

La dosis recomendada en pacientes con una úlcera duodenal activa es Omeprazol 20 mg una vez al día. En la mayoría de los pacientes, la curación ocurre en dos semanas. Para aquellos pacientes que pueden no estar completamente curados después del curso inicial, la curación generalmente ocurre durante un período de tratamiento de dos semanas más. En pacientes con úlcera duodenal poco receptiva, se recomienda Omeprazol 40 mg una vez al día y la curación generalmente se logra dentro de las cuatro semanas.

**Prevención de la recaída de las úlceras duodenales:**
Para la prevención de la recaída de la úlcera duodenal en pacientes con H. pylori negativo o cuando no es posible la erradicación de H. pylori, la dosis recomendada es 20 mg de omeprazol una vez al día. En algunos pacientes, una dosis diaria de 10 mg puede ser suficiente. En caso de fracaso de la terapia, la dosis puede aumentarse a 40 mg.

**Tratamiento de úlceras gástricas:**
La dosis recomendada es 20 mg de omeprazol una vez al día. En la mayoría de los pacientes, la curación ocurre dentro de las cuatro semanas. Para aquellos pacientes que pueden no estar completamente curados después del curso inicial, la curación generalmente ocurre durante un período de tratamiento adicional de cuatro semanas. En pacientes con úlcera gástrica de baja respuesta, se recomienda Omeprazol 40 mg una vez al día y la curación generalmente se logra dentro de las ocho semanas.

**Prevención de la recaída de las úlceras gástricas:**
Para la prevención de la recaída en pacientes con úlcera gástrica con poca respuesta, la dosis recomendada es Omeprazol 20 mg una vez al día. Si es necesario, la dosis puede aumentarse a 40 mg de omeprazol una vez al día.

**Erradicación de H. pylori en la enfermedad de la úlcera péptica:**
Para la erradicación de H. pylori, la selección de antibióticos debe considerar la tolerancia del paciente de forma individual y debe realizarse de acuerdo con los patrones de resistencia y pautas de tratamiento nacionales, regionales y locales.
Omeprazol 20 mg + claritromicina 500 mg + amoxicilina 1 g, cada dos veces al día durante una semana, u • omeprazol 20 mg + claritromicina 250 mg (alternativamente 500 mg) + metronidazol 400 mg (o 500 mg o tinidazol 500 mg), cada dos veces al día durante una semana o • omeprazol 40 mg una vez al día con amoxicilina 500 mg y metronidazol 400 mg (o 500 mg o tinidazol 500 mg), ambos tres veces al día durante una semana.
En cada régimen, si el paciente todavía es H. pylori positivo, la terapia puede repetirse.

**Tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales asociadas a los AINE:**
Para el tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales asociadas a los AINE, la dosis recomendada es 20 mg de omeprazol una vez al día. En la mayoría de los pacientes, la curación ocurre dentro de las cuatro semanas. Para aquellos pacientes que pueden no estar completamente curados después del curso inicial, la curación generalmente ocurre durante un período de tratamiento adicional de cuatro semanas.

**Prevención de úlceras gástricas y duodenales asociadas a AINE en pacientes en riesgo:**

Para la prevención de úlceras gástricas o úlceras duodenales asociadas a AINE en pacientes en riesgo (edad> 60, antecedentes de úlceras gástricas y duodenales, antecedentes de hemorragia digestiva alta) la dosis recomendada es Omeprazol 20 mg una vez al día.

**Tratamiento de la esofagitis por reflujo:**
La dosis recomendada es Omeprazol 20 mg una vez al día. En la mayoría de los pacientes, la curación ocurre dentro de las cuatro semanas. Para aquellos pacientes que pueden no estar completamente curados después del curso inicial, la curación generalmente ocurre durante un período de tratamiento adicional de cuatro semanas. En pacientes con esofagitis severa, se recomienda omeprazol 40 mg una vez al día y la curación generalmente se logra dentro de las ocho semanas.

**Manejo a largo plazo de pacientes con esofagitis por reflujo curada:**
Para el manejo a largo plazo de pacientes con esofagitis por reflujo curado, la dosis recomendada es 10 mg de omeprazol una vez al día. Si es necesario, la dosis se puede aumentar a Omeprazol 20-40 mg una vez al día.

**Tratamiento de la enfermedad sintomática por reflujo gastroesofágico:**
La dosis recomendada es Omeprazol 20 mg al día. Los pacientes pueden responder adecuadamente a 10 mg diarios y, por lo tanto, se debe considerar un ajuste de dosis individual. Si no se logra el control de los síntomas después de cuatro semanas de tratamiento con Omeprazol 20 mg al día, se recomienda una investigación adicional.

**Tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison:**
En pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison, la dosis debe ajustarse individualmente y el tratamiento debe continuarse siempre que esté clínicamente indicado. La dosis inicial recomendada es Omeprazol 60 mg al día. Todos los pacientes con enfermedad grave y respuesta inadecuada a otras terapias han sido controlados de manera efectiva y más del 90% de los pacientes se mantuvieron con una dosis de omeprazol de 20-120 mg al día. Cuando la dosis excede los 80 mg de omeprazol al día, la dosis debe dividirse y administrarse dos veces al día.

**Población pediátrica**

Para la administración en niños menores de 12 años se requiere preparaciones liquidas orales que permitan la administración y posología.
La sala considera que las formas farmacéuticas tabletas y cápsulas no están diseñadas para ser fraccionadas y disueltas para permitir su administración como solución o suspensión.
Niños mayores de 1 año y ≥ 10 Kg tratamiento de la esofagitis por reflujo tratamiento sintomático de la acidez estomacal y regurgitación ácida en la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Las recomendaciones posológicas son las siguientes:

| Edad | Peso | Posología |
|---|---|---|
| ≥ 1 año | 10-20 Kg | 10 mg una vez al día. La dosis se puede aumentar a 20 mg una vez al día si es necesario |

| | | |
|---|---|---|
| ≥ 2 años | >20 Kg | 20 mg una vez al día. La dosis se puede aumentar a 40 mg una vez al día si es necesario. |

Tratamiento sintomático de la acidez estomacal y la regurgitación ácida en la enfermedad por reflujo gastroesofágico: el tiempo de tratamiento es de 2 a 4 semanas. Si no se logra el control de los síntomas después de 2 a 4 semanas, el paciente debe investigarse más a fondo.

**Adolescentes y niños mayores de 4 años**

**Tratamiento de la úlcera duodenal causada por H. pylori:**
Al seleccionar la terapia de combinación adecuada, se debe considerar la orientación oficial nacional, regional y local con respecto a la resistencia bacteriana, la duración del tratamiento (generalmente 7 días, pero a veces hasta a 14 días), y el uso apropiado de antibióticos. El tratamiento debe ser supervisado por un especialista.

Las recomendaciones posológicas son las siguientes:

| Peso | Posología |
|---|---|
| 15-30 Kg | Combinación con dos antibióticos: Omeprazol 10 mg, amoxicilina 25 mg / Kg de peso corporal y claritromicina 7.5 mg / Kg de peso corporal se administran todos juntos dos veces al día durante una semana |
| 31-40 Kg | La combinación con dos antibióticos: Omeprazol 20 mg, amoxicilina 750 mg y claritromicina 7,5 mg / Kg de peso corporal se administran dos veces al día durante una semana. |
| > 40 Kg | Combinación con dos antibióticos: Omeprazol 20 mg, amoxicilina 1 g y claritromicina 500 mg se administran dos veces al día durante una semana. |

**Poblaciones especiales**

**Insuficiencia renal:** No es necesario ajustar la dosis.
**Insuficiencia hepática:** En pacientes con insuficiencia hepática, puede ser suficiente una dosis diaria de 10-20 mg.

**INTERACCIONES:**
El Omeprazol actúa sobre la farmacocinética de otros fármacos por:

**Modificación del pH gástrico alteran la absorción de fármacos:** La disminución de la acidez intragástrica por el omeprazol puede interferir con la absorción de teofilina, digoxina, ketoconazol, sales de hierro, vitamina B12 y ácido fólico; es recomendable el monitoreo de los niveles séricos de los fármacos en tratamientos a largo plazo ya que estudios recientes no muestran alteraciones significativas en tratamientos a corto plazo.

**Nelfinavir, Atazanavir:** Las concentraciones plasmáticas de nelfinavir y atazanavir disminuyen cuando se administran conjuntamente con omeprazol. La administración concomitante de omeprazol con nelfinavir está contraindicada. La administración

concomitante de omeprazol (40 mg una vez al día) redujo la exposición media a nelfinavir en casi un 40% y la exposición media del metabolito con actividad farmacológica M8, disminuyó en casi un 75-90%. La interacción puede causar también la inhibición de la CYP2C19.
No se recomienda la administración concomitante de omeprazol y atazanavir. La administración concomitante de omeprazol (40 mg una vez al día) y atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg a voluntarios sanos redujo en un 75% la exposición a atazanavir.
El aumento de la dosis de atazanavir a 400 mg no compensó el efecto del omeprazol en la exposición a atazanavir. La administración conjunta de omeprazol (20 mg una vez al día) y atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg a voluntarios sanos redujo en aproximadamente un 30% la exposición a atazanavir en comparación con atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg una vez al día.

**Digoxina:** La administración concomitante de omeprazol (20 mg al día) y digoxina en sujetos sanos aumentó la biodisponibilidad de la digoxina en un 10%. Rara vez se han comunicado casos de toxicidad por digoxina. Se recomienda precaución cuando se administre omeprazol en dosis altas a pacientes ancianos. Debe reforzarse el seguimiento del tratamiento con digoxina.

**Clopidogrel:** Los resultados de estudios en sujetos sanos han mostrado una interacción farmacocinética (PK)/farmacodinámica (PD) entre clopidogrel (300 mg de dosis de carga/75 mg de dosis de mantenimiento diaria) y omeprazol (80 mg diarios por vía oral) dando lugar a una exposición disminuida del metabolito activo de clopidogrel en un promedio del 46% y una inhibición máxima disminuida de agregación plaquetaria (ADP inducido) en un promedio del 16%. Se han notificado datos inconsistentes sobre las implicaciones clínicas de una interacción PK/PD de omeprazol en relación con acontecimientos cardiovasculares mayores en estudios observacionales y clínicos. Como precaución, debe desaconsejarse el uso concomitante de omeprazol y clopidogrel La absorción de posaconazol, erlotinib, ketoconazol e itraconazol se reducen de forma significativa pudiendo reducir su eficacia clínica. Se recomienda evitar la administración concomitante con posaconazol y erlotinib.

**Fármacos metabolizados por CYP2C19:** Omeprazol es un fármaco inhibidor moderado del Citocromo P450 2C19, pudiendo disminuir el metabolismo de fármacos metabolizados por esta misma vía metabólica, algunos de esto fármacos son: diazepam, fenitoína, antipirina, aminopirina, cilostazol y warfarina, de los cuales se prolonga su vida media y los niveles séricos, pero no de teofilina o propanolol; por lo tanto, deben tomarse las debidas precauciones cuando se administren concomitantemente medicamentos que utilicen la vía metabólica oxidativa del citocromo P450.

**Cilostazol:** Omeprazol, al ser administrado en una dosis de 40 mg a sujetos sanos en un estudio de grupos cruzados, aumentó la Cmax y el AUC del cilostazol en un 18% y un 26%, respectivamente, y las de uno de sus metabolitos activos en un 29% y un 69%, respectivamente.

**Fenitoína:** Se requiere vigilar la concentración plasmática de fenitoína durante las dos primeras semanas después de iniciar el tratamiento con omeprazol y, si se realiza un ajuste de la dosis de fenitoína, debe realizarse una monitorización y un nuevo ajuste de la dosis al finalizar el tratamiento con omeprazol.

Otros fármacos con incremento de sus concentraciones plasmáticas que generan interacción con omeprazol y mecanismo desconocido son:

**Saquinavir:** Incremento de casi un 70% la concentración plasmática.

**Tacrolimus:** También hay incremento de concentraciones plasmáticas que requieren monitoreo y control de función renal y creatinina, ajustando dosis de tacrolimus de ser necesario.

**Metotrexate:** Se recomienda el no uso del inhibidor de bomba durante el tratamiento también por incremento de concentraciones del citostático.

**Fármacos inhibidores del citocromo P450 2C19 y 3A4:** Omeprazol es metabolizado por el citocromo P450 2C19 y 3A4, fármacos que inhiben estos sistemas enzimáticos 2C19 y3A4 como claritromicina y voriconazol, llevan a un incremento de las concentraciones de omeprazol a más del doble, sin ser necesario ajustar la dosis, sin embargo, en pacientes con insuficiencia hepática grave si es necesario ajustar la dosis cuando se utiliza por largo plazo.

**Fármacos inductores del citocromo P450 2C19 y 3A4:** Los fármacos inductores del citocromo P450 2C19 y 3A4 como rifampicina, la hierba de san Juan, pueden disminuir las concentraciones séricas de omeprazol aumentando su metabolismo. La biodisponibilidad de la amoxicilina y bacampicilina no se altera por la administración concomitante con omeprazol. El uso de Omeprazol con medicamentos depresores de la médula ósea puede incrementar los efectos leucopénicos o trombocitopenicos de estas medicaciones.

**Interferencias con pruebas de laboratorio:** El incremento de niveles de Cromogranina A (CgA) puede interferir con la prueba de tumores endocrinos. Para evitarlo debe suspenderse la terapia 5 días antes de las mediciones de CgA.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Muy frecuentes ≥1/10
Frecuentes ≥1/100 a <1/10
Poco frecuentes ≥1/1000 a <1/100
Raras ≥1/10.000 a <1/1000
Muy raras <1/10.000

Las reacciones adversas como diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal, flatulencia, cefalea, mareo, astenia y rash cutáneo, constipación, tos, dolor lumbar, han sido reportados con una frecuencia entre el 1 al 10%.

**Trastornos de la sangre y sistema linfático:** Raras: leucopenia, trombocitopenia. Muy Raras: Agranulocitosis, pancitopenia.

**Trastornos del sistema Inmunológico:** Raras: Reacciones de hipersensibilidad.

**Trastornos del metabolismo y la nutrición:** Raras: Hiponatremia. Frecuencia no conocida: Hipomagnesemia, hipomagnesemia grave que puede resultar en hipocalcemia. Hipomagnesemia, que puede también estar asociada con hipopotasemia.

**Trastornos psiquiátricos:** Poco frecuentes: Insomnio. Raras: agitación, confusión, depresión. Muy raras: agresividad, alucinaciones.

**Trastornos de Sistema Nervioso:** Frecuentes: Cefalea. Poco frecuente: Mareos, parestesias y somnolencia. Raras: alteración del gusto.

**Trastornos Oculares:** Raras: visión borrosa.

**Trastornos del Oído y Laberinto:** Poco frecuentes: vértigo.

**Trastornos respiratorios torácicos y mediastínicos:** Raras: broncoespasmo.

**Trastornos Gastrointestinales:** Frecuentes: dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, flatulencia, nauseas/vómitos. Raras: sequedad de boca, estomatitis, candidiasis gastrointestinal. Frecuencia no conocida: Colitis microscópica.

**Trastornos Hepatobiliares:**
Poco frecuentes: Aumento de las enzimas hepáticas
Raras: hepatitis con o sin ictericia.
Muy raras: Insuficiencia hepática, encefalopatías en pacientes con enfermedad hepática preexistente.

**Trastornos de la piel y tejido subcutáneo:**
Poco frecuentes: dermatitis, prurito, exantema, urticaria.
Raras: Alopecia y fotosensibilidad.
Muy raras: Eritema multiforme, síndrome de Stevens Johnson, necrólisis epidérmica tóxica.
Frecuencia no conocida: Lupus eritematoso cutáneo subagudo.

**Trastornos musculo esqueléticos y del sistema conjuntivo:**
Poco frecuentes: fractura de cadera, muñeca o columna vertebral.
Rara: Artralgias/mialgias
Muy Raras: Debilidad muscular.

**Trastornos Renales y Urinarios:** Raras: Nefritis intersticial.

**Trastornos del aparato reproductor y de la mama:** Muy Raros: Ginecomastia.

**Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:**
Poco frecuentes: Malestar general, edema periférico.
Raro: aumento de la sudoración.

**CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:** Consérvese a temperatura no mayor a 30 ° C, protegido de la humedad y la luz.

**TIEMPO DE VIDA ÚTIL:** No administrar luego de la fecha de expiración indicada en el envase.

**CONDICIÓN DE VENTA:** Con fórmula facultativa

**TITULAR:** WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A. con domicilio en Bogotá - D.C., GENFAR S.A. con domicilio en Bogotá - D.C.

**REVISIÓN LOCAL**
06/07/2022

**REFERENCIA**
DL answer Resol. No. 2019021899 and variation Omeprazol 20 mg CO COE Omeprazole_capsules-CCDSv01-LRC17Sep2020. Revisión Noviembre 2020
INVIMA AUTO No.2022002475 27 de Abril de 2022 (Acta No. 17 de 2020 numeral 3.1.13.1).