# ESTUDIO DE PREVALENCIA DE CONSUMO DE DROGAS DE USO LÍCITO E ILÍCITO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LOS 37 MUNICIPIOS DEL HUILA – AÑO 2025

FUNDACIÓN IPS PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DEL SUR COLOMBIANO
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA
HUILA
2025

Neiva - Huila, Calle 5C Nº 17–08 B/ Calixto Leiva
Cel. 3187511121 – Tel. (60) 866 7036
E-mail: info@funipsi.org y/o funipsi@gmail.com
www.funipsi.org

ESTUDIO DE PREVALENCIA DE CONSUMO DE DROGAS DE USO LÍCITO E ILÍCITO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LOS 37 MUNICIPIOS DEL HUILA – AÑO 2025

## Secretaría de Salud departamental del Huila

**Cesar German Roa Trujillo**
Secretario de salud del Huila

**Carlos Andrés Montalvo Arce**
Líder de salud pública

**Federico Barreto Cortés**
Profesional de apoyo

**Claudia Ivonne Gaitán Canasto**
Referente de salud mental

**Equipo de profesionales de salud mental**

**Equipo de profesionales observatorio de Salud del Huila**

## Secretaría de educación departamental del Huila

**Edgar Martín Lara**
Secretario de educación departamental

**Jhonnattan Andrés Ibarra Palacio**
Apoyo en convivencia escolar

## Fundación IPS para el desarrollo humano integral del sur colombiano

**Luz Elcy Manrique González**
Coordinación técnica

**Luz Dary Vargas Mayorga**
Asistente administrativo

**Henry Bravo Rivera**
**Susana Villany Barrera**
**Edgar Javier Gonzalez**
**Deisi Zarabanda Cuellar**
Coordinación operativa

**Orlando Scopetta Díaz Granados**
**Oscar Alejandro Marín Quintero**
Asesor nacional

**Jorge Andrés Ramos Castañeda**
Coordinación Equipo de análisis

**Ana Milena Quimbayo Suarez**
**Luz Adriana Calderón Bernal**
Análisis de la información

# Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO ..... 9
2. PROCESO METODOLÓGICO ..... 11
2.1. Aspectos metodológicos del trabajo de campo ..... 11
2.2. Descripción de la muestra y población representada ..... 12
3. RESULTADOS ..... 14
3.1. Características sociodemográficas, académicas y familiares ..... 14
3.2. Características académicas y laborales ..... 16
3.3. Características familiares ..... 18
3.4. Resultados sobre el consumo de sustancias psicoactivas ..... 21
3.4.1. Alcohol ..... 22
3.4.2. Cigarrillos electrónicos o ´vapeadores´ ..... 27
3.4.3. Tabaco/cigarrillo ..... 31
3.4.4. Marihuana ..... 35
3.4.5. Medicamentos de prescripción médica ..... 40
3.4.5.1. Tranquilizantes sin fórmula médica ..... 41
3.4.5.2. Estimulantes sin prescripción médica ..... 44
3.4.6. Cocaína ..... 47
3.4.7. Bazuco ..... 50
3.4.8. Éxtasis ..... 53
3.4.9. Sustancias inhalables ..... 56
3.4.10. Dick (Ladys, fragancia) ..... 60
3.4.11. Popper ..... 63
3.4.12. LSD (o tripi) ..... 66
3.4.13. Hongos ..... 69
3.4.14. Yagé ..... 73
3.4.15. 2CB (tucibi o nexus) ..... 76
3.4.16. Cacao sabanero ..... 79
3.5. Consumo de cualquier sustancia ilícita ..... 82
3.6. Percepción del riesgo y situaciones de riesgo ..... 85

3.6.1. Percepción del riesgo ..... 85
3.6.2. Situaciones de riesgo ..... 86
3.7. Disponibilidad y oferta de sustancias ..... 87
3.7.1. Facilidad para conseguir la sustancia ..... 87
3.7.1.1. Alcohol ..... 87
3.7.1.2. Otras sustancias de uso ilegal ..... 88
3.8. Escala de padres involucrados ..... 89
4. CONCLUSIONES ..... 92

# Lista de gráficos

Gráfico 1. Motivos de ausencia al colegio en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 15
Gráfico 2. Personas con quien conviven los adolescentes escolares del Huila..... 18
Gráfico 3. Relación que tienen actualmente con su madre, padre o acudiente los adolescentes escolares del Huila. ..... 20
Gráfico 4. Prevalencia de consumo de alcohol por grado académico. Huila, 2025 ..... 24
Gráfico 5. Prevalencia de consumo de alcohol en el último año, Huila y municipios, 2025. ..... 25
Gráfico 6. Edad de inicio del consumo de alcohol según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025..... 26
Gráfico 7. Motivos que expresan los adolescentes escolares para consumir alcohol ..... 27
Gráfico 8. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores por grado académico. Huila, 2025 ..... 29
Gráfico 9. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónico o vapeadores en el último año, Huila y municipios, 2025..... 30
Gráfico 10. Edad de inicio del consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025..... 31
Gráfico 11. Prevalencia de consumo de tabaco o cigarrillo por grado académico. Huila, 2025..... 33
Gráfico 12. Prevalencia de consumo de tabaco o cigarrillo en el último año, Huila y municipios, 2025..... 34
Gráfico 13. Edad de inicio del consumo de tabaco o cigarrillo según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 35
Gráfico 14. Prevalencia de consumo de marihuana por grado académico. Huila, 2025 .... 36
Gráfico 15. Prevalencia de consumo de marihuana en el último año, Huila y municipios, 2025..... 37
Gráfico 16. Edad de inicio del consumo de marihuana según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 38
Gráfico 17. Motivos que expresan los adolescentes escolares para consumir marihuana 39
Gráfico 18. Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica por grado académico. Huila, 2025 ..... 42
Gráfico 19. Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica en el último año, Huila y municipios, 2025..... 43
Gráfico 20. Edad de inicio del consumo de tranquilizantes sin fórmula médica según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 44
Gráfico 21. Prevalencia de consumo de estimulantes sin fórmula médica por grado académico. Huila, 2025 ..... 45
Gráfico 22. Prevalencia de consumo de estimulantes sin fórmula médica en el último año, Huila y municipios, 2025. ..... 46
Gráfico 23. Edad de inicio del consumo de estimulantes sin fórmula médica según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025..... 47
Gráfico 24. Prevalencia de consumo de cocaína por grado académico. Huila, 2025 ..... 48

Gráfico 25. Prevalencia de consumo de cocaína en el último año, Huila y municipios, 2025. ..... 49
Gráfico 26. Edad de inicio del consumo de cocaína según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 50
Gráfico 27. Prevalencia de consumo de bazuco por grado académico. Huila, 2025 ..... 51
Gráfico 28. Prevalencia de consumo de bazuco en el último año, Huila y municipios, 2025. ..... 52
Gráfico 29. Edad de inicio del consumo de bazuco según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 53
Gráfico 30. Prevalencia de consumo de éxtasis por grado académico. Huila, 2025 ..... 54
Gráfico 31. Prevalencia de consumo de éxtasis en el último año, Huila y municipios, 2025. ..... 55
Gráfico 32. Edad de inicio del consumo de éxtasis según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 56
Gráfico 33. Prevalencia de consumo de sustancias inhalables por grado académico. Huila, 2025 ..... 58
Gráfico 34. Prevalencia de consumo de sustancias inhalables en el último año, Huila y municipios, 2025. ..... 59
Gráfico 35. Edad de inicio del consumo de sustancias inhalables según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 60
Gráfico 36. Prevalencia de consumo de dick (ladys, fragancia) por grado académico. Huila, 2025 ..... 61
Gráfico 37. Prevalencia de consumo de dick (ladys y fragancia) en el último año, Huila y municipios, 2025. ..... 62
Gráfico 38. Edad de inicio del consumo de dick (ladys y fragancia) según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 63
Gráfico 39. Prevalencia de consumo de popper por grado académico. Huila, 2025 ..... 64
Gráfico 40. Prevalencia de consumo de popper en el último año, Huila y municipios, 2025. ..... 65
Gráfico 41. Edad de inicio del consumo de popper según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 66
Gráfico 42. Prevalencia de consumo de LSD por grado académico. Huila, 2025 ..... 67
Gráfico 43. Prevalencia de consumo de LSD o tripi en el último año, Huila y municipios, 2025. ..... 68
Gráfico 44. Edad de inicio del consumo de LSD o tripi según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 69
Gráfico 45. Prevalencia de consumo de hongos por grado académico. Huila, 2025 ..... 71
Gráfico 46. Prevalencia de consumo de hongos en el último año, Huila y municipios, 2025. ..... 72
Gráfico 47. Edad de inicio del consumo de hongos según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 73
Gráfico 48. Prevalencia de consumo de yagé por grado académico. Huila, 2025 ..... 74
Gráfico 49. Prevalencia de consumo de yagé en el último año, Huila y municipios, 2025. 75

Gráfico 50. Edad de inicio del consumo de yagé según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 76
Gráfico 51. Prevalencia de consumo de 2CB (tucibi o nexus) por grado académico. Huila, 2025 ..... 77
Gráfico 52. Prevalencia de consumo de 2CB (tucibi o nexus) en el último año, Huila y municipios, 2025. ..... 78
Gráfico 53. Edad de inicio del consumo de 2CB (tucibi o nexus) según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 79
Gráfico 54. Prevalencia de consumo de cacao sabanero por grado académico. Huila, 2025 ..... 80
Gráfico 55. Prevalencia de consumo de cacao sabanero en el último año, Huila y municipios, 2025. ..... 81
Gráfico 56. Edad de inicio del consumo de cacao sabanero según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 82
Gráfico 57. Prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita por grado académico. Huila, 2025 ..... 83
Gráfico 58. Prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año, Huila y municipios, 2025. ..... 84
Gráfico 59. Grado de involucramiento de los padres con los adolescentes escolares del Huila, 2025 ..... 90
Gráfico 60. Grado de involucramiento de los padres por sexo de los adolescentes escolares del Huila, 2025. ..... 90
Gráfico 61. Grado de involucramiento de los padres relacionado con el consumo de sustancias de los adolescentes escolares del Huila, 2025 ..... 91

# Lista de tablas

Tabla 1. Estudiantes encuestados y población representada. 12
Tabla 2. Características sociodemográficas de adolescentes escolares encuestados. Huila 2025 14
Tabla 3. Características académicas y laborales de adolescentes escolares. Huila 2025 16
Tabla 4. Situaciones de convivencia escolar reportadas en los últimos 12 meses 17
Tabla 5. Características familiares de los estudiantes escolares en el Huila 19
Tabla 6. Prevalencia de vida, último año, y mes por sustancia. Huila 2025 21
Tabla 7. Prevalencia de consumo de alcohol según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 23
Tabla 8. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 28
*Tabla 9. Prevalencia de consumo de tabaco o cigarrillo según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025* 32
*Tabla 10. Prevalencia de consumo de marihuana según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025* 36
*Tabla 11. Uso riesgoso de la marihuana según sexo, tipo de institución educativa y grado.* 40
Tabla 12. Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 41
Tabla 13. Prevalencia de consumo de estimulantes sin fórmula médica según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 45
Tabla 14. Prevalencia de consumo de cocaína según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 48
Tabla 15. Prevalencia de consumo de bazuco según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 51
Tabla 16. Prevalencia de consumo de éxtasis según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 54
Tabla 17. Prevalencia de consumo de sustancias inhalables según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 57
Tabla 18. Prevalencia de consumo de dick (ladys y fragancia) según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 60
Tabla 19. Prevalencia de consumo de popper según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 64
Tabla 20. Prevalencia de consumo de LSD o tripi según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 67
Tabla 21. Prevalencia de consumo de hongos según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 70
Tabla 22. Prevalencia de consumo de yagé según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 74
Tabla 23. Prevalencia de consumo de 2CB (Tucibi o nexus) según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 77

Tabla 24. Prevalencia de consumo de cacao sabanero según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 ..... 80
Tabla 25. Tabla 20. Prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025 ..... 83
Tabla 26. Percepción de riesgo moderado o alto frente a conductas de consumo de sustancias en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 85
Tabla 27. Situaciones de riesgo según consumo de sustancias ilegales en adolescentes escolares. Huila, 2025 ..... 86
Tabla 28. Proporción de adolescentes escolares que consideran fácil obtener bebidas alcohólicas, según tipo de bebida. Huila, 2025 ..... 87
Tabla 29. Proporción de adolescentes escolares que consideran fácil obtener sustancias de uso ilegal, según sustancia. Huila, 2025 ..... 88

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio tuvo como propósito caracterizar el consumo de sustancias psicoactivas y sus factores asociados en la población escolar del departamento del Huila, logrando una cobertura geográfica del 100% en los 37 municipios del territorio.

**Metodología:** La investigación desplegó un equipo de 82 encuestadores capacitados, quienes aplicaron el instrumento en instituciones educativas tanto urbanas como rurales, superando desafíos de accesibilidad y orden público mediante la concertación con rectores y enlaces municipales. La muestra efectiva consolidada fue de 11.960 estudiantes, lo que garantiza la representatividad estadística para una población universo de 67.431 escolares matriculados en los grados 7° a 11°.

**Resultados:**
La edad promedio de la población estudiada es de 14.8 años. La distribución por sexo muestra una ligera mayoría femenina (52.5%) frente a la masculina (47.1%). El 95.3% de los estudiantes encuestados pertenece a instituciones oficiales. Como factores de riesgo contextuales, se identificó que un 15% de los estudiantes ha reprobado algún grado escolar y un 16.6% manifiesta poca o ninguna satisfacción con la asistencia al colegio, indicadores claves para el diseño de estrategias de prevención.

Para el departamento del Huila, se encontró que las sustancias de mayor consumo en adolescentes escolares fueron alcohol, cigarrillo electrónicos o mal llamados vapeadores, tabaco o cigarrillo, y marihuana.

Alcohol: presenta las cifras más altas en todos los indicadores. Un 57.4% de los estudiantes lo ha consumido alguna vez en la vida, el 48.1% en el último año y un 28.0% mantiene un consumo actual (último mes). Al analizar por sexo, se evidencia una diferencia importante: las mujeres presentan prevalencias de consumo más altas que los hombres (60.8% vs 53.3% en prevalencia de vida). La edad de inicio promedio se sitúa en los 13.2 años, evidenciando un contacto precoz con la sustancia.

Cigarrillos electrónicos “vapeadores”: se posiciona como la segunda conducta de riesgo más frecuente, con una prevalencia de vida del 34.5% y un uso actual del 14.6%. A diferencia del alcohol, el consumo de vapeadores es ligeramente superior

en hombres (34.8%) y muestra su pico más alto en los estudiantes de grado décimo. Su edad de inicio promedio es de 13.8 años.

Tabaco/cigarrillo: aunque ha sido desplazado al tercer lugar por los vapeadores, el cigarrillo tradicional mantiene una presencia relevante con una prevalencia de vida del 16.7% y un consumo actual del 6.1%. A diferencia de otras sustancias donde la diferencia de género se cierra, el tabaco sigue mostrando un patrón de consumo mayoritariamente masculino. Su uso se intensifica en los grados superiores (10° y 11°).

Marihuana: es la sustancia Ilícita de mayor prevalencia La marihuana se ratifica como la sustancia ilegal de mayor consumo entre los escolares del departamento, con una prevalencia de vida del 7.9% y un uso actual del 2.9%. Los datos indican que el primer contacto suele ocurrir, en promedio, hacia los 14 años. Existe una correlación visible con el grado escolar: a medida que aumenta el nivel educativo, aumenta la experimentación, alcanzando sus picos más altos en la educación media.

Cualquier sustancia ilícita: se refiere al uso de una o más de las siguientes sustancias: 2CB, bazuco, cacao sabanero, cocaína, DICCK (ladys, fragancia), éxtasis MDMA, hongos, LSD, marihuana, popper, sustancias inhalables, yagé. El consumo de cualquier sustancia ilícita muestra prevalencias diferentes por sexo y tipo de institución educativa, tendiendo prevalencias superiores el sexo masculino y los estudiantes de instituciones educativas privadas. El promedio de edad para el inicio de cualquier sustancia ilícita fue de 14.1 años, siendo similar para ambos sexos.

# 2. PROCESO METODOLÓGICO

## 2.1. Aspectos metodológicos del trabajo de campo

El presente estudio se desarrolló con el propósito fundamental de obtener información confiable, estandarizada y representativa sobre el consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar del departamento del Huila. El trabajo de campo garantizó una cobertura del 100% en los 37 municipios del territorio.

Para la ejecución del trabajo de campo, se desplegó un equipo conformado por 82 encuestadores altamente capacitados, quienes recibieron formación específica en el protocolo de aplicación y la cadena de custodia de la información. Este equipo contó con una estructura de coordinación zonal encargada de la planificación de rutas, el acompañamiento operativo, la supervisión, y control de calidad en terreno.

La fase preparatoria incluyó la elaboración de rutas territoriales y la concertación directa con rectores y enlaces institucionales, asegurando la socialización del consentimiento informado institucional y la correcta distribución de los cuadernillos de recolección.

La aplicación de las encuestas se llevó a cabo en instituciones educativas tanto urbanas como rurales. Durante el proceso, el equipo enfrentó situaciones como condiciones difíciles de accesibilidad en áreas rurales, cruce con actividades institucionales y alertas de orden público en zonas específicas. Todas estas situaciones fueron controladas para asegurar el cumplimiento del muestreo, a través de implementación de acciones de reprogramación concertada con los rectores, ajustes dinámicos de rutas y horarios, y una coordinación con enlaces municipales para garantizar el ingreso seguro a los territorios.

Cabe mencionar que, con el fin de preservar la seguridad e integridad de la información, se implementó un riguroso proceso de cadena de custodia de las encuestas. Los cuadernos fueron entregados bajo registro individual y trasladados en sobres sellados y rotulados. Posteriormente, se realizó una consolidación física y verificación de cantidades, realizando un recuento manual y digital de cada lote que incluyó el registro detallado por municipio, institución educativa y grado. Finalmente, el material fue trasladado organizadamente al equipo de digitación para su carga en el aplicativo digital, permitiendo avanzar hacia la fase de depuración y análisis de datos.

## 2.2. Descripción de la muestra y población representada

La muestra efectiva fue de 11960 adolescentes escolares que representan una población de 67431 escolares de grado séptimo a undécimo del departamento del Huila. En la siguiente tabla se presenta la distribución de la muestra por cada municipio.

*Tabla 1. Estudiantes encuestados y población representada.*

| Municipios | Estudiantes encuestados | Población representada |
|---|---|---|
| Acevedo | 363 | 2164 |
| Agrado | 262 | 588 |
| Aipe | 325 | 1085 |
| Algeciras | 345 | 1453 |
| Altamira | 154 | 207 |
| Baraya | 214 | 393 |
| Campoalegre | 351 | 1749 |
| Colombia | 202 | 338 |
| Elías | 178 | 253 |
| Garzón | 494 | 5319 |
| Gigante | 364 | 1877 |
| Guadalupe | 323 | 1154 |
| Hobo | 231 | 418 |
| Íquira | 261 | 624 |
| Isnos | 339 | 1538 |
| La Argentina | 309 | 909 |
| La Plata | 500 | 4511 |
| Nátaga | 245 | 447 |
| Neiva | 979 | 18009 |
| Oporapa | 294 | 768 |
| Paicol | 243 | 419 |
| Palermo | 350 | 1170 |

| Municipios | Estudiantes encuestados | Población representada |
|---|---|---|
| Palestina | 285 | 782 |
| Pital | 303 | 1095 |
| Pitalito | 605 | 8576 |
| Rivera | 332 | 1442 |
| Saladoblanco | 270 | 668 |
| San Agustín | 350 | 2212 |
| Santa María | 260 | 691 |
| Suaza | 342 | 1596 |
| Tarqui | 306 | 1050 |
| Tello | 287 | 691 |
| Teruel | 223 | 381 |
| Tesalia | 285 | 733 |
| Timana | 321 | 1246 |
| Villavieja | 231 | 408 |
| Yaguará | 234 | 467 |
| **Total general** | **11960** | **67431** |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

Las encuestas fueron realizadas en 136 instituciones educativas de los 37 municipios del departamento del Huila.

# 3. RESULTADOS

El siguiente análisis corresponde a la descripción de 11960 encuestas efectivas aplicadas a escolares del grado 7 a 11 en 136 instituciones educativas de los 37 municipios del departamento del Huila.

## 3.1. Características sociodemográficas, académicas y familiares

El promedio y mediana de edad fue de 14.8 y 15 años respectivamente, siendo el sexo femenino la mayor cantidad (n= 6275) representando el 52.5% de los adolescentes. Así mismo, el 60% de los escolares manifestó algún reconocimiento, siendo el mestizo o blanco el más frecuente con el 41.7% correspondiente a 4990 estudiantes. En cuanto al grado entre séptimo y once, cada uno representa alrededor del 20% de los estudiantes analizados (tabla 2).

Los estudiantes pertenecen en su mayoría a instituciones públicas con el 95.3%, equivalentes a 11398 estudiantes, y el restante 4.7% (562) correspondiente a instituciones privadas. En cuanto a los antecedentes académicos de los estudiantes, se evidencia que un 15% manifestó haber perdido algún grado durante la primaria, o en el bachillerato. El 16.6% de los adolescentes manifestó sentir poca o ninguna satisfacción al ir al colegio.

*Tabla 2. Características sociodemográficas de adolescentes escolares encuestados. Huila 2025*


| Variables | N (%) |
|---|---|
| **Sexo** | |
| Femenino | 6275 (52.5) |
| Masculino | 5633 (47.1) |
| Otro | 52 (0.4) |
| **Autoreconocimiento** | |
| Afrocolombiano(a) (negro(a), mulato(a), palanquero(a)) | 670 (5.6) |
| Raizal o Rom | 64 (0.5) |
| Otro | 441 (3.7) |
| Indígena | 583 (4.9) |
| Mestizo o blanco | 4990 (41.7) |
| Víctima del conflicto | 281 (2.3) |
| Migrante | 50 (0.4) |
| Persona con Discapacidad | 43 (0.4) |

| Variables | N (%) |
|---|---|
| **Grupo de edad** | |
| 12 | 971 (8.1) |
| 13 | 1932 (16.2) |
| 14 | 2299 (19.2) |
| 15 | 2379 (19.9) |
| 16 | 2332 (19.5) |
| 17 | 1455 (12.2) |
| 18 o más | 592 (4.9) |
| **Grado académico** | |
| 7 | 2459 (20.6) |
| 8 | 2427 (20.3) |
| 9 | 2441 (20.4) |
| 10 | 2392 (20.0) |
| 11 | 2241 (18.7) |
| **Tipo de institución** | |
| Privado | 562 (4.7) |
| Público | 11398 (95.3) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

De acuerdo con las ausencias al colegio, se evidenció que el principal motivo se debe a problemas de salud (75.3%, n= 8918). Uno de cada cuatro escolar refirió motivos diferentes a la salud, tales como pereza, conflictos familiares, situación económica, o conflictos escolares (gráfica 1).

*Gráfico 1. Motivos de ausencia al colegio en adolescentes escolares. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.2. Características académicas y laborales

Respecto a las características académicas y laborales de los adolescentes, se evidencia que la mayoría de los estudiantes percibe una disciplina medianamente estricta con 40.6% (n= 4851). Por el contrario, el porcentaje de estudiantes que considera que este es nada estricto solo representa el 3.9% (n= 464). En cuanto a la probabilidad de continuar con los estudios, predomina una visión optimista, con el 45.8% (n= 5476) de estudiantes que consideran es muy probable, seguido del 32.9% (n= 3932) que lo consideran probable, mientras que, solo el 1.4% (n= 173) considera este escenario como imposible (tabla 3).

Finalmente, se pudo observar que cerca de la mitad de los estudiantes correspondientes al 44.1% (n= 5269) si realizan actividades laborales en simultanea con el estudio. En cuanto a los estudiantes que, si trabajan, la mayoría con el 59.3% lo hace menos de 10 horas a la semana.

*Tabla 3. Características académicas y laborales de adolescentes escolares. Huila 2025*

| Variables | N (%) |
|---|---|
| **Nivel de disciplina** | |
| Muy estricto | 1039 (8.7) |
| Estricto | 3208 (26.8) |
| Medianamente estricto | 4851 (40.6) |
| Poco estricto | 2398 (20.1) |
| Nada estricto | 464 (3.9) |
| **Probabilidad de continuar otros estudios** | |
| Muy probable | 5476 (45.8) |
| Probable | 3932 (32.9) |
| Poco probable | 1409 (11.8) |
| Imposible | 173 (1.4) |
| No sé | 970 (8.1) |

| Variables | N (%) |
|---|---|
| **Trabaja** | |
| Si | 5269 (44.1) |
| No | 6691 (55.9) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

De acuerdo con los datos recolectados de las dinámicas de convivencia en el colegio, se resalta que la mitad de los encuestados ha molestado a un compañero o compañera entre varios (41.2% alguna vez y 8.8% muchas veces). Esto en línea, con lo reportado por los estudiantes en donde el 38.4% (n= 4584) han sido molestados, estando solo o sola por algunas personas del colegio (tabla 4).

En cuanto, al tema de agresión física directa esta es menor, donde el 84.5% (n= 10101) reportan nunca haber agredido físicamente algún compañero. Por otra parte, resalta que, ante las situaciones de agresión, el 36.9% (4418) admite haber observado y no intervenir, mientras que, el 27% (3222) si intervino para apoyar a la víctima. El 21% (n= 2510) de los estudiantes ha sido víctima de algún tipo de discriminación o estigmatización al menos alguna vez en el último año (tabla 4).

*Tabla 4. Situaciones de convivencia escolar reportadas en los últimos 12 meses*

| Situación | Frecuencia N (%) | | |
|---|---|---|---|
| | **Nunca** | **Alguna vez** | **Muchas veces** |
| Haber molestado a un compañero o compañera entre varios | 5982 (50.0) | 4922 (41.2) | 1056 (8.8) |
| Haber agredido físicamente a un compañero o compañera entre varios | 10101 (84.5) | 1654 (13.8) | 205 (1.7) |
| Haber participado en un grupo que comenzó una pelea con otro grupo | 9958 (83.3) | 1801 (15.1) | 201 (1.7) |
| Haber comenzado una pelea solo o sola | 9719 (81.3) | 1979 (16.5) | 262 (2.2) |
| Haber sido molestado, estando solo o sola, por alguna(s) persona(s) del colegio | 7376 (61.7) | 3907 (32.7) | 677 (5.7) |
| Haber sido agredido físicamente, por alguna(s) persona(s) del colegio | 10158 (84.9) | 1562 (13.1) | 240 (2.0) |
| Haber estado en un grupo que ha sido atacado por otro grupo | 10329 (86.4) | 1443 (12.1) | 188 (1.6) |


| Situación | Frecuencia N (%) | | |
|---|---|---|---|
| | Nunca | Alguna vez | Muchas veces |
| Haber agredido a un profesor | 11473 (95.9) | 381 (3.2) | 106 (0.9) |
| Haber sido agredido por un profesor | 11250 (94.1) | 593 (5.0) | 117 (1.0) |
| Haber observado una situación de agresión escolar y no intervenir en ella | 7542 (63.1) | 3768 (31.5) | 650 (5.4) |
| Haber observado una situación de agresión escolar y haber intervenido para apoyar al agresor | 10431 (87.2) | 1379 (11.5) | 150 (1.3) |
| Haber observado una situación de agresión escolar y haber intervenido para apoyar a la víctima | 8738 (73.1) | 2866 (24.0) | 356 (3.0) |
| Haber sido víctima de cualquier tipo de discriminación o estigmatización | 9450 (79.0) | 2092 (17.5) | 418 (3.5) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.3. Características familiares

De acuerdo con la información suministrada, los estudiantes conviven con principalmente con las mamás con el 88% (n= 10524), seguido de los papás con el 64.8% (n= 7756), en tercer lugar, se encuentran los abuelos con el 16.5% (n= 1974) (gráfico 2)

*Gráfico 2. Personas con quien conviven los adolescentes escolares del Huila.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El 61.5% (n= 7358) de los adolescentes escolares manifestó que sus padres viven juntos, ya sean casados con el 34.8% (n= 4163) o en unión libre con el 26.7% (n= 3195). En cuanto, a la presencia y cuidado en el hogar, se evidencia la mayor presencia por parte de la mamá con el 75% de los casos (n= 8967), seguido de la presencia de los hermanos con el 55.8% (n= 6671) y, en tercer lugar, el papá hace presencia solo el 38.1% (n= 4558). Así mismo, se observa respecto a la red de apoyo emocional del menor, en donde la mayoría de los estudiantes acuden principalmente a la madre con el 65.3% (n= 7807). Se resalta que 1 de cada 4 estudiantes (25.6%) ante algún problema prefiere resolverlo solo o sola.

Finalmente, se observa que el nivel educativo más alcanzado por las madres es la secundaria o bachillerato con el 45.9% (n= 5491). En el caso de los padres, existe una paridad entre quienes alcanzaron la primaria (39.6%) y la secundaria (39.4%) (tabla 5).

*Tabla 5. Características familiares de los estudiantes escolares en el Huila*


| Variables | N (%) |
|---|---|
| **Estado Civil/Relación de Padres** | |
| Casados | 4163 (34.8) |
| Divorciados o separados | 3014 (25.2) |
| Viudo(a) | 614 (2.6) |
| Unión Libre (Viven juntos, pero no están casados) | 3195 (26.7) |
| Soltero(a) | 663 (5.5) |
| No sé | 611 (5.1) |
| **Al llegar a su casa del colegio un día entre semana ¿con quién esta?** | |
| Mamá | 8967 (75.0) |
| Papá | 4558 (38.1) |
| Hermano(s) | 6671 (55.8) |
| Solo | 1576 (13.2) |
| Amigo(s) | 621 (5.2) |
| Abuelo(s) | 2207 (18.5) |
| Tío(a) | 0 (0.0) |
| Otras personas | 789 (6.6) |
| **Cuando tiene algún problema ¿a quién acude?** | |
| Padre | 3872 (32.4) |
| Madre | 7807 (65.3) |
| Padrastro | 281 (2.3) |
| Madrastra | 103 (0.9) |
| Hermano(s) | 2337 (19.5) |
| Hermanastro(s) | 114 (1) |
| Novio(a) | 1022 (8.5) |
| Esposo(a) | 26 (0.2) |
| Amigo(s) | 2442 (20.4) |
| Abuelo(s) | 1182 (9.9) |
| Primo(s) | 661 (5.5) |
| Maestro(s)/Profesores | 781 (6.5) |
| Los resuelve solo o sola | 3064 (25.6) |
| A nadie | 1259 (10.5) |
| Otras personas | 498 (4.2) |

| Variables | N (%) |
|---|---|
| **Nivel de educación más alto alcanzado por su madre** | |
| Primaria | 3485 (29.1) |
| Secundaria o bachillerato/Normalista | 5491 (45.9) |
| Técnico o tecnólogo | 1118 (9.4) |
| Universitario o profesional | 1751 (14.6) |
| No tiene estudios | 115 (1.0) |
| **Nivel de educación más alto alcanzado por su padre** | |
| Primaria | 4731 (39.6) |
| Secundaria o bachillerato/Normalista | 4715 (39.4) |
| Técnico o tecnólogo | 800 (6.7) |
| Universitario o profesional | 1319 (11.0) |
| No tiene estudios | 395 (3.3) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

De acuerdo con la información suministrada por los estudiantes, se evidencia que la mayoría presenta buenas relaciones con sus mamás (84.2%) y sus papás (70.0%), siendo el porcentaje de mala relación con las madres de tan solo el 1.57% (n= 188), mientras que con los padres llega al 3.9% (n= 466) (gráfica 3).

*Gráfico 3. Relación que tienen actualmente con su madre, padre o acudiente los adolescentes escolares del Huila.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

## 3.4. Resultados sobre el consumo de sustancias psicoactivas

Para este capítulo, se presentan los principales resultados del consumo de cada sustancia psicoactiva. Adicionalmente, se presentan los indicadores de consumo para las sustancias ilegales, dentro de las que se contemplan marihuana, cocaína, basuco, popper, dick, éxtasis, pegantes/solventes/pinturas, heroína, LSD y otros alucinógenos (ácido, hongos, yagé y cacao sabanero). El análisis se presenta con base en 3 tipos de prevalencias: de vida, donde el escolar ha manifestado el consumo en algún momento de su vida; último año (también conocido como reciente), que significa consumo en los últimos 12 meses; y último mes (conocido como actual).

Para el departamento del Huila, se encontró que las sustancias de mayor consumo en adolescentes escolares fueron alcohol, cigarrillo electrónicos o mal llamados vapeadores, tabaco o cigarrillo, y marihuana (tabla 6). Las demás sustancias tienen una prevalencia en el último mes por debajo del 2.5% (tabla 6).

*Tabla 6. Prevalencia de vida, último año, y mes por sustancia. Huila 2025*

| Sustancia | Vida | Último año | Último mes |
|---|---|---|---|
| Alcohol | 57.4 | 48.1 | 28.0 |
| Cigarrillos electrónicos o “vapeadores” | 34.5 | 27.5 | 14.6 |
| Tabaco o cigarrillo | 16.7 | 10.8 | 6.1 |
| Marihuana | 7.9 | 5.4 | 2.9 |
| Tranquilizantes sin formula medica | 6.1 | 4.3 | 2.4 |
| Cocaína | 4.9 | 3.6 | 2.0 |
| Popper | 4.9 | 3.4 | 2.0 |
| Sustancias inhalables | 4.2 | 2.8 | 1.5 |
| Estimulante sin formula medica | 3.6 | 2.7 | 1.5 |
| 2cb | 3.0 | 2.2 | 1.6 |
| Basuco | 2.9 | 2.3 | 1.4 |
| Dick Ladys Fragancia | 2.7 | 1.9 | 1.3 |
| Hongos | 2.7 | 1.9 | 1.2 |
| Éxtasis Mdma | 2.6 | 2.0 | 1.2 |
| Cacao sabanero | 2.4 | 1.7 | 1.2 |
| LSD | 2.2 | 1.7 | 1.1 |
| Yagé | 2.1 | 1.7 | 1.1 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

De manera complementaria, a continuación, para cada sustancia se presentan los resultados considerando de forma paralela las variables sexo, tipo de institución educativa, área de residencia y curso académico, manteniendo el mismo nivel de análisis para cada una de ellas. En todos los casos se describen las prevalencias de consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes, con el propósito de caracterizar el comportamiento del consumo desde distintas dimensiones sociodemográficas, territoriales y educativas. En el análisis por sexo se incluye la categoría “otros”; no obstante, las prevalencias elevadas observadas deben interpretarse con cautela debido al reducido número de estudiantes que la conforman, lo que genera estimaciones con menor precisión, siendo necesario el desarrollo de estudios específicos que permitan profundizar en este grupo poblacional.

### 3.4.1. Alcohol

El alcohol es una sustancia de consumo legal, administrada principalmente por vía oral en forma de bebidas alcohólicas, ampliamente aceptada a nivel social, cuyos efectos pueden alterar el juicio, la coordinación y el comportamiento.

#### 3.4.1.1. Indicadores de consumo

Siendo la sustancia de mayor consumo en escolares adolescentes del Huila, el consumo de alcohol en la población escolar se mantiene elevado en las tres prevalencias analizadas. Por sexo, la prevalencia de vida es mayor en las mujeres (60.8 %) que en los hombres (53.3 %); esta diferencia también se observa en la prevalencia del último año, con 51.3 % en mujeres y 44.4 % en hombres, y en la prevalencia del último mes, con 30.2 % y 25.0 %, respectivamente. Según el tipo de institución educativa, la prevalencia de vida es ligeramente superior en estudiantes de instituciones privadas frente a las públicas, con una diferencia de 4.1 puntos porcentuales; sin embargo, en la prevalencia del último año y del último mes, los valores son similares entre ambos tipos de institución. En relación con la zona de residencia, la prevalencia de vida es mayor en el área rural (59.2 %) que en la urbana (56.7 %); esta misma tendencia se mantiene en la prevalencia del último año y en la prevalencia del último mes, lo que evidencia una mayor persistencia del consumo de alcohol en contextos rurales (tabla 7).


*Tabla 7. Prevalencia de consumo de alcohol según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida IC 95% | Último año IC 95% | Último mes IC 95% |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 60.8 (57.1 – 64.5) | 51.3 (47.6 – 55.1) | 30.2 (27.4 – 33.1) |
| Masculino | 53.3 (49.4 – 57.2) | 44.4 (41.0 – 47.7) | 25.0 (21.9 – 28.1) |
| Otros | 82.1 (59.4 – 104.8) | 73.1 (42.3 – 104.0) | 67.9 (32.5 – 103.3) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 61.0 (53.4 – 68.5) | 49.5 (40.1 – 58.9) | 27.3 (16.4 – 38.2) |
| Público | 56.9 (53.2 – 60.6) | 48.0 (44.4 – 51.5) | 28.1 (25.3 – 30.9) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 56.7 (52.2 – 61.2) | 47.1 (42.7 – 51.5) | 27.6 (24.0 – 31.3) |
| Rural | 59.2 (56.1 – 62.3) | 51 (48.2 – 53.7) | 29.2 (26.9 – 31.6) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

Se observa un aumento progresivo del consumo a medida que avanza el curso académico, con una mayor proporción de estudiantes que han consumido alguna vez en la vida, así como en el periodo reciente y en el último mes, desde séptimo hasta undécimo grado. Este patrón indica una consolidación del consumo en los cursos superiores de la educación secundaria (gráfica 4).


*Gráfico 4. Prevalencia de consumo de alcohol por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

La distribución municipal de la prevalencia en el último año, evidencia una amplia variabilidad territorial. Los valores más altos se concentran en los municipios de Teruel, Saladoblanco y Oporapa, mientras que el menor valor se registra en Aipe, no se presentan municipios sin registro. La estimación departamental se sitúa en un nivel intermedio dentro del conjunto municipal, reflejando un comportamiento promedio frente a las diferencias observadas entre territorios.

*Gráfico 5. Prevalencia de consumo de alcohol en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.4.1.2. Edad de inicio

La edad de inicio del consumo de alcohol se concentra en la adolescencia temprana, con un promedio general de 13.2 años. Las diferencias por sexo son mínimas, con promedios similares en mujeres y hombres, mientras que las personas que se reconocen en una categoría distinta al binario femenino/masculino presentan un inicio ligeramente más temprano. La mediana de 14 años y la edad mínima de 8 años evidencian un inicio precoz en una parte de la población.

*Gráfico 6. Edad de inicio del consumo de alcohol según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*


| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 13.3 | 8 | 14 |
| Masculino | 13.2 | 8 | 14 |
| Otro | 12.5 | 8 | 13 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.4.1.3. Motivaciones para el consumo de alcohol

La mayoría de los adolescentes considera que los tres principales motivos para que una persona consuma alcohol son: para olvidar problemas, para pasarlo bien con los amigos, y por tristezas, todos con un porcentaje por encima del 40% tanto para el sexo femenino, como masculino (gráfica 7).

*Gráfico 7. Motivos que expresan los adolescentes escolares para consumir alcohol*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.2. Cigarrillos electrónicos o ´vapeadores´[1]

Son dispositivos utilizados para la inhalación de aerosoles que pueden contener nicotina u otras sustancias químicas, administrados por vía inhalatoria. Su consumo suele darse en entornos juveniles y recreativos, tanto como forma de experimentación como alternativa al cigarrillo convencional.

#### 3.4.2.1. Indicadores de consumo

El consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores muestra prevalencias moderadas en la población escolar, con una reducción progresiva entre la prevalencia de vida, la del último año y la del último mes. En cuanto al sexo, la prevalencia de vida es ligeramente mayor en los hombres (34.8 %) que en las mujeres (33.4 %), esta diferencia se mantiene en la prevalencia del último año, mientras que en la prevalencia del último mes los valores son similares. Al analizar el tipo de institución educativa, la prevalencia de vida es levemente mayor en estudiantes de instituciones públicas frente a las privadas (34.6 % versus 32.9 %); esta tendencia se mantiene en la prevalencia del último año, mientras que en la prevalencia del último mes los valores fueron similares lo que sugiere patrones de consumo reciente comparables entre ambos sectores educativos. Desde el punto de vista territorial, la prevalencia de vida es prácticamente similar entre el área

[1] El uso de la palabra ´vapeadores´ hace referencia al uso incorrecto de la palabra. Es por esto, que en el informe se pone entre comillas.

urbana y la rural (34.0 % y 34.6 % respectivamente); esta proximidad se conserva en la prevalencia del último año, por su parte, en la prevalencia del último mes se observa una diferencia algo mayor, con 15.1 % en el área urbana y 13.3 % en la rural (tabla 8).


*Tabla 8. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida IC 95% | Último año IC 95% | Último mes IC 95% |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 33.4 (30.8 – 36.0) | 26.6 (24.0 – 29.2) | 14.4 (12.2 – 16.6) |
| Masculino | 34.8 (30.6 – 39.1) | 27.8 (23.5 – 32.2) | 13.9 (10.8 – 17.0) |
| Otros | 67.1 (31.4 – 102.9) | 59.1 (15.8 – 102.4) | 56.3 (10.5 – 102.0) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 32.9 (25.5 – 40.3) | 26.5 (20.0 – 32.9) | 15.7 (7.8 – 23.5) |
| Público | 34.6 (31.5 – 37.8) | 27.7 (24.3 – 31.1) | 14.5 (11.9 – 17) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 34.6 (30.7 – 38.6) | 27.6 (23.5 – 31.8) | 15.1 (11.9 – 18.2) |
| Rural | 34 (31.4 – 36.6) | 27.3 (24.6 – 30.0) | 13.3 (11.2 – 15.4) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El consumo por curso muestra un aumento desde el grado séptimo hasta noveno, en el grado decimo se registran los niveles más altos, seguido de una disminución en once, especialmente en el uso reciente (grafica 8).


*Gráfico 8. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El análisis territorial de la prevalencia en el último año, muestra contrastes claros entre municipios. Los niveles más altos se registran en Isnos, Palermo y Neiva, mientras que los valores más bajos se concentran en Aipe y Altamira. En este escenario, la estimación departamental se sitúa en un rango intermedio, evidenciando un comportamiento promedio frente a la dispersión observada a nivel municipal (gráfica 9).

*Gráfico 9. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónico o vapeadores en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.2.2. Edad de inicio

La edad de inicio se concentra en la adolescencia temprana, con un promedio general de 13.8 años y valores muy similares entre mujeres (13.7 años), hombres (13.9 años) y quienes se identifican en una categoría distinta al binario

femenino/masculino (13.8 años), lo que evidencia un patrón homogéneo por sexo. En todos los casos, la edad mínima registrada fue de 10 años y la mediana se ubicó en 14 años, indicando que al menos la mitad de las personas inició el consumo antes o durante los primeros años de la adolescencia.

*Gráfico 10. Edad de inicio del consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio de edad | Edad Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 13.7 | 10 | 14 |
| Masculino | 13.9 | 10 | 14 |
| Otro | 13.8 | 10 | 14 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.3. Tabaco/cigarrillo

Tabaco o cigarrillo es un producto de consumo legal que contiene nicotina, administrado por vía inhalatoria a través del humo, con alta capacidad de generar dependencia.

#### 3.4.3.1. Indicadores de consumo

Por sexo, la prevalencia de vida es mayor en los hombres (18.0 %) que en las mujeres (14.5 %); esta diferencia se mantiene en la prevalencia del último año y en la prevalencia del último mes, lo que evidencia una mayor continuidad del consumo en el sexo masculino. Según el tipo de institución educativa, la prevalencia de vida fue ligeramente mayor en estudiantes de instituciones públicas (17.0 %) frente a las privadas (14.1 %), con una diferencia de 2.9 puntos porcentuales; sin embargo, en la prevalencia del último año y del último mes se observan valores más altos en instituciones privadas, con 12.2 % y 7.9 %, respectivamente, frente a 10.7 % y 5.9 % en el sector público, lo que sugiere una mayor persistencia del consumo reciente en el ámbito privado. En relación con la zona de residencia, la prevalencia de vida es similar entre el área rural y la urbana; esta tendencia se mantiene en la prevalencia del último año y del último mes, lo que indica patrones de consumo recientes comparables entre ambos contextos territoriales (tabla 9).


*Tabla 9. Prevalencia de consumo de tabaco o cigarrillo según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida IC 95% | Último año IC 95% | Último mes IC 95% |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 14.5 (12.8 – 16.1) | 9.5 (7.8 – 11.1) | 5.1 (3.7 – 6.4) |
| Masculino | 18 (15.4 – 20.6) | 11.2 (9.8 – 12.6) | 6.2 (5.4 – 7.0) |
| Otros | 59.4 (16.5 – 102.3) | 56.8 (11.6 -102.0) | 53.1 (4.3 – 101.8) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 14.1 (5 – 23.2) | 12.2 (2.9 – 21.4) | 7.9 (0.3 – 15.4) |
| Público | 17 (15 – 19.0) | 10.7 (9.3 – 12.0) | 5.9 (5.1 – 6.7) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 16.4 (13.7 – 19.1) | 10.6 (8.6 – 12.7) | 6.0 (4.6 – 7.5) |
| Rural | 17.4 (15.4 – 19.4) | 11.4 (9.8 – 13.0) | 6.5 (5.2 – 7.8) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

Por curso académico, se observa que el consumo aumenta desde grado séptimo hasta grado noveno, curso en el que se concentran los niveles más altos tantos de las tres prevalencias. A partir de grado décimo se presenta una reducción, aunque la prevalencia de vida se mantiene en valores elevados hacia grado undécimo. (gráfica 11).


*Gráfico 11. Prevalencia de consumo de tabaco o cigarrillo por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

La distribución municipal de la prevalencia en el último año, muestra una dispersión amplia de valores, con un grupo reducido de municipios que concentran las estimaciones más elevadas siendo Colombia y Santa María los primeros, mientras que en el extremo inferior se encuentra Hobo, con la menor estimación registrada. La prevalencia departamental se posiciona dentro del segmento medio de la distribución, reflejando un nivel intermedio frente al comportamiento heterogéneo observado entre municipios (gráfica 12).

*Gráfico 12. Prevalencia de consumo de tabaco o cigarrillo en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.3.2. Edad de inicio

Al analizar la edad de inicio, se observa que el consumo comienza en edades tempranas, con un promedio general de 13.2 años. Los valores son cercanos entre mujeres y hombres, mientras que en el grupo registrado en una categoría distinta al femenino y masculino el inicio se presenta a edades más tempranas. En todos los

casos, la edad mínima reportada fue de 10 años y la mediana se ubicó en 13 años, lo que indica que al menos la mitad de las personas inició el consumo antes de los 14 años.

*Gráfico 13. Edad de inicio del consumo de tabaco o cigarrillo según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio de edad | Edad Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 13.1 | 10 | 13 |
| Masculino | 13.4 | 10 | 13 |
| Otro | 13 | 10 | 13 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.4. Marihuana

Es una sustancia de origen vegetal, administrada principalmente por vía inhalatoria y, en menor medida, por vía oral en preparaciones caseras, cuyo consumo puede generar alteraciones en la memoria, la atención y la percepción. Su consumo suele darse en contextos recreativos y de socialización, generalmente en grupos de pares y fuera del entorno escolar, donde se utiliza con fines de relajación o evasión emocional.

#### 3.4.4.1. Indicadores de consumo

Por sexo, la prevalencia de vida fue mayor en los hombres (8.1 %) que en las mujeres (6.6 %). Según el tipo de institución educativa, la prevalencia de vida fue ligeramente mayor en estudiantes de instituciones privadas frente a las públicas con una diferencia de 1.2 puntos porcentuales; esta diferencia se amplía en la prevalencia del último año, con 8.0 % en el sector privado y 5.0 % en el público, y se mantiene en la prevalencia del último mes, con 6.6 % y 2.5 %, respectivamente, lo que sugiere una mayor persistencia del consumo en el ámbito privado. En relación con la zona de residencia, la prevalencia de vida fue superior en el área urbana en comparación con la rural, tendencia que se conserva en la prevalencia del último año y mes (tabla 10).


*Tabla 10. Prevalencia de consumo de marihuana según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida IC 95% | Último año IC 95% | Último mes IC 95% |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 6.6 (5.2 – 8.0) | 4.2 (3.1 – 5.3) | 2.0 (1.3- 2.6) |
| Masculino | 8.1 (5.9- 10.3) | 5.5 (4.3 – 6.7) | 2.8 (2.1 – 3.5) |
| Otros | 54.0 (6.1 – 101.9) | 53.4 (5.0 – 101.8) | 52.0 (2.4 – 101.7) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 8.9 (0.2 – 18.0) | 8 (0.5 – 17.4) | 6.6 (-2.4 – 15.5) |
| Público | 7.7 (6.1 – 9.4) | 5.0 (4.0 – 6.1) | 2.5 (1.9 – 3.0) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 8.3 (5.9 – 10.6) | 5.8 (3.9 – 7.6) | 3.2 (1.7 – 4.8) |
| Rural | 6.7 (5.4 – 8.0) | 4.4 (3.4 – 5.3) | 2.1 (1.4 – 2.7) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El patrón por curso académico evidencia que todas las prevalencias, se incrementan desde el grado séptimo hasta noveno, alcanzando su punto más alto en este último, mientras que en los grados posteriores se observa una disminución (gráfica 14).


*Gráfico 14. Prevalencia de consumo de marihuana por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

En el análisis territorial de la prevalencia de consumo en el último año, se evidencian contrastes claros entre municipios, con valores más elevados concentrados en Neiva, Baraya y Colombia, mientras que los registros más bajos se observan en Tarqui, Teruel y Timaná. En este contexto, la estimación departamental se ubica en una posición relativamente alta dentro de la distribución municipal lo que refleja que un grupo de municipios con valores superiores explica la prevalencia departamental (gráfica 15).

*Gráfico 15. Prevalencia de consumo de marihuana en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.4.4.2. Edad de inicio

La edad de inicio promedio es de 14.1 años. Se observan diferencias moderadas por sexo, con un inicio ligeramente más temprano en mujeres (13.9 años) frente a los hombres (14.3 años), mientras que en las personas registradas en una categoría distinta al femenino y masculino el promedio se mantiene cercano a estos valores. En todos los casos, la edad mínima reportada fue de 12 años y la mediana se ubicó en 14 años, lo que indica que una proporción importante inició el consumo antes o alrededor de esa edad (gráfica 16).

*Gráfico 16. Edad de inicio del consumo de marihuana según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*


| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 13.9 | 12 | 14 |
| Masculino | 14.3 | 12 | 14 |
| Otro | 13.6 | 12 | 14 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.4.4.3. Motivaciones para el consumo de marihuana

La mayoría de los adolescentes considera que los tres principales motivos para que una persona consuma marihuana son: para olvidar problemas, por tristeza, y por el gusto o agrado de las sensaciones que produce, todos con un porcentaje por encima del 30% tanto para el sexo femenino, como masculino (gráfica 17).

*Gráfico 17. Motivos que expresan los adolescentes escolares para consumir marihuana*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.4.4. Uso riesgoso de marihuana

La escala CAST (Cannabis Abuse Screening Test) fue utilizada para evaluar el riesgo por el consumo de marihuana, en estudiantes que consumieron esta sustancia en el último año. La escala consta de seis preguntas sobre situaciones relacionadas con el consumo y la frecuencia con que se presentan.

Se observó que adolescentes del sexo masculino (36.0%) y de institución educativa pública (34.0%) tienen un mayor riesgo por el consumo de marihuana (tabla 11). No hubo diferencia en la edad de los adolescentes teniendo en cuenta el riesgo por el uso de la marihuana.

*Tabla 11. Uso riesgoso de la marihuana según sexo, tipo de institución educativa y grado.*

| CATEGORIA | ALTO RIESGO | BAJO RIESGO | NO PROBLEMÁTICO |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 26 (11.8%) | 39 (17.7%) | 155 (70.5%) |
| Masculino | 34 (11.1%) | 76 (24.9%) | 195 (63.9%) |
| Otro | 0 (0%) | 4 (50%) | 4 (50%) |
| **Tipo de institución** | | | |
| Privado | 2 (9.5%) | 3 (14.3%) | 16 (76.2%) |
| Público | 58 (11.3%) | 116 (22.7%) | 338 (66%) |
| **Grado** | | | |
| 7 | 8 (9.5%) | 20 (23.8%) | 56 (66.7%) |
| 8 | 16 (14.7%) | 19 (17.4%) | 74 (67.9%) |
| 9 | 18 (15%) | 30 (25%) | 72 (60%) |
| 10 | 11 (9.6%) | 25 (21.9%) | 78 (68.4%) |
| 11 | 7 (6.6%) | 25 (23.6%) | 74 (69.8%) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.5. Medicamentos de prescripción médica

Los medicamentos sin prescripción médica descritos a continuación corresponden a productos farmacéuticos que son consumidos de manera intencional y no terapéutica con fines de alteración del estado de conciencia, el ánimo o la percepción. El consumo se realiza en dosis superiores a las recomendadas, con mayor frecuencia o en contextos distintos a los clínicos. Para el contexto del presente estudio, se tomaron en cuenta los tranquilizantes y estimulantes.

#### 3.4.5.1. Tranquilizantes sin fórmula médica

Son medicamentos de uso controlado administrados por vía oral, empleados sin indicación médica para manejar ansiedad o dificultades para dormir.

##### 3.4.5.1.1. Indicadores de consumo

Por sexo, la prevalencia de vida fue mayor en las mujeres (6.5 %) que en los hombres (4.6 %), igual tendencia para las prevalencias del último año y mes, pero con diferencias menores, 1.6 y 0.8 puntos porcentuales respectivamente. Según el tipo de institución educativa, la prevalencia de vida fue considerablemente mayor en estudiantes de instituciones privadas (10.6 %) frente a las públicas (5.5 %); esta diferencia persiste en la prevalencia del último año y del último mes, lo que indica una mayor persistencia del consumo reciente en el ámbito privado. En relación con la zona de residencia, la prevalencia de vida fue ligeramente mayor en el área urbana que en la rural, con una diferencia de 1.1 puntos porcentuales; tendencia se mantiene en las otras dos prevalencias calculadas, lo que sugiere patrones de consumo recientes relativamente similares entre ambos contextos territoriales.

*Tabla 12. Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*


| | Vida (IC95%) | Último año (IC95%) | Último mes (IC95%) |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 6.5 (5 - 7.6) | 4.6 (4 - 5.5) | 2.3 (2 - 2.9) |
| Masculino | 4.6 (4 - 5.5) | 3.0 (2 - 3.8) | 1.5 (1 - 2.1) |
| Otros | 54.0 (6 - 101.7) | 51.3 (1 - 101.5) | 51.3 (1 - 101.5) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 10.6 (3 - 18.6) | 8.9 (0 - 17.6) | 8.6 (0 - 16.9) |
| Público | 5.5 (5 - 6.3) | 3.7 (3 - 4.4) | 1.7 (1 - 2.1) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 6.4 (5 - 8.0) | 4.5 (3 - 6.1) | 2.5 (1 - 4.1) |
| Rural | 5.3 (4 - 6.4) | 3.7 (3 - 4.7) | 2.2 (1 - 3.0) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

Por curso académico, aunque la prevalencia de vida es mayor en todos los cursos, se aprecia un aumento del consumo desde los grados séptimo hasta noveno,

seguido de una disminución en los grados posteriores para todos los tipos de prevalencia (gráfica 18).


*Gráfico 18. Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

La distribución municipal de la prevalencia reciente, muestra una heterogeneidad marcada, con Neiva ubicada en el extremo superior del ordenamiento y un grupo reducido de municipios con valores cercanos. En contraste, la mayoría de los municipios se concentra en rangos inferiores. En este escenario, el valor departamental se sitúa en un tramo alto de la distribución, influenciado por un conjunto reducido de municipios con prevalencias superiores (gráfica 19).

*Gráfico 19. Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.5.1.2. Edad de inicio

Al analizar la edad de inicio del consumo, se observa que esta se concentra alrededor de los 14 años, con un promedio general de 13.9 años. El inicio se presenta ligeramente más temprano en las mujeres frente a los hombres, mientras

que las personas registradas en una categoría distinta al sexo femenino y masculino muestran un inicio más tardío, con un promedio de 15.2 años. La edad mínima reportada fue de 12 años en ambos sexos, y de 14 años en el grupo restante, mientras que la mediana se ubicó en 14 años para mujeres y hombres, y en 15 años para dicha categoría, lo que sugiere un inicio mayoritariamente concentrado en la adolescencia temprana.

*Gráfico 20. Edad de inicio del consumo de tranquilizantes sin fórmula médica según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 13.7 | 12 | 14 |
| Masculino | 14.1 | 12 | 14 |
| Otro | 15.2 | 14 | 15 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.4.5.2. Estimulantes sin prescripción médica

Corresponden a medicamentos de uso farmacológico administrados por vía oral, diseñados para estimular el sistema nervioso central y aumentar temporalmente el estado de alerta y la capacidad de concentración.

##### 3.4.5.2.1. Indicadores de consumo

Por sexo, la prevalencia de vida fue mayor en las mujeres (3.6 %) que en los hombres (2.5 %); este contraste se mantiene en la prevalencia del último año, con 2.6 % en mujeres y 1.7 % en hombres, y en la prevalencia del último mes, con 1.2 % y 0.8 %, respectivamente, lo que indica una mayor frecuencia tanto de experimentación como de consumo reciente en el sexo femenino. Según el tipo de institución educativa, la prevalencia de vida fue considerablemente mayor en estudiantes de instituciones privadas (9.0 %) frente a las públicas (2.9 %), esta diferencia persiste en la prevalencia del último año y el último mes, con diferencias entre 4 y 5 puntos porcentuales. En relación con la zona de residencia, la prevalencia de vida fue superior en el área urbana (3.9 %) en comparación con la rural (2.7 %), tendencia que se mantiene en las otras prevalencias calculadas (tabla 13).


*Tabla 13. Prevalencia de consumo de estimulantes sin fórmula médica según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida (IC95%) | Último año (IC95%) | Último mes (IC95%) |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 3.6 (3 - 4.4) | 2.6 (2 - 3.4) | 1.2 (1 - 1.6) |
| Masculino | 2.5 (2 - 3.3) | 1.7 (1 - 2.5) | 0.8 (1 - 1.1) |
| Otros | 51.7 (2 - 101.6) | 51.7 (2 - 101.6) | 51.3 (1 - 101.5) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 9.0 (1 - 16.6) | 7.7 (0 - 15.3) | 5.9 (-2 - 14.3) |
| Público | 2.9 (2 - 3.5) | 2.1 (2 - 2.7) | 1.0 (1 - 1.2) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 3.9 (2 - 5.4) | 3.0 (2 - 4.5) | 1.7 (0 - 3.1) |
| Rural | 2.7 (2 - 3.4) | 1.9 (1 - 2.5) | 1.2 (1 - 1.7) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El comportamiento según grado académico muestra un incremento gradual de la prevalencia de vida y del consumo en el último año desde grado séptimo hasta grado noveno, punto en el que se alcanza el valor más alto, seguido de un descenso en grado décimo y grado undécimo. Este patrón es consistente con el observado en tranquilizantes sin fórmula médica (gráfica 21).


*Gráfico 21. Prevalencia de consumo de estimulantes sin fórmula médica por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

En la distribución municipal se observa una variabilidad marcada de la prevalencia. Los valores más altos se concentran en Isnos, Neiva y Baraya, mientras que los registros más bajos se presentan en municipios como Hobo y Tarqui. La prevalencia departamental se sitúa en una posición intermedia dentro del conjunto de municipios, reflejando un comportamiento promedio frente al contexto territorial.

*Gráfico 22. Prevalencia de consumo de estimulantes sin fórmula médica en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.4.5.2.2. Edad de inicio

La edad de inicio se sitúa tempranamente, con un promedio general de 13.7 años, una edad mínima de 12 años y una mediana de 14 años, lo que indica que al menos la mitad de las personas inició el consumo alrededor de los 14 años. Este patrón es consistente entre mujeres y hombres, y se mantiene también en quienes no se reconocen dentro de las categorías binarias tradicionales, lo que sugiere un comportamiento relativamente homogéneo en la edad de inicio según sexo.

*Gráfico 23. Edad de inicio del consumo de estimulantes sin fórmula médica según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 13.5 | 12 | 14 |
| Masculino | 14.0 | 12 | 14 |
| Otro | 14.0 | 14 | 14 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.6. Cocaína

Es una sustancia estimulante de alta potencia, administrada principalmente por vía intranasal, que produce efectos intensos y de corta duración. Su uso suele darse en contextos recreativos específicos, relacionado con la búsqueda de aumento de energía, alerta y resistencia.

#### 3.4.6.1. Indicadores de consumo

Por sexo, la prevalencia de vida fue mayor en los hombres (5.4 %) que en las mujeres (3.5 %) de igual manera para las prevalencias de año y mes donde las mayores prevalencias son en sexo masculino. En relación con el tipo de institución educativa, la prevalencia de vida fue superior en estudiantes de instituciones privadas (6.3 %) frente a las públicas (4.8 %), esta diferencia se amplía en la prevalencia del último año, con 6.0 % en el sector privado y 3.3 % en el público, y se amplía aún más en la prevalencia del último mes, con 5.5 % y 1.5 %, respectivamente, lo que evidencia una mayor persistencia del consumo reciente en el ámbito privado. Desde el punto de vista territorial, la prevalencia de vida fue mayor en el área urbana que en la rural, con una diferencia de 1.7 puntos porcentuales situación que se mantiene en las demás prevalencias analizadas.


*Tabla 14. Prevalencia de consumo de cocaína según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida (IC95%) | Último año (IC95%) | Último mes (IC95%) |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 3.5 (3 - 4.4) | 2.4 (2 - 3.1) | 1.1 (1 - 1.6) |
| Masculino | 5.4 (4 - 6.9) | 3.8 (3 - 4.7) | 1.7 (1 - 2.3) |
| Otros | 53.3 (5 - 101.8) | 52.0 (2 - 101.6) | 52.0 (2 - 101.6) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 6.3 (-3 - 15.5) | 6.0 (-3 - 15.3) | 5.5 (-3 - 14.1) |
| Público | 4.8 (4 - 6.0) | 3.3 (3 - 4.1) | 1.5 (1 - 2.0) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 5.4 (3 - 7.4) | 4.0 (2 - 5.7) | 2.3 (1 - 3.7) |
| Rural | 3.7 (3 - 4.6) | 2.6 (2 - 3.3) | 1.2 (1 - 1.6) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El análisis por curso académico evidencia que las tres prevalencias presentan un incremento progresivo desde grado séptimo hasta grado noveno, nivel en el cual se registran los valores más altos. A partir de este punto, se observa una disminución en grado décimo y grado undécimo, particularmente marcada en la prevalencia del último mes. No obstante, en grado undécimo se identifica un leve repunte en las prevalencias del último año y del último mes (gráfica 24).


*Gráfico 24. Prevalencia de consumo de cocaína por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El análisis territorial muestra diferencias claras en la distribución municipal de la prevalencia reciente. Los niveles más elevados se observan en Colombia, Baraya y Neiva, mientras que los valores más bajos se concentran en municipios como Timaná, Elías y Saladoblanco. La prevalencia departamental se ubica en una posición alta con respecto a las municipales, indicando que el grupo de municipios con mayores prevalencias afectan significativamente la prevalencia global.

*Gráfico 25. Prevalencia de consumo de cocaína en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.4.6.2. Edad de inicio

El inicio del consumo se sitúa, en promedio, alrededor de los 14.2 años, lo que indica un comienzo relativamente tardío en comparación con otras sustancias. En mujeres y hombres se observan valores cercanos; este comportamiento también se mantiene en personas registradas en una categoría distinta al femenino y masculino.

*Gráfico 26. Edad de inicio del consumo de cocaína según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 14.0 | 12 | 14 |
| Masculino | 14.5 | 12 | 14 |
| Otro | 13.4 | 12 | 14 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.7. Bazuco

Es un derivado de la cocaína de alta toxicidad, administrado principalmente por vía inhalatoria mediante combustión, que genera un deterioro acelerado de la salud física y mental. Su uso suele darse en contextos de alta vulnerabilidad social y con fines compulsivos.

#### 3.4.7.1. Indicadores de consumo

Por sexo, la prevalencia de vida fue ligeramente mayor en los hombres que en las mujeres, con una diferencia de 0.3 puntos porcentuales; esta diferencia se mantiene en la prevalencia del último año y del último mes, con menos de 1 punto porcentual de diferencia. Al analizar el comportamiento según el tipo de institución educativa, la prevalencia de vida fue mayor en estudiantes de instituciones privadas (6.6 %) frente a las públicas (2.5 %); esta diferencia persiste en la prevalencia del último año y último mes, también con diferencias de más de 4 puntos porcentuales. Desde la perspectiva territorial, la prevalencia de vida fue superior en el área urbana en comparación con la rural, con una diferencia de 1.3 puntos porcentuales; esta tendencia se conserva en la prevalencia del último año y del último mes, lo que sugiere una mayor persistencia del consumo en contextos urbanos.


*Tabla 15. Prevalencia de consumo de bazuco según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida (IC95%) | Último año (IC95%) | Último mes (IC95%) |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 2.2 (2 - 3.0) | 1.6 (1 - 2.2) | 0.7 (0 - 1.1) |
| Masculino | 2.5 (2 - 3.2) | 1.8 (1 - 2.4) | 1.0 (1 - 1.3) |
| Otros | 53.2 (5 - 101.7) | 51.3 (1 - 101.5) | 51.3 (1 - 101.5) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 6.6 (-2 - 14.9) | 5.7 (-3 - 14.2) | 5.3 (-3 - 13.9) |
| Público | 2.5 (2 - 3.0) | 1.8 (1 - 2.3) | 0.9 (1 - 1.2) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 3.3 (2 - 4.7) | 2.5 (1 - 4.0) | 1.6 (0 - 3.0) |
| Rural | 2.0 (1 - 2.5) | 1.4 (1 - 1.9) | 0.9 (1 - 1.2) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El análisis por grado académico evidencia un incremento de las prevalencias desde grado séptimo hasta noveno, donde se observa el valor más alto, seguido de una disminución en grado décimo y undécimo. Este patrón se mantiene de manera consistente en las distintas medidas de prevalencia (gráfica 27).


*Gráfico 27. Prevalencia de consumo de bazuco por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

La distribución municipal evidencia una dispersión amplia de las prevalencias recientes donde las más altas se agrupan en pocos municipios específicos (Baraya, Colombia, Neiva y Pital) y un número considerable concentrado en rangos bajos con respecto a la prevalencia departamental, la cual se sitúa en una posición relativamente elevada dentro del conjunto municipal, lo que refleja que el valor agregado del departamento está condicionado por pocos municipios con prevalencias superiores, mientras que la mayoría presenta registros inferiores.

*Gráfico 28. Prevalencia de consumo de bazuco en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.4.7.2. Edad de inicio

En cuanto a la edad de inicio, esta se sitúa en torno a los 13.9 años, lo que evidencia un comienzo del consumo en edades relativamente tempranas. Los resultados muestran valores cercanos entre mujeres y hombres, y un comportamiento similar en personas registradas en una categoría distinta al sexo femenino o masculino.

*Gráfico 29. Edad de inicio del consumo de bazuco según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 13.6 | 12 | 14 |
| Masculino | 14.1 | 12 | 14 |
| Otro | 13.8 | 13 | 13.5 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.8. Éxtasis

Es una sustancia sintética administrada por vía oral, generalmente en forma de tabletas o cápsulas, que combina efectos estimulantes y alteraciones en el estado de ánimo. Suele utilizarse en contextos recreativos como fiestas y eventos sociales, con el propósito de intensificar sensaciones de euforia y cercanía emocional.

#### 3.4.8.1. Indicadores de consumo

Por sexo, la prevalencia de vida fue ligeramente mayor en los hombres (2.2 %) que en las mujeres (1.9 %), esta diferencia se mantiene en la prevalencia del último año, con 1.6 % en hombres y 1.3 % en mujeres, y en la prevalencia del último mes, con 0.7 % y 0.6 %, respectivamente. En relación con el tipo de institución educativa, la prevalencia de vida fue mayor en estudiantes de instituciones privadas (5.8 %) frente a las públicas (2.2 %), este contraste persiste en la prevalencia del último año y en la prevalencia del último mes, con diferencias cercanas a 4 puntos porcentuales. En cuanto al área de la institución, las prevalencias fueron superiores en el área urbana en comparación con la rural, con diferencias de menos de 1 punto porcentual, lo que sugiere una mayor persistencia del consumo en contextos urbanos (tabla 16).


*Tabla 16. Prevalencia de consumo de éxtasis según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida (IC95%) | Último año (IC95%) | Último mes (IC95%) |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 1.9 (1 - 2.5) | 1.3 (1 - 1.9) | 0.6 (0 - 0.9) |
| Masculino | 2.2 (2 - 2.9) | 1.6 (1 - 2.3) | 0.7 (0 - 0.9) |
| Otros | 51.6 (2 - 101.6) | 51.3 (1 - 101.5) | 51.3 (1 - 101.5) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 5.8 (-3 - 14.2) | 5.4 (-3 - 13.9) | 5.1 (-4 - 13.7) |
| Público | 2.2 (2 - 2.8) | 1.6 (1 - 2.2) | 0.7 (1 - 0.9) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 2.8 (1 - 4.3) | 2.2 (1 - 3.7) | 1.3 (0 - 2.7) |
| Rural | 1.9 (1 - 2.4) | 1.3 (1 - 1.8) | 0.8 (1 - 1.1) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El patrón por curso académico evidencia un máximo en grado noveno, donde se concentran las mayores prevalencias. Previamente, desde grado séptimo hasta grado octavo se observa un incremento sostenido, mientras que a partir de grado décimo se presenta una disminución que continúa en grado undécimo, manteniendo una trayectoria descendente en las distintas prevalencias consideradas (gráfica 30).


*Gráfico 30. Prevalencia de consumo de éxtasis por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

La distribución por municipio muestra diferencias territoriales claras en las prevalencias donde Neiva presenta claramente el valor más alto y una mayor concentración de municipios en rangos bajos. Se identifican municipios sin registro de consumo, entre ellos Altamira, Elías y Guadalupe la estimación departamental se sitúa en una posición elevada dentro del conjunto observado, lo que indica que el valor global está determinado principalmente por aquellos con prevalencias más elevadas.

*Gráfico 31. Prevalencia de consumo de éxtasis en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.4.8.2. Edad de inicio

Al analizar la edad de inicio, se observa que el consumo comienza, en promedio, hacia los 14.3 años. Los valores entre mujeres y hombres son cercanos, lo que refleja un comportamiento similar por sexo, mientras que en las personas registradas en una categoría distinta al femenino o masculino el inicio tiende a presentarse a una edad ligeramente mayor.

*Gráfico 32. Edad de inicio del consumo de éxtasis según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 13.9 | 12 | 14 |
| Masculino | 14.5 | 12 | 14 |
| Otro | 16.0 | 14 | 17 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.9. Sustancias inhalables

Incluyen diversos productos de uso doméstico o industrial (Pegantes, solventes, pinturas, etc) administrados por vía inhalatoria, que producen efectos inmediatos. Su uso suele darse en entornos domésticos o informales, asociados a experimentación temprana.

#### 3.4.9.1. Indicadores de consumo

Por sexo, la prevalencia de vida fue similar entre hombres (3.8 %) y mujeres (3.6 %); en la prevalencia del último año ambos sexos registraron el mismo valor (2.3 %), mientras que en la prevalencia del último mes se observa una diferencia más marcada, con 1.2 % en hombres y 0.6 % en mujeres, lo que sugiere una mayor persistencia del consumo reciente en el sexo masculino. Según el tipo de institución educativa, la prevalencia de vida fue considerablemente mayor en estudiantes de instituciones privadas frente a las públicas, con una diferencia de 5.9 puntos porcentuales; esta diferencia se mantiene en la prevalencia del último año y en la prevalencia del último mes, con diferencias entre 3 y 4 puntos porcentuales. En relación con la zona de residencia, la prevalencia de vida fue superior en el área urbana (4.6 %) en comparación con la rural (3.3 %); esta tendencia se conserva en

la prevalencia del último año y mes, lo que indica una mayor persistencia del consumo en contextos urbanos (tabla 17).


*Tabla 17. Prevalencia de consumo de sustancias inhalables según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida (IC95%) | Último año (IC95%) | Último mes (IC95%) |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 3.6 (3 - 4.6) | 2.3 (2 - 3.2) | 0.6 (0 - 0.9) |
| Masculino | 3.8 (3 - 4.7) | 2.3 (1 - 3.2) | 1.2 (1 - 1.7) |
| Otros | 52.0 (2 - 101.6) | 51.7 (2 - 101.6) | 51.3 (1 - 101.5) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 9.5 (2 - 17.4) | 6.9 (-2 - 15.3) | 5.7 (-3 - 14.1) |
| Público | 3.6 (3 - 4.5) | 2.3 (1 - 3.2) | 0.9 (1 - 1.2) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 4.6 (3 - 6.2) | 3.1 (1 - 4.8) | 1.6 (0 - 3.0) |
| Rural | 3.3 (3 - 4.0) | 2.1 (2 - 2.7) | 1.1 (1 - 1.5) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El comportamiento por curso académico muestra un ascenso progresivo desde grado séptimo hasta grado noveno, donde se alcanza el punto más alto del consumo. A partir de grado décimo se observa una reducción marcada, que se mantiene en grado undécimo, configurando un patrón de concentración del consumo en los cursos intermedios.


*Gráfico 33. Prevalencia de consumo de sustancias inhalables por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

La distribución por municipio presenta una marcada heterogeneidad, en la que un número reducido de municipios concentra las prevalencias más altas encabezando la lista Neiva, Baraya y Tello, mientras la mayoría se ubica en niveles bajos. En el extremo inferior se observan municipios con valores mínimos, entre ellos Guadalupe y Hobo que junto con otros 6 municipios no alcanzan el 1%. La prevalencia departamental se ubica en un tramo alto de la distribución, lo que refleja que la estimación global está fuertemente influida por unos pocos municipios con valores elevados.

*Gráfico 34. Prevalencia de consumo de sustancias inhalables en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.9.2. Edad de inicio

La edad de inicio del consumo se sitúa, en promedio, en los 13.8 años, con una concentración clara alrededor de los 14 años según la mediana. La edad mínima registrada es de 12 años, lo que confirma un inicio temprano. Entre mujeres y hombres no se observan diferencias relevantes en los valores centrales, mientras que en quienes se registran fuera de la clasificación femenino/masculino el inicio se presenta a edades ligeramente mayores, aunque dentro de un rango similar.

*Gráfico 35. Edad de inicio del consumo de sustancias inhalables según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 13.8 | 12 | 14 |
| Masculino | 13.8 | 12 | 14 |
| Otro | 15.5 | 14 | 15.5 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.10. Dick (Ladys, fragancia)

Dick (Ladys, fragancia) hace referencia al uso indebido de productos comerciales con solventes o fragancias, administrados por vía inhalatoria mediante la aspiración de vapores. Su consumo suele darse en entornos informales, aprovechando la fácil disponibilidad del producto.

#### 3.4.10.1. Indicadores de consumo

Por sexo, la prevalencia de vida fue mayor en los hombres (2.4 %) que en las mujeres (1.9 %), en la prevalencia del último año los valores fueron iguales en ambos sexos (1.4 %), mientras que en la prevalencia del último mes se mantiene una diferencia leve, con 0.8 % en hombres y 0.7 % en mujeres. En cuanto al tipo de institución educativa, la prevalencia de vida fue mayor en estudiantes de instituciones privadas (7.8 %) frente a las públicas (2.0 %); este contraste se mantiene en la prevalencia del último año, y último mes, lo que sugiere una mayor continuidad del consumo en el ámbito privado, aunque los niveles generales siguen siendo bajos. Desde la perspectiva de área de la institución, la prevalencia de vida fue superior en el área urbana en comparación con la rural, la diferencia es de 1.6 puntos porcentuales; esta tendencia se conserva en la prevalencia del último año, y del último mes, con diferencias de 1.3 y 1.1 puntos porcentuales respectivamente.

*Tabla 18. Prevalencia de consumo de dick (ladys y fragancia) según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*


| | Vida (IC95%) | Último año (IC95%) | Último mes (IC95%) |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 1.9 (1 - 2.7) | 1.4 (1 - 2.1) | 0.7 (0 - 1.0) |
| Masculino | 2.4 (2 - 3.1) | 1.4 (1 - 2.1) | 0.8 (0 - 1.3) |
| Otros | 52.8 (4 - 101.8) | 51.3 (1 - 101.5) | 51.3 (1 - 101.5) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Institución** | | | |
| Privado | 7.8 (0 - 15.4) | 5.6 (-3 - 14.1) | 5.6 (-3 - 14.1) |
| Público | 2.0 (2 - 2.5) | 1.5 (1 - 2.0) | 0.7 (0 - 1.0) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 3.1 (2 - 4.5) | 2.3 (1 - 3.7) | 1.6 (0 - 3.0) |
| Rural | 1.5 (1 - 2.1) | 1.0 (1 - 1.4) | 0.5 (0 - 0.8) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El análisis por grado académico evidencia un pico claro en grado noveno, donde se concentran los mayores niveles de consumo, especialmente en la prevalencia de vida y del último año. En los grados séptimo y octavo los valores son menores, con un aumento progresivo hacia noveno, mientras que en grado décimo se presenta una caída marcada, que se mantiene en grado undécimo.


*Gráfico 36. Prevalencia de consumo de dick (ladys, fragancia) por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

A nivel municipal se observa una dispersión marcada de las prevalencias, destacándose un pequeño conjunto de municipios con valores superiores al resto, entre ellos Neiva y Gigante, mientras que en el extremo inferior se ubican territorios con prevalencias bajas como Oporapa y Hobo, además, Teruel y Timaná presentaron prevalencias nulas. En este escenario, el valor departamental se ubica entre los niveles más altos de la distribución, evidenciando que la estimación global está condicionada por el peso de pocos municipios con niveles elevados.

*Gráfico 37. Prevalencia de consumo de dick (ladys y fragancia) en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.10.2. Edad de inicio

La edad de inicio del consumo se concentra en edades tempranas, con un promedio general de 14.1 años. Los valores observados son similares entre mujeres y hombres, lo que sugiere un comportamiento homogéneo por sexo, mientras que en

quienes se registran en una categoría distinta al binario femenino/masculino el inicio se sitúa en edades comparables. La edad mínima reportada es de 12 años y la mediana se ubica en 14 años, indicando que al menos la mitad de los casos inicia el consumo alrededor de esa edad (gráfica 38).

*Gráfico 38. Edad de inicio del consumo de dick (ladys y fragancia) según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 13.6 | 12 | 14 |
| Masculino | 14.5 | 12 | 14 |
| Otro | 14.5 | 12 | 14.5 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.11. Popper

Corresponde a un grupo de sustancias administradas exclusivamente por vía inhalatoria, cuyos efectos son inmediatos y de corta duración. Suele utilizarse en contextos recreativos y sociales específicos, buscando efectos rápidos y transitorios.

#### 3.4.11.1. Indicadores de consumo

Por sexo, la prevalencia de vida es ligeramente mayor en las mujeres (4.7 %) que en los hombres (4.2 %); en la prevalencia del último año los valores fueron iguales en ambos sexos (2.9 %), mientras que en la prevalencia del último mes se observa una diferencia leve. Según el tipo de institución educativa, la prevalencia de vida fue mayor en estudiantes de instituciones privadas (6.7 %) frente a las públicas (4.7 %). En relación con la zona de residencia, la prevalencia de vida fue superior en el área urbana (5.4 %) en comparación con la rural (3.6 %), con una diferencia de 1.8 puntos porcentuales; esta tendencia se conserva en las demás prevalencias (tabla 19).


*Tabla 19. Prevalencia de consumo de popper según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida (IC95%) | Último año (IC95%) | Último mes (IC95%) |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 4.7 (4 - 5.8) | 2.9 (2 - 3.8) | 1.6 (1 - 2.1) |
| Masculino | 4.2 (3 - 5.0) | 2.9 (2 - 3.7) | 1.2 (1 - 1.7) |
| Otros | 51.7 (2 - 101.6) | 51.7 (2 - 101.6) | 51.3 (1 - 101.5) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 6.7 (-1 - 14.8) | 5.9 (-3 - 14.3) | 5.8 (-3 - 14.2) |
| Público | 4.7 (4 - 5.6) | 3.1 (2 - 3.9) | 1.5 (1 - 1.8) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 5.4 (4 - 6.9) | 3.8 (2 - 5.3) | 2.1 (1 - 3.5) |
| Rural | 3.6 (3 - 4.6) | 2.3 (2 - 2.9) | 1.6 (1 - 2.1) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

En la distribución por grado académico se observa que los mayores niveles de consumo se concentran en los grados octavo y noveno para la prevalencia del último año. En las demás prevalencias, el grado noveno presenta los valores más altos en comparación con los otros grados, siendo más marcada esta diferencia en la prevalencia del último mes (gráfica 39).


*Gráfico 39. Prevalencia de consumo de popper por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El análisis territorial muestra una distribución heterogénea entre municipios con valores altos presentes en un número reducido de municipios, mientras que la mayoría presenta prevalencias inferiores a la departamental siendo Guadalupe y Pitalito los municipios con valores más bajos. De acuerdo con la distribución observada, el valor departamental se localiza en el rango superior, lo que refleja que la estimación global está determinada principalmente por la contribución de unos pocos municipios con niveles elevados, en contraste con un amplio conjunto de territorios con valores más bajos.

*Gráfico 40. Prevalencia de consumo de popper en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.4.11.2. Edad de inicio

En cuanto a la edad de inicio, el consumo se da en promedio general de 14.0 años. Los resultados muestran valores muy similares entre mujeres y hombres, lo que indica una escasa variación por sexo, mientras que en las personas registradas en una categoría distinta al binario femenino/masculino el inicio se presenta en edades ligeramente mayores. La edad mínima identificada es de 12 años y la mediana se ubica en 14 años, lo que evidencia una concentración del inicio en un rango etario relativamente estrecho.

*Gráfico 41. Edad de inicio del consumo de popper según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 13.8 | 12 | 14 |
| Masculino | 14.1 | 12 | 14 |
| Otro | 16.5 | 16 | 16.5 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.12. LSD (o tripi)

Es una sustancia de alta potencia, administrada por vía oral mediante papel impregnado o gotas, que produce cambios profundos en la percepción, el pensamiento y las emociones.

#### 3.4.12.1. Indicadores de consumo

Por sexo, la prevalencia de vida fue ligeramente mayor en los hombres (1.9 %) que en las mujeres (1.5 %), igual situación que con las demás prevalencias, donde la diferencia entre hombre y mujeres es de menos de un punto porcentual pero siempre manteniendo el predominio del sexo masculino. En cuanto al tipo de institución educativa, la prevalencia de vida fue considerablemente mayor en estudiantes de instituciones privadas (6.5 %) frente a las públicas (1.7 %), con una amplia diferencia la cual persiste en las demás prevalencias. En cuanto a el área de la institución, la prevalencia de vida fue superior en el área urbana (2.5 %) en comparación con la rural (1.5 %), estas diferencias se amplían con una diferencia en las prevalencias del último año y del último mes, lo que sugiere una mayor persistencia del consumo en contextos urbanos (tabla 20).


*Tabla 20. Prevalencia de consumo de LSD o tripi según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida (IC95%) | Último año (IC95%) | Último mes (IC95%) |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 1.5 (1 - 2.0) | 1.0 (1 - 1.4) | 0.4 (0 - 0.7) |
| Masculino | 1.9 (1 - 2.4) | 1.4 (1 - 1.8) | 0.6 (0 - 1.0) |
| Otros | 52.0 (2 - 101.7) | 52.0 (2 - 101.7) | 51.3 (1 - 101.5) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 6.5 (-2 - 14.8) | 5.7 (-3 - 14.3) | 5.7 (-3 - 14.2) |
| Público | 1.7 (1 - 2.1) | 1.2 (1 - 1.6) | 0.5 (0 - 0.7) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 2.5 (1 - 3.9) | 2.0 (1 - 3.4) | 1.3 (0 - 2.7) |
| Rural | 1.5 (1 - 2.1) | 1.1 (1 - 1.5) | 0.5 (0 - 0.7) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El análisis por grado académico evidencia un incremento sostenido del consumo desde grado séptimo hasta noveno, curso en el que se registran los valores más elevados. Posteriormente, en grado décimo se presenta un descenso notable que continúa en grado undécimo.


*Gráfico 42. Prevalencia de consumo de LSD por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El análisis territorial evidencia una marcada heterogeneidad entre municipios, con prevalencias más elevadas concentradas en los municipios de Neiva y Santa María, mientras que un amplio número de municipios presenta valores bajos. En el extremo inferior se identifican territorios con prevalencias cercanas a cero siendo los más bajos Hobo y Villavieja y Guadalupe fue el único municipio con valores nulos. En este contexto, la estimación departamental se ubica en una posición intermedia-alta dentro de la distribución municipal, lo que refleja que el valor agregado del departamento se ve influido por un grupo reducido de municipios con niveles superiores al promedio.

*Gráfico 43. Prevalencia de consumo de LSD o tripi en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.4.12.2. Edad de inicio

Al analizar la edad de inicio, se observa que el consumo comienza, en promedio, hacia los 14.8 años. Los resultados indican un inicio algo más tardío en comparación con otras sustancias, con valores cercanos entre mujeres y hombres. La edad mínima reportada es de 12 años y la mediana se ubica entre los 15 y 16 años, lo que sugiere una concentración del inicio en etapas posteriores de la adolescencia.

*Gráfico 44. Edad de inicio del consumo de LSD o tripi según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 14.2 | 12 | 15 |
| Masculino | 15.0 | 12 | 15 |
| Otro | 15.5 | 13 | 16 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.13. Hongos

Son sustancias de origen natural administradas por vía oral, ingeridas directamente o en infusiones, que generan alteraciones perceptivas y cognitivas. Su uso suele darse en entornos informales y experimentales, generalmente de manera esporádica.

#### 3.4.13.1. Indicadores de consumo

De acuerdo al sexo, la prevalencia de vida fue mayor en los hombres que en las mujeres en las tres prevalencias medidas, aunque esta diferencia es más visible en la prevalencia de vida con (1.9 %) en mujeres y (2.4%) en hombres; las demás prevalencias tienen diferencias de 0.1 punto porcentual. En cuanto al tipo de institución educativa, la prevalencia de vida fue considerablemente mayor en estudiantes de instituciones privadas (7.5 %) frente a las públicas (2.1 %), esta diferencia persiste en las prevalencias del último año y último mes con diferencias cercanas a 5 puntos porcentuales.

Desde la perspectiva territorial, la prevalencia de vida fue superior en el área urbana (3.0 %) en comparación con la rural (1.8 %), con una diferencia de 1.2 puntos porcentuales; esta tendencia se conserva en la prevalencia del último año, con 2.2

% en zona urbana y 1.1 % en zona rural, y en la prevalencia del último mes, con 1.4 % y 0.6 %, respectivamente, lo que sugiere una mayor persistencia del consumo en contextos urbanos (tabla 21).


*Tabla 21. Prevalencia de consumo de hongos según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida (IC95%) | Último año (IC95%) | Último mes (IC95%) |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 1.9 (1 - 2.5) | 1.3 (1 - 1.7) | 0.6 (0 - 0.9) |
| Masculino | 2.4 (2 - 3.0) | 1.4 (1 - 1.8) | 0.7 (0 - 1.0) |
| Otros | 51.3 (1 - 101.5) | 51.3 (1 - 101.5) | 51.3 (1 - 101.5) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 7.5 (-1 - 16.2) | 6.7 (-2 - 15.7) | 6.1 (-3 - 15.4) |
| Público | 2.1 (2 - 2.6) | 1.3 (1 - 1.6) | 0.5 (0 - 0.8) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 3.0 (1 - 4.6) | 2.2 (1 - 3.7) | 1.4 (0 - 2.9) |
| Rural | 1.8 (1 - 2.3) | 1.1 (1 - 1.5) | 0.6 (0 - 0.9) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El patrón por grado académico muestra que las prevalencias son mayores claramente en grado noveno, donde se concentran los niveles más altos. En los cursos previos, desde grado séptimo hasta grado octavo, se observa un aumento gradual, mientras que a partir de grado décimo el consumo disminuye de forma evidente hasta el grado undécimo.


*Gráfico 45. Prevalencia de consumo de hongos por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

En la distribución municipal se observa una marcada heterogeneidad en los niveles de prevalencia. Los valores más altos se concentran en Neiva y Baraya, seguidos por Santa María y Palermo, mientras que los registros más bajos se presentan en los municipios de Saladoblanco y Campoalegre, por su parte Elías y Teruel presentan prevalencia nula para esta sustancia. La estimación departamental se sitúa por encima de la mayoría de los municipios, lo que sugiere que su nivel está determinado principalmente por aquellos con valores más elevados dentro del conjunto municipal.

*Gráfico 46. Prevalencia de consumo de hongos en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.13.2. Edad de inicio

La edad de inicio del consumo se concentra en edades relativamente tempranas, con un promedio general de 14.3 años. Los valores observados en mujeres y hombres son cercanos entre sí, lo que indica un comportamiento similar por sexo, mientras que en las personas registradas en una categoría distinta al binario

femenino/masculino el inicio tiende a presentarse a edades algo mayores. La edad mínima reportada es de 12 años y la mediana se sitúa entre los 14 y 17 años, lo que sugiere que una proporción importante inicia el consumo durante la adolescencia.

*Gráfico 47. Edad de inicio del consumo de hongos según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 14.1 | 12 | 14 |
| Masculino | 14.4 | 12 | 14 |
| Otro | 15.7 | 13 | 17 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.14. Yagé

Es una sustancia de uso ancestral, administrada por vía oral en forma de bebida preparada, que produce alteraciones profundas en la percepción y el estado emocional. Generalmente se utiliza en contextos comunitarios o familiares específicos, asociados a prácticas culturales.

#### 3.4.14.1. Indicadores de consumo

De acuerdo al sexo, la prevalencia de vida fue igual en hombres y mujeres (1.6 % en ambos casos), sin diferencias relevantes; esta similitud se mantiene en la prevalencia del último año y en la prevalencia del último mes. Según el tipo de institución educativa, la prevalencia de vida fue mayor en estudiantes de instituciones privadas frente a las públicas, con una diferencia de 3.5 puntos porcentuales; esta diferencia se mantiene tanto en la prevalencia del último año como en la del último mes. En relación con la zona de residencia, la prevalencia de vida fue superior en el área urbana (2.3 %) en comparación con la rural (1.7 %), en similar situación se encuentran las prevalencias de año y de mes con diferencias inferiores a 1 punto porcentual (tabla 22).


*Tabla 22. Prevalencia de consumo de yagé según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida (IC95%) | Último año (IC95%) | Último mes (IC95%) |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 1.6 (1 - 2.0) | 1.2 (1 - 1.7) | 0.7 (0 - 1.0) |
| Masculino | 1.6 (1 - 2.1) | 1.1 (1 - 1.4) | 0.4 (0 - 0.7) |
| Otros | 52.0 (2 - 101.7) | 52.0 (2 - 101.7) | 51.3 (1 - 101.5) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 5.2 (-3 - 13.8) | 5.2 (-4 - 13.8) | 5.2 (-4 - 13.8) |
| Público | 1.7 (1 - 2.1) | 1.2 (1 - 1.5) | 0.6 (0 - 0.8) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 2.3 (1 - 3.7) | 1.9 (1 - 3.3) | 1.3 (0 - 2.7) |
| Rural | 1.7 (1 - 2.4) | 1.2 (1 - 1.6) | 0.7 (0 - 1.0) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El análisis por grado académico evidencia que el consumo alcanza su mayor expresión en grado noveno, donde se observan los niveles más elevados en las distintas prevalencias. En los grados séptimo y octavo se identifican valores progresivamente menores, mientras que a partir de grado décimo se presenta una disminución clara, con una leve recuperación en grado undécimo en algunas de las prevalencias.


*Gráfico 48. Prevalencia de consumo de yagé por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

La distribución municipal de la prevalencia de último año muestra una variabilidad territorial marcada, con concentraciones más elevadas en los municipios de Isnos, Agrado y Baraya. En contraste, los valores más bajos se observan en Íquira, Saladoblanco, Hobo y Nátaga, mientras que Teruel, Timaná y Guadalupe no registran prevalencia.

*Gráfico 49. Prevalencia de consumo de yagé en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.4.14.2. Edad de inicio

En cuanto a la edad de inicio, el consumo se presenta en promedio a los 14.1 años, evidenciando un inicio relativamente temprano. Los valores observados en mujeres y hombres son similares, sin diferencias marcadas entre ambos, mientras que en las personas registradas en una categoría distinta al binario femenino/masculino el inicio se concentra en edades más tardías. La edad mínima reportada es de 12 años y la mediana se sitúa entre los 14 y 17 años, lo que indica que el inicio se concentra en un rango etario acotado durante la adolescencia.

*Gráfico 50. Edad de inicio del consumo de yagé según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 13.9 | 12 | 14 |
| Masculino | 14.1 | 12 | 14 |
| Otro | 15.7 | 13 | 17 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.15. 2CB (tucibi o nexus)

Es una sustancia sintética de aparición relativamente reciente, administrada principalmente por vía oral y en algunos casos por vía intranasal, que genera alteraciones perceptivas y emocionales.

#### 3.4.15.1. Indicadores de consumo

Por sexo, las tres prevalencias medidas son ligeramente mayores en los hombres, que, en mujeres con diferencias menores a 1 punto porcentual, lo que evidencia un consumo activo bajo en ambos sexos. Según el tipo de institución educativa, las prevalencias de consumo fueron consistentemente mayores en estudiantes de instituciones privadas que en públicas. En relación con la zona de residencia, la prevalencia de vida fue superior en el área urbana (3.5 %) en comparación con la rural (1.6 %), esta tendencia se mantiene en la prevalencia del último año y en la prevalencia del último mes, con diferencias cercanas a 1.5 puntos porcentuales (tabla 23).


*Tabla 23. Prevalencia de consumo de 2CB (Tucibi o nexus) según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida (IC95%) | Último año (IC95%) | Último mes (IC95%) |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Masculino | 2.6 (2 - 3.2) | 1.9 (1 - 2.4) | 1.1 (1 - 1.4) |
| Femenino | 2.3 (1 - 3.2) | 1.4 (1 - 2.0) | 1.0 (1 - 1.3) |
| Otros | 52.0 (2 - 101.7) | 52.0 (2 - 101.7) | 52.0 (2 - 101.7) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 7.3 (-1 - 15.1) | 6.4 (-2 - 14.6) | 6.4 (-2 - 14.5) |
| Público | 2.4 (2 - 3.2) | 1.7 (1 - 2.2) | 1.0 (1 - 1.2) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 3.5 (2 - 5.0) | 2.6 (1 - 4.1) | 1.8 (0 - 3.2) |
| Rural | 1.6 (1 - 2.2) | 1.1 (1 - 1.5) | 0.9 (1 - 1.2) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

El análisis por grado académico evidencia un incremento progresivo del consumo desde grado séptimo hasta grado noveno, donde se alcanzan los niveles más altos en las distintas prevalencias evaluadas. A partir de grado décimo se observa una disminución marcada, que se mantiene en grado undécimo, con excepción de la prevalencia de último mes, en la cual se registra un leve aumento (gráfica 51).


*Gráfico 51. Prevalencia de consumo de 2CB (tucibi o nexus) por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

La distribución municipal de la prevalencia de último año muestra una heterogeneidad territorial evidente. Se observan niveles más elevados en Neiva y Baraya, mientras que en el extremo inferior se ubican municipios de Nátaga y Hobo, ningún municipio presenta valores en cero. En este contexto, la prevalencia departamental se sitúa en una posición intermedia dentro del ordenamiento municipal, lo que sugiere un comportamiento global que no alcanza los niveles más altos, pero que se mantiene por encima de los municipios con menor registro de consumo.

*Gráfico 52. Prevalencia de consumo de 2CB (tucibi o nexus) en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.4.15.2. Edad de inicio

Al analizar la edad de inicio, se observa que el consumo comienza, en promedio, hacia los 14,3 años. Las edades de inicio en mujeres y hombres son cercanas entre sí, lo que refleja un patrón similar por sexo, mientras que en las personas registradas en una categoría distinta al binario femenino/masculino el inicio se presenta a edades más tardías. La edad mínima identificada es de 12 años y la mediana se concentra entre los 14 y 17 años, lo que indica que el inicio ocurre mayoritariamente dentro de un rango etario específico de la adolescencia.

*Gráfico 53. Edad de inicio del consumo de 2CB (tucibi o nexus) según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 13.7 | 12 | 14 |
| Masculino | 14.5 | 12 | 14 |
| Otro | 17.0 | 17 | 17 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.4.16. Cacao sabanero

Es una sustancia asociada a prácticas de consumo tradicional o experimental, administrada por vía oral, que puede producir alteraciones leves del estado de conciencia, el ánimo o la percepción, según la cantidad ingerida y el contexto de uso.

#### 3.4.16.1. Indicadores de consumo

El consumo de cacao sabanero en la población escolar se caracteriza por prevalencias bajas en las tres medidas analizadas. En cuanto al sexo, la prevalencia de vida fue ligeramente mayor en los hombres (2.0 %) que en las mujeres (1.7 %), esta diferencia inferior a un punto porcentual se mantiene en la prevalencia del último año y último mes. Al considerar el tipo de institución educativa, la prevalencia de vida fue notablemente mayor en estudiantes de instituciones privadas (7.3 %) frente a las públicas (1.8 %). Desde la perspectiva territorial, las tres prevalencias medidas, son superiores en el área urbana en comparación con la rural con mayores diferencias en la prevalencia de mes cercana a 1.5 puntos porcentuales (tabla 24).


*Tabla 24. Prevalencia de consumo de cacao sabanero según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida (IC95%) | Último año (IC95%) | Último mes (IC95%) |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 1.7 (1 - 2.2) | 1.0 (1 - 1.4) | 0.6 (0 - 0.9) |
| Masculino | 2.0 (2 - 2.5) | 1.4 (1 - 1.8) | 0.8 (0 - 1.1) |
| Otros | 52.0 (2 - 101.7) | 52.0 (2 - 101.7) | 51.3 (1 - 101.5) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 7.3 (-1 - 15.4) | 6.5 (-2 - 14.8) | 6.1 (-2 - 14.6) |
| Público | 1.8 (1 - 2.1) | 1.1 (1 - 1.4) | 0.6 (0 - 0.8) |
| **Zona** | | | |
| Urbana | 2.6 (1 - 4.0) | 2.0 (1 - 3.4) | 1.5 (0 - 2.9) |
| Rural | 1.9 (1 - 2.4) | 1.1 (1 - 1.5) | 0.7 (0 - 0.9) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

La distribución por grado académico evidencia un aumento del consumo desde grado séptimo y octavo hasta alcanzar un pico en grado noveno en las tres prevalencias analizadas. Posteriormente, en grado décimo se observa una disminución marcada, seguida de un leve repunte en grado undécimo, especialmente en la prevalencia de vida y de último año.


*Gráfico 54. Prevalencia de consumo de cacao sabanero por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

La distribución territorial de la prevalencia de último año muestra una heterogeneidad importante entre municipios. Los niveles más elevados se observan en Baraya y Neiva, mientras que Guadalupe registra el valor más bajo distinto de cero. Asimismo, se identifican municipios sin registro de consumo, como Altamira, Elías y Villavieja. A nivel departamental, el valor estimado se ubica en una posición intermedia frente al conjunto municipal, evidenciando diferencias relevantes entre territorios.

*Gráfico 55. Prevalencia de consumo de cacao sabanero en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.4.16.2. Edad de inicio

El consumo de cacao sabanero inicia en promedio a los 13.1 años, siendo similar en ambos sexos. La edad mínima identificada es de 12 años y la mediana de 13 años.

*Gráfico 56. Edad de inicio del consumo de cacao sabanero según sexo en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Sexo | Promedio | Mínima | Mediana |
|---|---|---|---|
| Femenino | 13 | 12 | 13 |
| Masculino | 13.2 | 12 | 13 |
| Otro | 15 | 13 | 15 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

## 3.5. Consumo de cualquier sustancia ilícita

Se refiere al uso de una o más de las siguientes sustancias: 2CB, bazuco, cacao sabanero, cocaína, DICCK (ladys, fragancia), éxtasis MDMA, hongos, LSD, marihuana, popper, sustancias inhalables, yagé.

### 3.5.1. Indicadores de consumo

El consumo de cualquier sustancia ilícita muestra prevalencias diferentes por sexo y tipo de institución educativa, tendiendo prevalencias superiores el sexo masculino y los estudiantes de instituciones educativas privadas (tabla 25).


*Tabla 25. Tabla 20. Prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita según sexo, tipo de institución educativa y zona de residencia. Huila, 2025*

| | Vida (IC95%) | Último año (IC95%) | Último mes (IC95%) |
|---|---|---|---|
| **Sexo** | | | |
| Femenino | 16.7 (14.8 – 18.7) | 11.0 (9.4 -12.5) | 6.2 (5.0 -7.3) |
| Masculino | 18.0 (15.7 – 20.3) | 12.0 (9.9 – 14.2) | 7.4 (6.1 – 8.6) |
| Otros | 56.3 (10.4 -102.1) | 53.8 (5.6 – 101.9) | 52.7 (3.7 – 101.7) |
| **Institución** | | | |
| Privado | 21.1 (15.0 – 27.2) | 14.5 (6.4 – 22.6) | 12.0 (3.3 – 20.7) |
| Público | 17.4 (15.3 – 19.4) | 11.6 (9.9 – 13.3) | 6.7 (5.8- 7.5) |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

Aunque el comportamiento del consumo de cualquier sustancia ilícita por grado académico sigue un patrón similar al observado en las sustancias analizadas individualmente con un incremento desde grado séptimo hasta grado noveno y una posterior disminución en los grados superiores, se destaca que las diferencias entre grados para las sustancias ilegales son menos pronunciadas, lo que sugiere una variación más homogénea de las prevalencias a lo largo del ciclo escolar (gráfica 57).


*Gráfico 57. Prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita por grado académico. Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

En el análisis territorial de la prevalencia de último año del conjunto de sustancias ilegales se evidencian contrastes marcados entre los municipios. Isnos presenta el valor más alto, mientras que Guadalupe y Hobo registran los valores más bajos. En este escenario, la estimación departamental se ubica en un rango intermedio, reflejando un comportamiento promedio frente a la variabilidad observada a nivel municipal (gráfica 58).

*Gráfico 58. Prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año, Huila y municipios, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.5.2. Edad de inicio

El promedio de edad para el inicio de cualquier sustancia ilícita fue de 14.1 años, siendo similar para ambos sexos.

## 3.6. Percepción del riesgo y situaciones de riesgo

En este capítulo se presenta la percepción del riesgo que consideran los adolescentes escolares que tiene una persona que consume alguna sustancia como bebida energizante, cigarrillos electrónicos, marihuana, bebida alcohólica y tabaco o cigarrillo. Además, se analizan algunas situaciones de riesgo que han experimentado los adolescentes en los últimos 12 meses; estas situaciones se analizan también de manera específica en consumidores de sustancias ilegales.

### 3.6.1. Percepción del riesgo

De acuerdo con la percepción del riesgo moderado o alto frente a distintas conductas, se puede evidenciar que los adolescentes escolares perciben que el consumo de bebidas energizantes presenta un riesgo moderado/alto, seguido por el uso frecuente de cigarrillos electrónicos o vapeadores, y fumar marihuana frecuentemente. En cuanto, a las conductas con riesgo moderado o alto que percibe en menor medida los encuestados se encuentra el fumar cigarrillo de vez en cuando con el 42.9% (tabla 26).

*Tabla 26. Percepción de riesgo moderado o alto frente a conductas de consumo de sustancias en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Conducta | Riesgo moderado / alto |
|---|---|
| Consumir bebidas energizantes | 62.4 |
| Usa cigarrillos electrónicos o ´vapeadores´ frecuénteme | 577 |
| Fumar marihuana frecuentemente | 57.3 |
| Fuma marihuana de vez en cuando | 51.9 |
| Se emborracha con bebidas alcohólicas | 51.9 |
| Usa cigarrillos electrónicos o ´vapeadores´ de vez en cuando | 48.9 |
| Fumar cigarrillo de vez en cuando | 42.9 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.6.2. Situaciones de riesgo

De acuerdo con la tabla 27 sobre las situaciones de riesgo general y por consumo de sustancias ilegales, se evidencia una discrepancia entre consumidores y no consumidores de sustanciales ilegales; por ejemplo, el 27.1% de los consumidores han pensado seriamente en suicidarse, frente el 14.3% de los no consumidores. Así mismo, los consumidores pueden presentar mayor probabilidad de verse involucrado en situaciones de violencia ya sea con su pareja (28.9% frente el 17.1%), causarse heridas intencionales (24.0% frente el 12.4%) o tener problemas con la policía (17.6%) en comparación con los no consumidores (5.0%).

*Tabla 27. Situaciones de riesgo según consumo de sustancias ilegales en adolescentes escolares. Huila, 2025*

| Situación | Proporción global | Proporción entre consumidores de sustancias ilegales | Proporción entre NO consumidores de sustancias ilegales |
|---|---|---|---|
| Tener mal rendimiento académico en alguna evaluación o proyecto importante | 62.9 | 66.4 | 62.7 |
| Pelear con sus amistades | 36.8 | 44.8 | 36.2 |
| Tener problemas familiares | 32.4 | 41.5 | 31.7 |
| Emborracharte | 26.9 | 45.5 | 25.6 |
| Participar en alguna discusión fuerte o pelea | 20.9 | 33.7 | 20.0 |
| Pelear con su pareja si no tiene marca nunca | 17.9 | 28.9 | 17.1 |
| Ir en un carro o en una moto conducido por alguien que iba con tragos | 15.5 | 30.3 | 14.4 |
| Pensar seriamente en suicidarse | 15.1 | 27.1 | 14.3 |
| Causarse heridas o lesiones intencionales a ti mismo | 13.2 | 24.0 | 12.4 |
| Perder la memoria | 9.8 | 20.7 | 9.0 |
| Conducir un carro o motocicleta después de beber | 9.2 | 24.9 | 8.0 |
| Tener algún problema con la policía | 5.9 | 17.6 | 5.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

## 3.7. Disponibilidad y oferta de sustancias

### 3.7.1. Facilidad para conseguir la sustancia

Se indagó sobre la facilidad con que los escolares obtienen algunas sustancias psicoactivas. El análisis se realiza tomando como referencia la variable “me sería fácil”. En el caso del alcohol, se indaga por: cerveza, vino, aguardiente, ron, whisky, chicha, guarapo, chirrinchi, y vodka o ginebra.

#### 3.7.1.1. Alcohol

La cerveza y el vino son las sustancias alcohólicas con mayor percepción de facilidad para comprarla, seguida del aguardiente y el ron. Tres de cada cuatro estudiantes adolescentes del departamento, consideran fácil comprar cerveza y/o vino, comportamiento que es similar por sexo, tipo de institución educativa y zona de ubicación. Se observó que por grado se tiene un comportamiento diferente, ya que la percepción de facilidad de conseguir alcohol va aumentando con el grado académico (tabla 28).

*Tabla 28. Proporción de adolescentes escolares que consideran fácil obtener bebidas alcohólicas, según tipo de bebida. Huila, 2025*

| Categoría | Cerveza | Vino | Aguardiente | Ron | Whisky | Chicha, guarapo, chirrinchi | Vodka o ginebra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global | 77.7 | 76.2 | 68.5 | 61.1 | 52.2 | 59.6 | 37.4 |
| **Sexo** | | | | | | | |
| Masculino | 76.5 | 74.1 | 67.3 | 60.9 | 52.8 | 59.6 | 39.3 |
| Femenino | 78.9 | 78.1 | 69.5 | 61.3 | 51.6 | 59.7 | 35.5 |
| Otro | 75.0 | 71.2 | 73.1 | 69.2 | 61.5 | 57.7 | 50.0 |
| **Tipo de institución** | | | | | | | |
| Público | 77.9 | 76.5 | 68.9 | 61.8 | 52.6 | 59.8 | 37.4 |
| Privado | 73.5 | 69.6 | 60.9 | 46.8 | 44.5 | 56.6 | 36.8 |
| **Zona** | | | | | | | |
| Urbano | 77.2 | 74.8 | 67.8 | 60.2 | 52.3 | 58.7 | 39.4 |
| Rural | 78.6 | 78.3 | 69.5 | 62.5 | 52.1 | 61.1 | 34.3 |

| Categoría | Cerveza | Vino | Aguardiente | Ron | Whisky | Chicha, guarapo, chirrinchi | Vodka o ginebra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grado** | | | | | | | |
| 7 | 67.6 | 65.6 | 53.7 | 46.4 | 39.6 | 48.9 | 24.6 |
| 8 | 74.0 | 72.1 | 62.3 | 55.4 | 47.3 | 55.5 | 32.4 |
| 9 | 78.7 | 77.1 | 69.0 | 61.1 | 51.0 | 59.9 | 36.0 |
| 10 | 84.8 | 83.7 | 78.6 | 71.6 | 62.0 | 67.4 | 45.6 |
| 11 | 84.3 | 83.4 | 80.1 | 72.3 | 62.1 | 67.4 | 49.5 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

#### 3.7.1.2. Otras sustancias de uso ilegal

Respecto a las otras sustancias, se observó que el tabaco o cigarrillo es la de mayor facilidad en conseguir por parte de los adolescentes escolarizados. Los hombres perciben una ligera mayor facilidad en adquirir todas las sustancias, comparado con el sexo femenino. Al igual que el alcohol, se observó que la facilidad aumenta con el grado académico (tabla 29).

*Tabla 29. Proporción de adolescentes escolares que consideran fácil obtener sustancias de uso ilegal, según sustancia. Huila, 2025*

| | Tabaco | Marihuana | Boxer, dick, ladys, fragancia (inhalables) | Popper | Cocaína | Basuco | Éxtasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global | 42.5 | 18.6 | 15.2 | 11.9 | 7.6 | 6.6 | 4.5 |
| **Sexo** | | | | | | | |
| Masculino | 44.2 | 19.7 | 16.5 | 12.6 | 9.2 | 7.5 | 5.6 |
| Femenino | 40.9 | 17.4 | 14.0 | 11.2 | 6.0 | 5.6 | 3.4 |
| Otro | 51.9 | 30.8 | 23.1 | 19.2 | 19.2 | 17.3 | 9.6 |
| **Tipo de institución** | | | | | | | |
| Público | 42.4 | 18.7 | 15.1 | 12.0 | 7.6 | 6.5 | 4.5 |


| | Tabaco | Marihuana | Boxer, dick, ladys, fragancia (inhalables) | Popper | Cocaína | Basuco | Éxtasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privado | 43.6 | 15.1 | 18.5 | 9.1 | 7.5 | 7.3 | 4.1 |
| **Zona** | | | | | | | |
| Urbano | 41.2 | 19.5 | 15.3 | 11.5 | 8.1 | 6.8 | 4.7 |
| Rural | 44.4 | 17.2 | 15.1 | 12.4 | 6.8 | 6.1 | 4.1 |
| **Grado** | | | | | | | |
| 7 | 32.7 | 11.4 | 11.3 | 11.9 | 5.5 | 5.4 | 3.7 |
| 8 | 39.2 | 15.5 | 14.7 | 13.1 | 7.0 | 6.9 | 4.8 |
| 9 | 42.4 | 19.3 | 15.7 | 11.8 | 7.7 | 7.1 | 4.5 |
| 10 | 49.6 | 24.0 | 17.6 | 11.5 | 8.9 | 7.1 | 4.3 |
| 11 | 49.2 | 23.1 | 17.0 | 11.0 | 8.9 | 6.2 | 5.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

### 3.8. Escala de padres involucrados

De acuerdo con el grado de involucramiento de los padres se puede evidenciar en el grafico 59, que la mayoría de los padres presenta niveles de involucramiento altos, concentrándose principalmente en el puntaje 4 y 5 con el 25.8% y 26.0% respectivamente. En cuanto, a los resultados de puntaje de 3 o menores, el 32.2% se encuentran en estos niveles de involucramiento que se consideran bajos.


*Gráfico 59. Grado de involucramiento de los padres con los adolescentes escolares del Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

En complemento con la gráfica anterior, se puede evidenciar que el grupo de adolescentes femeninas son quienes presenta mayor porcentaje con niveles de involucramiento altos (puntaje 4 o más), situación contraria con los adolescentes masculinos, quienes presentan mayores porcentajes en los puntajes bajos de involucramiento de los padres (puntaje 3 o menos).


*Gráfico 60. Grado de involucramiento de los padres por sexo de los adolescentes escolares del Huila, 2025.*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

De acuerdo con la gráfica 61, revela que, a mayor involucramiento por parte de los padres con los adolescentes, existe una tendencia a la disminución del consumo de sustancias especialmente, las relacionadas al consumo de tabaco o cigarrillo, marihuana o uso de sustancias ilegales. De esta forma se puede detallar que los padres que obtuvieron los mayores puntales (6-7) de involucramiento, los adolescentes presentaron las menores prevalencia de consumo sin importar el sexo del menor.

*Gráfico 61. Grado de involucramiento de los padres relacionado con el consumo de sustancias de los adolescentes escolares del Huila, 2025*




Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del estudio de prevalencia de consumo de drogas de uso lícito e Ilícito en la población escolar del Huila, 2025

## 4. CONCLUSIONES

A partir del análisis de los resultados obtenidos en el estudio de prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en escolares del departamento del Huila, se establecen las siguientes conclusiones:

- Se ratifica que el alcohol es la sustancia de mayor impacto en la salud pública escolar del departamento, con una prevalencia de vida del 57.4% y un consumo reciente (último mes) del 28.0%.

- Los cigarrillos electrónicos o vapeadores (34.5%) han desplazado al tabaco convencional (16.7%) como la segunda sustancia de mayor uso, duplicando su prevalencia. En cuanto a sustancias ilícitas, la marihuana (7.9%) se mantiene como la droga ilegal de principal referencia, seguida por el uso indebido de tranquilizantes y el consumo de cocaína y popper.

- El estudio evidencia un comportamiento diferencial según el tipo de sustancia. El sexo femenino, presenta prevalencias de uso más altas en el consumo de alcohol (60.8% frente a 53.3% en hombres) y en el uso de tranquilizantes sin fórmula médica. Esto sugiere que el consumo femenino puede estar más asociado a la regulación emocional y la socialización normativa.

- El sexo masculino, mantiene el predominio en el consumo de tabaco convencional, marihuana y cocaína. Sin embargo, en el caso de los vapeadores, la diferencia es mínima, lo que indica que esta tecnología de consumo ha logrado permear ambos sexos casi por igual.

- Existe una relación directa y proporcional entre el grado escolar y el aumento del consumo. A medida que los estudiantes avanzan de séptimo a undécimo grado, las prevalencias de vida aumentan, lo cual es esperable debido a la mayor exposición a oportunidades de consumo con la edad.

- El grado décimo se identifica como un punto crítico de transición, donde se disparan las cifras de experimentación con cigarrillos electrónicos y se consolida el consumo de alcohol.

- El inicio temprano del consumo (promedio 13.2 años para alcohol y 13.8 para vapeadores) alerta sobre la vulnerabilidad de los estudiantes en los primeros años de la secundaria (grados 7° y 8°).

- Contrario a la percepción tradicional de que el consumo se concentra exclusivamente en las ciudades, el estudio revela que la zona rural del Huila presenta indicadores de riesgo elevados, específicamente en el consumo de alcohol (59.2%), superando levemente a la zona urbana. Esto podría explicarse por la normalización cultural del consumo de bebidas fermentadas o alcohólicas en contextos rurales y familiares. Por otro lado, el consumo de sustancias más especializadas como el éxtasis o el popper tiende a concentrarse mayoritariamente en las cabeceras municipales (zona urbana).