FORMATO HISTORIA CLINICA PARA RECEPCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN EL CAV
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
FAUNA SILVESTRE

-

FECHA DE ENTRADA: 04-07-2025 **Hx. No.** 6057 **No ACTA DE INCAUTACIÓN** N/A

No. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN 112130555913 **FECHA** 04-07-2025

Número de Radicación CAR 20251073682 **Dirección Regional de Origen** DRAM

GÉNERO: *Boa* **ESPECIE:** *Boa constrictor*

NOMBRE COMÚN: Guio - Traga venado **PESO:** 314 gr

No. ID: _____ACTA DE LIBERACIÓN No.:

EDAD: S/D **ADULTO X SUBADULTO □ JUVENIL □ INFANTIL □ NEONATO □**

SEXO : S/D **ESTADO REPRODUCTIVO:**

ENTIDAD Y/O PERSONA DE CONTACTO:

PROCEDENCIA: CAUTIVERIO □ VIDA SILVESTRE X

TIEMPO DE CAUTIVERIO: N/A

PERSONAS EN CONTACTO: Usuario quien lo entrega

DIETA: N/A

FRECUENCIA: N/A **CONSUMO:** N/A

TIPO DE ENCIERRO: Costal

CONTACTO CON OTRAS ESPECIES: SI _____ NO___X____
CUALES:--------N/A----------

HISTORIA:

Se realiza el rescate de una boa constrictor en el municipio de Girardot, posterior se hace la entrega a la CAR.

ENFERMEDADES PREVIAS: SI _____ NO __X_____

CUALES:

TRATAMIENTOS PREVIOS Y RESPUESTA

VERMIFUGACIONES:

FECHA	PRODUCTO	DOSIS
----------	----------	----------
----------	----------	----------

VACUNACIONES:

SI: ____ NO: __X__ VACUNACIONES:

==========

COMPORTAMIENTO INICIAL, SIN CONTACTO:

ACTIVO □ DEPRIMIDO X OTRO □

OTRO:

==========

==========

NIVEL DE AGRESIVIDAD O MANSEDUMBRE DEL INDIVIDUO:

==========

==========

PRESENCIA DE MUTILACIONES: SI _____ NO __X___

LUGAR Y GRAVEDAD:

==========

==========

==========

EXAMEN FISICO:	**FECHA:**					
		N	**A**	**NE**		**N**	**A**	**NE**
Tº: ---------- ºC **FC: 250 ppm** **FR: 30 rpm** **MM: Rosadas** **TLLC: - 2seg**	**1. GENERAL**	**X**	□	□	**6. DIGESTIVO**	**X**	□	□
	2. TEGUMENTO	□	**X**	□	**7. GENITOURIN**	**X**	□	□
	3. MUSCU/ESQUE	□	**X**	□	**8. ORG. SENTIDOS**	□	**X**	□
	4. CIRCULATORIO	**X**	□	□	**9. NERVIOSO**	**X**	□	□
	5. RESPIRATORIO	**X**	□	□	**10. LINFOIDE**	**X**	□	□
ACTITUD: Alerta---------- TEMPERAMENTO: Dócil---------- CC: 3/5. PESO:314 gr								

RESTRICCIÓN: SI _X____ NO_____ TIPO: FISICA X QUIMICA □

PRODUCTO, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

==========

==========

==========

PROCEDIMIENTO: Examen de ingreso

TIEMPO:

==========

PROBLEMAS DURANTE LA RESTRICCION: SI_____ NO___X__ ;

CUALES:----------

==========

HALLAZGOS ANORMALES:

2 y 3. Se evidencia una lesión ulcerativa bilateral, simétrica, localizada en la región rostral del maxilar que compromete las escamas rostrales, supralabiales, infranasales y nasales, sin extensión hacia la mandíbula inferior ni afectación de los tejidos blandos ventrales. En la fase inicial, ambas lesiones estaban cubiertas por placas costrosas espesas, de coloración pardo-oscura, con aspecto queratótico, seco y adherido al plano profundo, compatible con necrosis tisular crónica. Tras el retiro del tejido desvitalizado, las áreas afectadas expusieron un tejido de granulación activo, rojizo, húmedo y sangrante, con bordes irregulares.

Se constata una pérdida significativa de integridad escamosa, muscular y ósea en la porción anterior del cráneo, junto con erosión extensa e inicio de regeneración epidérmica periférica.
Adicionalmente, en la región craneal se observan lesiones cicatrizadas de antigüedad variable, con malformación escamosa crónica compatible con procesos reparativos previos. Se detectan también ectoparásitos tipo garrapata adheridos en la región dorsal del cráneo. En el tercio medio y caudal del cuerpo se identifican múltiples lesiones cicatrizadas, compatibles con traumatismos antiguos, sin signos inflamatorios activos.
8. Se evidencia perdida del ojo derecho

LISTA PROBLEMAS	Dx. DIFERENCIALES
Lesión craneal	Trauma craneal
Perdidad ocular	Corte por guadaña
----------	Politraumatismo
----------	----------
----------	----------

PLANES DIAGNÓSTICOS	PLANES TERAPEÚTICOS
-Radiografía (No realizada)	Enrofloxacina 5mg/kg dosis de 0,04ml IM
----------	Meloxicam 0,3 mg/kg dosis de 0,05ml SC
----------	Limpieza con clorhexidina
----------	Pezoan
----------	----------
----------	----------
----------	----------

DESTINO DEL INDIVIDUO:

MANEJO VETERINARIO □ HOSPITALIZACIÓN □ REHABILITACIÓN □
CUARENTENA □ PERIODO DE CUARENTENA: _____ DÍAS

OTRO DESTINO:

REUBICAR EN OTRO SITIO □ LUGAR:

REHABILITACIÓN NO POSIBLE □ EUTANASIA □

DATOS BIOLÓGICOS DE LA ESPECIE

ESPECIE: SOLITARIA X GRUPO □

ESPECIE DE HABITOS Y/O COSTUMBRES: DIURNO X NOCTURNO □

NIVEL DE PELIGROSIDAD: BAJO X MEDIO □ ALTO □

RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO:

El ejemplar debe mantenerse en un recinto térmicamente controlado, con temperatura de 28–30 °C en el punto cálido y 24–26 °C en el punto frío, y humedad relativa del 70–80 %. Se recomienda usar sustrato blando y limpio, como toallas de papel o fibra de coco fina, para evitar contaminación o fricción en la zona lesionada. El recinto debe tener refugios amplios, oscuros y accesibles sin superficies ásperas. Evitar elementos que impliquen contacto directo con la región cefálica, y reducir la manipulación al mínimo mientras se realiza seguimiento clínico.

DIETA NATURAL:

Es una serpiente constrictora no venenosa, varía según su etapa de vida y el entorno, pero es estrictamente carnívora- oportunista, se alimenta de una amplia gama de presas dependiendo de su tamaño corporal y la disponibilidad local. Caza y consume presas de hasta 20-40% de su peso corporal.

DISTRIBUCIÓN NATURAL:

En Colombia, se encuentra en diversas regiones como la Amazonía, Orinoquía, región Caribe, valles interandinos y zonas del Pacífico, principalmente en ecosistemas de bosque húmedo tropical, bosque seco, sabanas arboladas y márgenes de cuerpos de agua. Es una especie de hábitos terrestres y semiarborícolas, adaptable a distintos tipos de hábitat con buena cobertura vegetal.

MANEJO BIOLÓGICO (Problemas biológicos):

El ejemplar presenta una lesión ulcerativa bilateral y simétrica en la región rostral del maxilar, comprometiendo escamas rostrales, supralabiales, infranasales y nasales, sin extensión a la mandíbula inferior ni tejidos blandos ventrales. Esta condición puede generar alteración en la conducta exploratoria, alimentaria y de interacción con el medio, debido al dolor o sensibilidad en la zona afectada. La restricción del uso funcional de la región cefálica puede traducirse en disminución del comportamiento de caza activa, apatía o falta de respuesta a estímulos. Desde el punto de vista etológico, se trata de un ejemplar que requiere monitoreo constante para evaluar su comportamiento frente al alimento, manipulación y entorno, priorizando su bienestar y minimizando el estrés.

-

Jessica Pérez -MVZ
33240

Biólogo
T.P. 1123512874

Alejandra Pardo-Bióloga
1123512874

FIRMA MEDICO VETERINARIO – BIOLOGO – CAV

Elaboro:
Luis Harold Gómez Núñez – Profesional Especializado Fauna Silvestre DESCA
Leonardo Emilio Martínez-Luque – Contratista Fauna Silvestre DESCA