FORMATO HISTORIA CLINICA PARA RECEPCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN EL CAV
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
FAUNA SILVESTRE

FECHA DE ENTRADA: 19-07-2025 Hx. No. 6126 No ACTA DE INCAUTACIÓN: N/A

No. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN 112130556117 FECHA: 19-07-2025

Número de Radicación CAR 02951001283 Dirección Regional de Origen SABANA CENTRO

GÉNERO: *Didelphis* ESPECIE: *Didelphis pernigra*

NOMBRE COMÚN: Zarigüeya orejiblanca PESO: 1. Kg

No. ID: ACTA DE LIBERACIÓN No.:

EDAD: S/D ADULTO X SUBADULTO □ JUVENIL □ INFANTIL □ NEONATO □

SEXO : Macho ESTADO REPRODUCTIVO: ENTERO

ENTIDAD Y/O PERSONA DE CONTACTO:

PROCEDENCIA: CAUTIVERIO □ VIDA SILVESTRE X

TIEMPO DE CAUTIVERIO: 8 Horas

PERSONAS EN CONTACTO: Una (1)

DIETA: S/D (En la sede fruta, pollo y concentrado)

FRECUENCIA: S7D CONSUMO: A voluntad

TIPO DE ENCIERRO: Caja de carton

CONTACTO CON OTRAS ESPECIES: SI _____ NO___X___
CUALES:----------N/A----------

HISTORIA:

Se reporta una zarigueya en un trampa de roedores en el sector industrial SIKA de Tocancipa.

ENFERMEDADES PREVIAS: SI ___X___ NO _____

CUALES: Lesión en miembro anterior

TRATAMIENTOS PREVIOS Y RESPUESTA

VERMIFUGACIONES:

FECHA	PRODUCTO	DOSIS

VACUNACIONES:

SI: ____ NO: __X__ VACUNACIONES:

COMPORTAMIENTO INICIAL, SIN CONTACTO:

ACTIVO X DEPRIMIDO □ OTRO □

OTRO:

NIVEL DE AGRESIVIDAD O MANSEDUMBRE DEL INDIVIDUO:

PRESENCIA DE MUTILACIONES: SI _____ NO __X___

LUGAR Y GRAVEDAD:

EXAMEN FISICO:	FECHA:	
	N A NE	N A NE
Tº: ---------- ºC FC: ---140--- ppm FR: ----40---- rpm MM: _Rosadas__ TLLC: 2”	1. GENERAL X □ □ 2. TEGUMENTO □ X □ 3. MUSCU/ESQUE □ X □ 4. CIRCULATORIO X □ □ 5. RESPIRATORIO X □ □	6. DIGESTIVO X □ □ 7. GENITOURIN X □ □ 8. ORG. SENTIDOS X □ □ 9. NERVIOSO X □ □ 10. LINFOIDE X □ □
ACTITUD: Alerta---------- TEMPERAMENTO: Agresivo---------- CC: 2/5. PESO: 1 kg		

RESTRICCIÓN: SI __X___ NO_____ TIPO: FISICA X QUIMICA □

PRODUCTO, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

PROCEDIMIENTO:

TIEMPO: _5 min_

PROBLEMAS DURANTE LA RESTRICCION: SI_____ NO___X__ ;

CUALES:

HALLAZGOS ANORMALES:

2. Laceración en el último tercio de la cola, excoriación severa a nivel dorsal de la mano del miembro anterior izquierdo con olor ofensivo y aumento de tamaño severo.

3. Claudicación 3/5 del miembro anterior izquierdo.

LISTA PROBLEMAS	Dx. DIFERENCIALES
excoriación severa a nivel dorsal de la mano del miembro anterior izquierdo con olor ofensivo y aumento de tamaño severo.	**Trauma cutáneo**
Claudicación 3/5 del miembro anterior izquierdo	**Agresión antrópica**
Laceración en el último tercio de la cola	**Dermatitis bacteriana**

PLANES DIAGNÓSTICOS	PLANES TERAPEÚTICOS
NA	**Penicilina G Benzatinica-Procainica 60.000 UI/kg IM dosis única.**
	Amoxicilina 60 mg/kg BID PO por 10 días.
	Metronidazol 50 mg/kg BID PO por 10 días.
	Meloxicam 0,2 mg/kg SID PO por 4 días.
	Limpieza y desinfección con clorhexidina.

DESTINO DEL INDIVIDUO:

MANEJO VETERINARIO □ HOSPITALIZACIÓN X REHABILITACIÓN □
CUARENTENA □ PERIODO DE CUARENTENA: ___30_____ DÍAS

OTRO DESTINO:

REUBICAR EN OTRO SITIO □ LUGAR:

REHABILITACIÓN NO POSIBLE □ EUTANASIA □

DATOS BIOLÓGICOS DE LA ESPECIE

ESPECIE: SOLITARIA X GRUPO □

ESPECIE DE HABITOS Y/O COSTUMBRES: DIURNO □ NOCTURNO X

NIVEL DE PELIGROSIDAD: BAJO X MEDIO □ ALTO □

RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO:
El alojamiento para un ejemplar de *Didelphis marsupialis* debe ofrecer condiciones que garanticen su bienestar físico, etológico y clínico, especialmente durante procesos de recuperación. Se recomienda un recinto cerrado, seguro y de fácil limpieza, con dimensiones que permitan la movilidad y el ejercicio

controlado, adaptado a su comportamiento nocturno y arborícola. Debe contar con estructuras verticales y ramas para trepar, así como refugios oscuros y elevados que simulen cavidades naturales o nidos, favoreciendo su conducta de descanso diurno. El sustrato debe ser absorbente, no tóxico y fácil de reemplazar, y el ambiente debe mantenerse con buena ventilación, pero protegido de corrientes de aire, lluvias y temperaturas extremas.

DIETA NATURAL:

La *Didelphis marsupialis* tiene una dieta natural omnívora y oportunista, lo que le permite adaptarse a una amplia variedad de entornos. Su alimentación incluye frutas, semillas, insectos, pequeños vertebrados (como ranas, lagartijas y aves), huevos, carroña y material vegetal, complementada ocasionalmente con hongos.

DISTRIBUCIÓN NATURAL:

La *Didelphis marsupialis*, conocida como zarigüeya común o faras, tiene una amplia distribución natural en el continente americano, abarcando desde el sur de México hasta el norte de Argentina y Uruguay, incluyendo gran parte de Centroamérica, la región andina, la cuenca del Amazonas y zonas del Caribe. En Colombia, está presente en todos los pisos térmicos hasta los 2.600 m s.n.m., siendo especialmente común en bosques húmedos tropicales, ecosistemas de borde, áreas rurales, zonas periurbanas y entornos urbanos con disponibilidad de alimento y refugio.

MANEJO BIOLÓGICO (Problemas biológicos):

Ejemplar presenta alteraciones comportamental asociadas al trauma físico y al dolor, lo cual afecta sus funciones esenciales como la locomoción, el equilibrio, y la manipulación de objetos, estas condiciones pueden generar una reducción en la actividad exploratoria, disminución del acicalamiento, cambios en la alimentación, y un aumento del comportamiento defensivo u evasión, especialmente frente al contacto humano. Dado su carácter nocturno y solitario, se recomienda un manejo en un entorno de bajo estímulo, con refugios oscuros y mínima interacción, permitiendo su recuperación física sin comprometer su bienestar etológico.

-

DAVID RODRÍGUEZ FAJARDO
MÉDICO VETERINARIO
T.P. 29711

Alejandra Pardo-Bióloga
1123512874

FIRMA MEDICO VETERINARIO – BIOLOGO – CAV

Elaboro:
Luis Harold Gómez Núñez – Profesional Especializado Fauna Silvestre DESCA
Leonardo Emilio Martínez-Luque – Contratista Fauna Silvestre DESCA