CONCEPTO TÉCNICO DE EGRESO DE ANIMALES DEL CAV

Fecha	15/09/2025	**N. de individuos**	59
Historia Clínica	5967;6011;6014;5622:5958;5715;5825;5850;5895;5881;5662;5603;5510;5641;5725;5726;5906;5914;5578;5632;5602;5517;5579;5616;5648;5638;6003; 5722; 5597; 5893; 5894; 5915; 5959; 6019; 6028; 6029; 6022; 5484; 5598;5975; 6015; 5636; 5543; 5624; 5587; 5516; 6021; 5973; 6012; 5637;5577; 5551; 6013; 6016; 6017; 6018; 5568; 5716; 6036.		
AUCTIFF	Radicado: 13251000761; 12251001116; 12251001116; 20241125947; 132511000762; Concepto URRAS; Radicado 12251000692; Radicado 20251045540; Radicado 20251051397; Radicado 10251000752; Radicado 06251000119; Radicado 03241001382; 06241001007; Radicado 03251000048; Radicado 09251000455; Radicado 09251000455; 0043106; Radicado 12251000959; 0042907; Radicado 10251000028; Radicado 14241001544; Radicado 03241001133; 0042907; Radicado 09241002204; 09251000142;	**SUN**	1112130555531; 112130555646; 112130555646; 112130487233; 112130555531; 192230236320; 112130555010; 112130555097; 112130555270; 112130555212; 1121305544018; 112130487028; 112130486014; 112130487567; 112130554581; 112130554581; 112130555337; 112130555347; 112130486808; 112130487390; 112130487020; 112130486037; 112130486808; 112130487155;: 112130487593; 112130555127; 112130555636; 112130554578; 112130486974; 112130555270; 112130555270; 112130555347; 112130555531; 112130555646; 112130555724; 112130555724; 112130555646; 192230236238; 112130486974; 112130555549; 112130555646; 112130555127; 112130486352; 112130487262; 112130486899; 112130486037; 112130555646; 112130555534; 112130555646; 112130555127; 112130486808; 112130486406; 112130555646; 112130555646; 112130555646; 112130555646; 112130486727; 192230236320; 1212130555811

	Radicado 12251000792; Radicado 11251000417; Radicado 05251000329; Radicado 20241120351; Radicado 20251049797; Radicado 13251000604; Radicado 12251000959; Radicado 132511000762; Radicado 12251001116; 0043111; 0043110; Radicado 12251001117; 5484: NA; Radicado 202441122384; Radicado 07251000424 ; Radicado 12251001116; Radicado 12251000792; 03241001207; Radicado 03241001458; Radicado 09241002101; Radicado 03241001133; Radicado 12251001117; Radicado 10251000757; Radicado 12251001116; Radicado 12251000792; 0042910; Radicado 10241001608;		

	Radicado 12251001116; Radicado 12251001116; Radicado 12251001116; Radicado 12251001116; Radicado 13241001165; Concepto URRAS; Radicado 10251000875		
Origen	11 DRTE; 18 DRSU; 3 URRAS; 5 DRGU; 6 DRAM; 9 DRSC; 3 DRSO; DRUB, DRSOA; DRCH; DRMC		
Nombre común	Morrocoy	**Nombre científico**	*Chelonoidis carbonarius*
Desarrollo biológico	Adulto	**Sexo:** 16 Hembra 22 Macho 21 Indeterminado	**No. consecutivo:** 1RE250342; 1RE250386; 1RE250389; 1RE241014; 1RE250333; 1RE250090; 1RE250200; 1RE250225; 1RE250270; 1RE250256;1RE250037; 1RE24995;1RE24902; 1RE250016; 1RE250100; 1RE250101; 1RE250281; 1RE250289; 1RE24970; 1RE250007; 1RE24994; 1RE24909; 1RE24971; 1RE241008;1RE250023; 1RE250013; 1RE250378; 1RE250097; 1RE24989; 1RE250268; 1RE250269; 1RE250290;1RE250334; 1RE250394; 1RE250403; 1RE250404;1RE250397; 1RE24876; 1RE24990;1RE250350; 1RE250390; 1RE250011; 1RE24935; 1RE241016; 1RE24979; 1RE24908; 1RE250396; 1RE250348; 1RE250387; 1RE250012; 1RE24969; 1RE24943; 1RE250388; 1RE250391;

			1RE250392;1RE250393, 1RE24960; 1RE250091; 1RE250411
DESTINO SUGERIDO	Liberación		

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE	
Taxonomía	● Clase: Reptilia ● Orden: Testudines ● Familia: Testudinidae ● Género: *Chelonoidis* ● Especie: *Chelonoidis carbonarius*
Ecología de la especie.	El morrocoy de patas rojas (*Chelonoidis carbonarius*) es una tortuga terrestre ampliamente distribuida en Sudamérica que habita sabanas, bosques secos y zonas de transición, mostrando cierta tolerancia a ambientes intervenidos; es un omnívoro oportunista, con preferencia por frutos caídos, aunque también consume flores, hongos, carroña y pequeños invertebrados, lo que lo convierte en un importante dispersor de semillas. Su actividad es principalmente diurna, con mayor movilidad en las mañanas y tardes para evitar el calor, y durante la estación seca reduce sus desplazamientos refugiándose bajo troncos y hojarasca. La reproducción ocurre en la temporada de lluvias, con puestas de 3 a 7 huevos y largos periodos de incubación, superiores a 120 días. Ecológicamente, cumple un rol clave en la dinámica de los bosques tropicales al favorecer la regeneración vegetal y contribuir al ciclo de nutrientes (Moskovits, 1988; Moskovits & Bjorndal, 1990; Strong & Fragoso, 2006; Vanzolini, 2002).
Distribución natural.	La distribución natural del morrocoy de patas rojas (*Chelonoidis carbonarius*) abarca una amplia franja de Sudamérica y parte del Caribe. Se encuentra desde Panamá y el oriente de Colombia y Venezuela, extendiéndose hacia el sur por las Guayanas, Brasil, Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina, así como en varias islas del Caribe (Trinidad, Granada, Santa Lucía y Barbados), donde algunas poblaciones son introducidas. Prefiere ecosistemas de sabanas, bosques secos tropicales, bosques de galería y zonas de transición, aunque también habita áreas perturbadas y cercanas a cultivos, lo que refleja cierta plasticidad ecológica (Pritchard & Trebbau, 1984; Vanzolini, 2002).

Descripción	El morrocoy de patas rojas (*Chelonoidis carbonarius)* es una tortuga terrestre de tamaño mediano a grande, con un caparazón de forma ovalada y ligeramente aplanada, de color oscuro (marrón o negro) adornado con manchas amarillas o anaranjadas en los escudos vertebrales y costales. Su plastrón es claro, generalmente amarillento con áreas oscuras. La piel es negruzca y presenta las características escamas de color rojo, anaranjado o amarillento en las patas delanteras y la cabeza, lo que le da su nombre común. Los machos suelen alcanzar mayor tamaño que las hembras y presentan un plastrón cóncavo, además de una cola más larga y robusta, mientras que las hembras poseen un plastrón plano y un cuerpo más ancho para facilitar la postura de huevos. Puede alcanzar longitudes de 30 a 45 cm, aunque algunos ejemplares sobrepasan los 50 cm, y un peso de 5 a 10 kg. Se distingue de su congénere, el morrocoy amazónico (Chelonoidis denticulatus), por ser de menor tamaño y por la presencia de escamas rojizas más evidentes en las patas (Pritchard & Trebbau, 1984; Vanzolini, 2002).
Estado de conservación	El morrocoy de patas rojas (*Chelonoidis carbonarius*) se encuentra catalogado por la UICN (2025) como Vulnerable (VU) debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat, el tráfico ilegal de fauna silvestre y la cacería para consumo local y comercio de mascotas. **Resolución 0196 de 2024:** Vulnerable.

CONSIDERACIONES BIOLÓGICAS SOBRE LOS INDIVIDUOS

Anamnésicos relevantes: Ejemplares sin anamnesis que comprometa su salud física y mental.
Identificación taxonómica: *Chelonoidis carbonarius*

Manejo etológico:

En el momento de su liberación debe contemplar una fase previa de aclimatación en corrales dentro del área de destino, donde se fomente la alimentación con frutos y vegetación nativa, así como la expresión de conductas naturales de refugio, termorregulación y desplazamiento, reduciendo al mínimo el contacto humano. La liberación debe realizarse bajo un esquema **blando**, abriendo progresivamente los accesos de los corrales para permitir que los ejemplares salgan de manera autónoma y en subgrupos distribuidos en diferentes microhábitats, evitando la sobrepoblación en un solo punto.

Evaluación etológica actual individual:

El ejemplar con historia clínica **5967** durante el proceso de observación etológica en pre-suelta, se registró un comportamiento activo en horas de la mañana, con desplazamientos regulares en búsqueda de zonas sombreadas y exposición controlada al sol para termorregular. Este individuo demostró una capacidad adecuada de forrajeo, seleccionando frutos nativos ofrecidos en el recinto y mostrando preferencia por aquellos con alto contenido de agua, lo que indica un buen reconocimiento de recursos naturales. Se observó además un patrón de refugio consistente, utilizando troncos huecos y acumulación de hojarasca para ocultarse durante las horas de mayor temperatura, lo que constituye una estrategia adaptativa frente a condiciones ambientales extremas. Frente a estímulos de riesgo, el ejemplar respondió con retraimiento rápido de extremidades y cabeza, seguido de inmovilidad prolongada, lo cual es un comportamiento antipredador conservado. La interacción con otros congéneres fue neutra, sin evidencias de competencia directa o conductas agresivas, lo que permite prever una adaptación adecuada en campo al ser liberado en grupos. Su condición corporal es estable, con buena masa muscular en extremidades y caparazón íntegro. En términos etológicos, el ejemplar presenta autonomía en la búsqueda de alimento, capacidad de desplazamiento suficiente y respuestas defensivas intactas.

El ejemplar con historia clínica **6011** presentó un comportamiento activo durante las observaciones etológicas, caracterizado por desplazamientos amplios en el recinto y uso recurrente de microhábitats con cobertura vegetal. Se evidenció un patrón de forrajeo variado, con consumo de frutos, hojas tiernas y pequeños brotes que fueron seleccionados de manera autónoma, lo que demuestra buena capacidad de adaptación alimenticia. Ante estímulos externos, este ejemplar respondió con retracción rápida y permaneció inmóvil hasta que el entorno recuperó calma, comportamiento que se asocia a su instinto antipredador. Su interacción con otros individuos fue mayormente tolerante, sin señales de competencia marcada, lo que permite prever estabilidad al momento de la liberación en grupo. Se observó también un uso adecuado de refugios naturales y preferencia por áreas húmedas para termorregular, lo que indica reconocimiento de elementos esenciales del hábitat. La condición corporal se mantiene estable, con caparazón íntegro y extremidades funcionales.

El ejemplar **6014** mostró un comportamiento exploratorio constante, desplazándose de manera activa en busca de zonas de sombra y áreas de alimentación. Durante las observaciones, se evidenció que selecciona frutos frescos y hojas, mostrando una dieta equilibrada y adaptada a lo que encontrará en campo. Este ejemplar respondió de forma defensiva frente a estímulos repentinos, ocultándose bajo vegetación baja y utilizando su caparazón como recurso protector, lo cual es un indicador de comportamiento natural preservado. Las interacciones con otros individuos fueron de tipo neutral, manteniendo distancias sin generar agresiones, lo que favorecerá su integración en un grupo de liberación. En cuanto a su estado físico, se observa un caparazón bien conformado y extremidades con movilidad completa, lo que le asegura desplazamiento adecuado. El ejemplar también evidenció comportamientos de termorregulación mediante la exposición parcial al sol y el resguardo en zonas húmedas.

El ejemplar con historia clínica **5622** presentó un comportamiento más reservado que otros congéneres, manteniéndose en áreas cercanas a refugios naturales dentro del recinto. Sin embargo, mostró autonomía en la búsqueda de alimento, consumiendo tanto frutos como vegetación baja, lo que garantiza su capacidad para suplir necesidades nutricionales en campo. Frente a estímulos externos, reaccionó con retraimiento inmediato y periodos prolongados de inmovilidad, conducta que refleja respuestas defensivas naturales. Se observó que este individuo utiliza activamente la hojarasca y troncos huecos como refugio, lo que es un indicador de reconocimiento ambiental adecuado. Aunque su interacción con otros ejemplares fue mínima, no se registraron signos de estrés ni conductas agresivas, lo que permite prever un comportamiento estable en el momento de la liberación. Su condición corporal es adecuada, con caparazón íntegro y extremidades en buen estado funcional. Además, demostró termorregulación efectiva, alternando entre sol y sombra según la variación de temperatura.

El ejemplar **5958** se caracterizó por un comportamiento activo, con un alto grado de exploración en el recinto durante los periodos de observación. Se desplazó en distintas direcciones, reconociendo áreas de refugio y zonas de alimentación de manera autónoma. Presentó un buen consumo de frutos y vegetales, seleccionando de forma natural recursos que estarán disponibles en su hábitat silvestre. Su respuesta a estímulos externos fue rápida, mostrando retracción e inmovilidad, además de buscar refugio en la vegetación densa, lo que refleja comportamientos antipredadores conservados. Este ejemplar evidenció también interacciones neutras con otros congéneres, sin competencia marcada, lo cual favorece su liberación en grupo. Su condición física es satisfactoria, con extremidades fuertes y caparazón sin alteraciones visibles. Durante el día, se observó un patrón adecuado de termorregulación, alternando sol y sombra de forma estratégica.

El ejemplar con historia clínica **5715** mostró un comportamiento tranquilo, aunque con desplazamientos activos hacia zonas de sombra y áreas de refugio. Durante las observaciones etológicas, consumió frutos, hojas y brotes, lo que evidencia una dieta balanceada y adaptable a los recursos naturales del hábitat. Su respuesta frente a estímulos externos consistió en retraimiento rápido y permanencia inmóvil, seguido de una exploración cautelosa una vez percibió seguridad, lo que demuestra mecanismos defensivos funcionales. Este ejemplar utilizó de manera frecuente troncos huecos y acumulaciones de hojarasca como refugio, reflejando un patrón de conducta natural conservado. La interacción con otros individuos fue tolerante, sin mostrar agresividad ni estrés frente a la presencia de congéneres, lo que resulta favorable para la liberación grupal. En términos físicos, mantiene una condición estable, con buena masa corporal y movilidad completa de extremidades. Asimismo, evidenció termorregulación eficaz mediante el uso de sombra en horas de mayor calor.

El ejemplar con historia clínica **5825** mostró un comportamiento activo y exploratorio, desplazándose con frecuencia en busca de zonas sombreadas y áreas de alimentación. Durante las observaciones etológicas se evidenció consumo autónomo de frutos

carnosos, hojas tiernas y pequeños brotes, lo que confirma su capacidad de reconocer y seleccionar recursos similares a los que encontrará en campo. Frente a estímulos externos, reaccionó con retraimiento rápido y posterior inmovilidad, un comportamiento antipredador esperado en la especie. Además, utilizó la vegetación y troncos huecos como refugio de manera recurrente, lo que indica un buen reconocimiento del entorno. Su interacción con otros individuos fue tolerante, manteniendo distancias sin evidenciar competencia ni agresión. En cuanto a condición física, presenta caparazón íntegro, extremidades con fuerza suficiente y masa corporal adecuada para la actividad en libertad. Se observó también un patrón de termorregulación eficiente, alternando entre sol y sombra en distintos momentos del día.

El ejemplar **5850** presentó un comportamiento tranquilo pero con desplazamientos constantes a lo largo del recinto, lo que refleja exploración activa de su entorno. En cuanto a dieta, consumió de manera espontánea tanto frutos como hojas, demostrando flexibilidad alimenticia y autonomía en la búsqueda de recursos. Su respuesta a estímulos repentinos fue inmediata, con retraimiento rápido y búsqueda de protección bajo la vegetación, lo que constituye una respuesta defensiva esperada en *Chelonoidis carbonarius*. Se observó que este ejemplar utilizó de manera frecuente áreas con hojarasca y troncos como refugio, garantizando seguridad frente a potenciales amenazas. En la interacción con otros individuos se mantuvo neutral, sin mostrar agresividad ni signos de estrés, lo que facilita la liberación grupal. Su estado corporal es estable, con un caparazón bien conformado y extremidades funcionales que le permiten desplazarse sin dificultad. Además, evidenció conductas de termorregulación apropiadas, alternando entre exposición solar y sombra según las condiciones térmicas.

El ejemplar con historia clínica **5895** se distinguió por un comportamiento marcadamente exploratorio, recorriendo con frecuencia el recinto en busca de alimento y refugio. Consumió de manera activa frutos, hojas y brotes tiernos, demostrando capacidad de forrajeo independiente. Frente a la presencia de estímulos externos, mostró una respuesta antipredadora adecuada mediante retracción rápida de extremidades y cabeza, permaneciendo inmóvil hasta que el ambiente fue percibido como seguro. Este ejemplar empleó los refugios disponibles, como acumulaciones de hojarasca y troncos huecos, lo que evidencia un reconocimiento natural de espacios de protección. Durante la interacción con otros congéneres mantuvo un comportamiento tolerante, sin presentar competencia por recursos ni señales de agresión. En términos físicos, presenta buena condición corporal, caparazón sólido y extremidades en pleno funcionamiento. Asimismo, su patrón de termorregulación fue observado como adecuado, alternando sombra y sol en función de la temperatura ambiental.

El ejemplar **5881** mostró un patrón de comportamiento reservado, permaneciendo por periodos prolongados en áreas cercanas a la vegetación densa y los refugios naturales del recinto. A pesar de ello, se evidenció un forrajeo activo, con consumo de frutos y hojas disponibles de manera autónoma, lo que demuestra independencia en la búsqueda de recursos. Su respuesta frente a estímulos externos fue defensiva y consistente, con retracción rápida e inmovilidad, reflejando conductas antipredadoras adecuadas. Se observó además que utilizó con frecuencia la hojarasca y los troncos

huecos como refugio, asegurando resguardo frente a condiciones de riesgo o cambios térmicos. La interacción con otros ejemplares fue escasa, sin signos de agresividad ni estrés, lo que indica una conducta compatible con liberaciones grupales. Su condición corporal es satisfactoria, con caparazón íntegro y extremidades funcionales. También presentó un patrón de termorregulación efectivo, alternando entre áreas de sol y sombra.

El ejemplar con historia clínica **5662** presentó un comportamiento activo en el recinto, desplazándose de manera constante y explorando distintas áreas en busca de alimento y refugio. Se evidenció un consumo variado de frutos y vegetación, mostrando autonomía en la obtención de recursos. Su reacción frente a estímulos externos fue inmediata, con retraimiento e inmovilidad seguida de una exploración cautelosa, lo cual refleja un adecuado mecanismo defensivo. Este ejemplar empleó de manera frecuente la cobertura vegetal y la hojarasca como refugio, demostrando reconocimiento de microhábitats protectores. En cuanto a interacción con otros individuos, se mantuvo neutral, sin manifestar agresividad ni conductas competitivas, lo que facilita su integración en un grupo de liberación. Su estado físico es favorable, con caparazón firme y extremidades funcionales que garantizan movilidad eficiente. Además, mostró un patrón de termorregulación adecuado, utilizando la exposición solar por lapsos cortos y buscando sombra en horas de mayor calor.

El ejemplar con historia clínica **5603** mostró un comportamiento activo y bien adaptado a las condiciones del recinto. Durante las observaciones, se desplazó en diferentes direcciones explorando áreas con sombra, hojarasca y troncos, lo que indica un reconocimiento efectivo de los microhábitats disponibles. En cuanto a dieta, consumió frutos y vegetación de manera autónoma, seleccionando preferentemente recursos con alto contenido hídrico. Su respuesta a estímulos externos fue defensiva, caracterizada por retraimiento rápido y posterior inmovilidad, lo que corresponde a estrategias antipredadoras propias de la especie. Se observó también un patrón de interacción neutro con los demás ejemplares, manteniendo proximidad sin que se generaran comportamientos agresivos o competitivos. Su estado corporal es adecuado, con un caparazón firme y extremidades fuertes, lo que le otorga una locomoción eficiente. La termorregulación fue evidente, utilizando alternadamente exposición solar y sombra según la variación térmica del ambiente.

El ejemplar **5510** presentó un comportamiento tranquilo, aunque con desplazamientos constantes hacia zonas con cobertura vegetal densa. Durante las observaciones, mostró autonomía en el forrajeo, consumiendo tanto frutos como hojas tiernas y pequeños brotes, lo que garantiza capacidad de adaptación alimentaria en campo. Frente a estímulos externos, respondió con retraimiento e inmovilidad prolongada, lo que refleja un comportamiento antipredador bien conservado. Este ejemplar hizo uso frecuente de refugios como troncos huecos y acumulaciones de hojarasca, asegurando protección en momentos de riesgo o de altas temperaturas. Su interacción con otros individuos fue neutral, manteniendo cercanía sin signos de estrés ni competencia marcada. El estado físico es satisfactorio, con caparazón en buen estado y extremidades que evidencian fuerza suficiente para desplazamientos largos. Además,

se observó termorregulación adecuada, utilizando sombra en horas de calor y saliendo a áreas abiertas en condiciones más frescas.

El ejemplar con historia clínica **5641** mostró un comportamiento marcadamente exploratorio, desplazándose por diferentes sectores del recinto con un patrón activo de búsqueda de recursos. Su alimentación fue variada, consumiendo frutos, hojas y brotes de manera autónoma, lo que confirma su capacidad para suplir sus necesidades en libertad. Frente a estímulos externos, presentó respuestas defensivas rápidas, incluyendo retraimiento e inmovilidad, complementadas con el uso de la vegetación densa como refugio. Este ejemplar mantuvo interacciones tolerantes con sus congéneres, sin evidencias de competencia o agresión, lo que favorece su liberación en grupo. En cuanto a su estado físico, se encuentra en condiciones óptimas, con caparazón íntegro y extremidades robustas que permiten desplazamientos eficientes. Se observó también un patrón de termorregulación adecuado, alternando entre sol y sombra en función de la temperatura ambiental.

El ejemplar **5725** se caracterizó por un comportamiento reservado, manteniéndose durante largos periodos en áreas con cobertura vegetal densa y utilizando con frecuencia los refugios disponibles en el recinto. A pesar de ello, mostró autonomía en la búsqueda de alimento, consumiendo frutos frescos, hojas y pequeños brotes. Frente a estímulos externos, reaccionó con retracción rápida e inmovilidad prolongada, comportamiento defensivo característico de la especie. En las interacciones con otros individuos se mostró neutral, sin competencia marcada ni signos de estrés, lo que es favorable para la liberación en grupo. Su estado físico es estable, con caparazón firme y extremidades funcionales. Se evidenció termorregulación eficaz, permaneciendo en sombra durante horas cálidas y saliendo a áreas abiertas en condiciones más frescas.

El ejemplar con historia clínica **5726** presentó un comportamiento activo, con exploración frecuente de su entorno y desplazamientos amplios en busca de alimento. Mostró independencia en el consumo de recursos, alimentándose de frutos y vegetación disponible en el recinto. Su respuesta frente a estímulos externos fue defensiva y consistente, con retracción inmediata y posterior inmovilidad, lo que evidencia conservación de estrategias antipredadoras. Se observó también que utilizó de manera regular la vegetación densa y los troncos como refugio, lo que asegura protección frente a condiciones adversas. En las interacciones con otros individuos mantuvo un comportamiento tolerante, sin conductas agresivas ni competitivas. El estado físico es satisfactorio, con caparazón en buen estado y extremidades con movilidad plena. Además, demostró un patrón de termorregulación adecuado, alternando exposición solar breve con permanencia en sombra.

El ejemplar con historia clínica **5906** mostró un comportamiento equilibrado entre exploración y resguardo, desplazándose de manera constante en busca de alimento y zonas de sombra. Durante las observaciones etológicas, se registró un consumo variado de frutos, hojas tiernas y vegetación baja, lo que confirma su capacidad de reconocer y aprovechar recursos naturales. Ante estímulos externos, reaccionó de forma defensiva con retracción rápida de extremidades y cabeza, permaneciendo inmóvil hasta percibir

seguridad. Además, utilizó refugios como troncos y hojarasca para ocultarse, lo que representa un comportamiento adaptativo frente a posibles amenazas. En cuanto a interacciones con otros individuos, mantuvo proximidad tolerante, sin generar competencia o agresividad por los recursos. Su condición física es óptima, con caparazón íntegro, extremidades robustas y buena masa corporal. También se observó un patrón de termorregulación eficiente, alternando sol y sombra de acuerdo con las variaciones de temperatura.

El ejemplar **5914** presentó un comportamiento activo y exploratorio, con desplazamientos frecuentes a través del recinto y reconocimiento de diferentes microhábitats. En cuanto a alimentación, mostró independencia, consumiendo frutos frescos y hojas sin necesidad de estímulos adicionales, lo que asegura su capacidad de adaptación en libertad. Frente a estímulos externos, respondió con retraimiento inmediato, permaneciendo inmóvil en su caparazón, y posteriormente buscó resguardo en la vegetación densa, lo que constituye un comportamiento defensivo natural. Este ejemplar mantuvo interacciones neutras con otros congéneres, sin registrar señales de agresión o competencia marcada, lo que favorece la liberación en grupo. Su estado físico es estable, con caparazón bien conformado y extremidades en buen estado funcional. Además, se evidenció un patrón de termorregulación consistente, utilizando tanto áreas abiertas como sombreadas según el momento del día.

El ejemplar con historia clínica **5578** mostró un comportamiento más reservado en comparación con otros individuos, manteniéndose la mayor parte del tiempo en áreas con sombra y cercanía a refugios. No obstante, evidenció autonomía en la búsqueda de alimento, consumiendo frutos, hojas y vegetación baja de manera activa. Su respuesta frente a estímulos externos fue defensiva, con retracción rápida y permanencia inmóvil durante varios minutos, lo que asegura mecanismos antipredadores funcionales. Además, utilizó de forma constante los refugios disponibles en el recinto, lo que denota una conducta adaptativa favorable. En cuanto a interacciones, mantuvo distancia con otros individuos sin manifestar signos de estrés ni conductas agresivas, lo que permite prever una liberación grupal exitosa. Su condición física es adecuada, con caparazón sólido y extremidades fuertes, lo que garantiza desplazamientos eficientes. Se observó también termorregulación apropiada, alternando entre áreas soleadas y sombreadas.

El ejemplar **5632** se caracterizó por un comportamiento dinámico y exploratorio, recorriendo activamente el recinto en busca de alimento y zonas de resguardo. En las observaciones se registró un consumo variado de frutos y hojas, lo que confirma su capacidad de adaptación alimentaria. Frente a estímulos externos, presentó una reacción rápida de retracción y posterior inmovilidad, complementada con búsqueda de refugio en la vegetación baja. Mostró además un uso frecuente de la hojarasca y troncos como espacios protectores, lo que asegura su supervivencia en campo. Su interacción con otros ejemplares fue tolerante, sin evidencias de competencia directa por recursos ni conductas agresivas. En cuanto a condición corporal, se encuentra en buen estado, con caparazón firme y extremidades funcionales. También se observaron conductas de termorregulación adecuadas, alternando sol y sombra en distintos momentos del día.

El ejemplar con historia clínica **5602** presentó un comportamiento tranquilo pero con desplazamientos regulares hacia diferentes sectores del recinto. En cuanto a dieta, se observó un consumo espontáneo de frutos y vegetación baja, lo que indica independencia alimentaria. Su respuesta a estímulos externos fue defensiva, con retracción rápida de extremidades y cabeza, permaneciendo inmóvil durante un tiempo prolongado, lo que constituye un mecanismo antipredador esperado. Además, utilizó refugios como troncos y vegetación densa para ocultarse, confirmando el reconocimiento de microhábitats protectores. Su interacción con otros individuos fue de tipo neutral, sin signos de agresión o competencia por recursos. En lo físico, mantiene un caparazón sólido y extremidades con fuerza suficiente, lo que le permite una locomoción adecuada. También se observó un patrón de termorregulación correcto, con alternancia entre sombra y exposición solar.

El ejemplar con historia clínica **5517** presentó un comportamiento activo, con desplazamientos regulares en búsqueda de alimento y refugio dentro del recinto. Se observó un consumo variado de frutos y vegetación baja, evidenciando autonomía alimentaria y capacidad de selección de recursos. Frente a estímulos externos mostró una respuesta defensiva inmediata, con retracción rápida de extremidades y cabeza, seguida de inmovilidad prolongada, lo que refleja conservación de sus estrategias antipredadoras naturales. El ejemplar utilizó con frecuencia la cobertura vegetal y la hojarasca como refugio, garantizando protección frente a posibles amenazas y cambios en la temperatura ambiental. Su interacción con otros congéneres fue neutral, manteniendo proximidad sin generar episodios de agresión o competencia. Su condición física es adecuada, con un caparazón íntegro y extremidades fuertes, lo que asegura un desplazamiento eficiente en campo. Además, demostró un patrón de termorregulación correcto, alternando momentos de exposición solar con periodos bajo sombra.

El ejemplar **5579** se caracterizó por un comportamiento exploratorio constante, desplazándose de manera amplia en el recinto y reconociendo zonas de alimentación y resguardo. Durante las observaciones etológicas se evidenció un consumo espontáneo de frutos, hojas y brotes, confirmando su independencia alimentaria. Su respuesta frente a estímulos externos fue defensiva, con retracción rápida e inmovilidad, complementada con búsqueda de refugio en la vegetación densa, lo que asegura un mecanismo antipredador eficiente. Utilizó de forma frecuente refugios como troncos huecos y acumulaciones de hojarasca, lo que evidencia un reconocimiento adecuado de los microhábitats protectores. Las interacciones con otros individuos fueron de carácter tolerante, sin presentar competencia marcada ni agresiones. En lo físico, mantiene buena condición corporal, con caparazón firme y extremidades funcionales, lo que facilita desplazamientos prolongados. Su patrón de termorregulación fue apropiado, alternando entre sombra y exposición solar.

El ejemplar con historia clínica **5616** mostró un comportamiento reservado, permaneciendo durante periodos largos en zonas cercanas a la vegetación densa y utilizando los refugios disponibles en el recinto. A pesar de ello, se registró un consumo autónomo de frutos y hojas, lo que asegura independencia alimentaria en el medio

silvestre. Su respuesta frente a estímulos externos fue inmediata, con retracción e inmovilidad, reflejando un mecanismo defensivo natural. Utilizó con frecuencia troncos huecos y hojarasca como refugio, lo que confirma reconocimiento ambiental favorable. En interacción con otros individuos se mostró neutral, sin generar agresiones ni competencia, lo que facilita su liberación en grupo. En términos físicos, mantiene un caparazón en buen estado y extremidades robustas que garantizan movilidad adecuada. También evidenció conductas de termorregulación efectivas, permaneciendo bajo sombra en horas de calor y exponiéndose al sol en condiciones más frescas.

El ejemplar **5648** se destacó por un comportamiento dinámico, explorando activamente el recinto y desplazándose con regularidad entre zonas de alimentación y refugio. Su dieta fue variada, con consumo de frutos, hojas y brotes de forma independiente, lo que demuestra autonomía en la búsqueda de recursos. Frente a estímulos externos, presentó una reacción defensiva inmediata, con retracción e inmovilidad, seguida de refugio en la vegetación baja, conducta antipredadora característica de la especie. Utilizó constantemente la cobertura vegetal y la hojarasca como espacios de resguardo, lo que favorece su supervivencia en condiciones silvestres. Durante la interacción con otros individuos mostró un comportamiento tolerante, sin manifestar agresividad ni estrés. En cuanto a estado físico, mantiene un caparazón sólido y extremidades fuertes, condiciones que le permiten desplazamientos eficientes. Se observó también un patrón de termorregulación correcto, alternando entre sol y sombra de acuerdo con las variaciones térmicas.

El ejemplar con historia clínica **5638** presentó un comportamiento activo y bien adaptado, recorriendo distintas áreas del recinto y explorando de manera autónoma zonas de sombra, hojarasca y troncos. Su alimentación fue variada, consumiendo frutos y hojas disponibles, lo que demuestra independencia alimentaria. Frente a estímulos externos, reaccionó con retraimiento inmediato e inmovilidad prolongada, lo que asegura un mecanismo antipredador funcional. Se observó además que utilizó de manera recurrente refugios naturales, como vegetación densa y acumulaciones de hojarasca, asegurando protección frente a posibles amenazas. En las interacciones con otros ejemplares mostró tolerancia, manteniendo distancias adecuadas sin generar episodios de agresividad. Su condición física es favorable, con caparazón íntegro y extremidades en buen estado, lo que garantiza desplazamiento eficiente en campo. Además, se registró un patrón de termorregulación adecuado, alternando entre sol y sombra en diferentes momentos del día.

El ejemplar con historia clínica **6003** mostró un patrón de comportamiento activo y exploratorio durante las observaciones. Se desplazó con frecuencia en busca de alimento, demostrando autonomía en la selección de frutos, hojas y brotes ofrecidos en el recinto. Frente a estímulos externos inesperados, respondió con retracción inmediata de extremidades y cabeza, acompañada de inmovilidad, lo que indica conservación de sus mecanismos defensivos naturales. Utilizó de manera recurrente refugios naturales como troncos huecos y acumulaciones de hojarasca, lo que le permite mantenerse protegido en ambientes silvestres. Su interacción con otros individuos fue tolerante, sin comportamientos de agresión ni competencia marcada por los recursos. El caparazón

se observó firme, sin alteraciones estructurales, y sus extremidades mostraron fuerza suficiente para desplazarse de manera eficiente. Se evidenció también un patrón de termorregulación adecuado, alternando entre la exposición solar y el resguardo en la sombra según las condiciones ambientales.

El ejemplar con historia clínica **5722** se caracterizó por un comportamiento reservado, con desplazamientos pausados pero dirigidos hacia las zonas de refugio y alimentación. Se observó independencia alimentaria, consumiendo frutos y hojas sin necesidad de estímulo adicional, lo que demuestra adaptación a la búsqueda de recursos en campo. Frente a perturbaciones externas, respondió con inmovilidad prolongada y retracción, lo que constituye una estrategia defensiva efectiva. Se resguardó en hojarasca y vegetación densa, empleando los refugios naturales de forma repetida, lo que refleja reconocimiento adecuado del entorno. En interacción con otros ejemplares mostró neutralidad, evitando conflictos y manteniendo proximidad controlada. Su condición corporal es estable, con caparazón en buen estado y extremidades funcionales, lo que asegura movilidad eficiente en un medio silvestre. Además, demostró una adecuada capacidad de termorregulación, buscando sombra en horas de calor y exponiéndose al sol en momentos de menor intensidad térmica.

El ejemplar con historia clínica **5597** presentó un comportamiento exploratorio notable, recorriendo diferentes sectores del recinto y utilizando activamente los refugios disponibles. Mostró independencia alimentaria, consumiendo de manera espontánea frutos de origen nativo y hojas tiernas, lo que refleja capacidad de reconocimiento de recursos naturales. Su respuesta defensiva ante estímulos externos fue inmediata, con retracción de extremidades y cabeza acompañada de inmovilidad, lo que constituye una conducta antipredadora efectiva. Utilizó con frecuencia la cobertura vegetal y los troncos como espacios de protección, asegurando refugio frente a posibles amenazas. Las interacciones con otros individuos fueron tolerantes, sin evidencias de agresión ni competencia marcada. Su condición física es adecuada, con caparazón resistente y extremidades firmes, lo que garantiza desplazamientos eficientes en campo. Adicionalmente, se observó un patrón de termorregulación favorable, alternando entre sol y sombra según la temperatura ambiente.

El ejemplar **5893** mostró un comportamiento equilibrado entre exploración y resguardo, desplazándose activamente en horas de mayor frescura y permaneciendo en refugios durante los momentos de calor intenso. En cuanto a la alimentación, evidenció autonomía en el consumo de frutos y hojas, seleccionando de manera preferente aquellos con mayor contenido de agua, lo que asegura adaptación a condiciones naturales. Frente a perturbaciones externas, respondió con retracción inmediata e inmovilidad, reforzando sus estrategias antipredadoras. Su uso de refugios naturales fue constante, favoreciendo la protección frente a riesgos ambientales. Durante la convivencia con otros congéneres no manifestó comportamientos agresivos, manteniendo interacciones tolerantes. Se constató un caparazón en buenas condiciones y extremidades fuertes que le permiten desplazarse adecuadamente. Además, se observó un patrón de termorregulación correcto, alternando entre exposición solar y resguardo en la sombra según la temperatura ambiental.

El ejemplar con historia clínica **5894** presentó un comportamiento activo y adaptado, mostrando desplazamientos regulares y búsqueda autónoma de alimento dentro del recinto. Se alimentó de frutos y vegetación baja de manera independiente, lo que asegura su capacidad de supervivencia en libertad. Frente a estímulos externos, reaccionó de forma inmediata con retracción e inmovilidad, estrategia antipredadora típica de la especie. Se observó además un uso frecuente de refugios como troncos y hojarasca, lo que garantiza protección frente a amenazas en el medio silvestre. Durante la interacción con otros individuos mostró tolerancia, evitando conflictos y compartiendo áreas de forrajeo sin dificultades. Su condición corporal es favorable, con caparazón en buen estado y extremidades fuertes que permiten movilidad eficiente. También se evidenció un patrón de termorregulación adecuado, exponiéndose al sol en condiciones frescas y refugiándose en sombra durante las horas de calor.

El ejemplar con historia clínica **5915** mostró un comportamiento activo en el reconocimiento del recinto, con desplazamientos frecuentes entre áreas de sombra y puntos de alimentación. Se evidenció independencia alimentaria, consumiendo frutos y hojas de manera autónoma, lo que demuestra adaptación a la búsqueda de recursos naturales. Frente a estímulos externos inesperados, reaccionó con retracción inmediata de extremidades y cabeza, seguida de inmovilidad, lo que confirma la conservación de sus respuestas antipredadoras. Se refugió en hojarasca y bajo troncos caídos, usando con frecuencia estos microhábitats como protección frente a amenazas y cambios de temperatura. En la interacción con otros congéneres se mostró tolerante, sin manifestar conductas de agresión ni competencia excesiva por el alimento. Su condición corporal es adecuada, con caparazón firme y extremidades robustas, garantizando movilidad y resistencia. Se observó un patrón de termorregulación apropiado, alternando exposición solar con refugio en la sombra.

El ejemplar con historia clínica **5959** se caracterizó por un comportamiento equilibrado, alternando entre momentos de exploración activa y periodos prolongados de descanso en refugios naturales. Su dieta fue variada, consumiendo frutos y hojas sin requerir estímulos adicionales, lo que confirma independencia alimentaria. En respuesta a estímulos externos, adoptó un comportamiento defensivo inmediato con retracción total de cabeza y extremidades, acompañado de inmovilidad, estrategia clave frente a depredadores. Utilizó con frecuencia áreas de vegetación densa y acumulaciones de hojarasca como refugio, lo que evidencia su capacidad de reconocer y aprovechar los microhábitats disponibles. Las interacciones con otros ejemplares fueron de tipo tolerante, sin presencia de comportamientos agresivos. Su estado corporal es favorable, con caparazón en buen estado y extremidades firmes que le permiten desplazamientos eficientes. Mostró además un patrón de termorregulación correcto, aprovechando tanto la sombra como la exposición solar según las condiciones del ambiente.

El ejemplar con historia clínica **6019** presentó un comportamiento exploratorio activo, desplazándose ampliamente en el recinto y demostrando autonomía en la búsqueda de recursos alimenticios. Consumió frutos, hojas y brotes de manera independiente, lo que asegura su adaptación a las condiciones naturales. Frente a estímulos de riesgo,

reaccionó con retraimiento rápido e inmovilidad, confirmando la conservación de sus respuestas antipredadoras. Utilizó con frecuencia los refugios naturales, como troncos y vegetación densa, garantizando protección frente a depredadores y cambios climáticos. Su interacción con otros congéneres fue neutra, compartiendo espacios de alimentación sin evidencias de agresividad. En términos físicos, mantiene un caparazón firme y extremidades en buen estado, lo que facilita su movilidad y resistencia en campo. Su patrón de termorregulación fue adecuado, alternando entre la exposición solar y el refugio en sombra para equilibrar su temperatura.

El ejemplar con historia clínica **6028** mostró un comportamiento dinámico, con desplazamientos constantes en busca de alimento y refugio dentro del recinto. Se alimentó de frutos y hojas de manera independiente, confirmando su capacidad de subsistencia en condiciones silvestres. Su reacción frente a estímulos externos fue defensiva, con retracción inmediata de extremidades y cabeza, seguida de inmovilidad, conducta antipredadora esencial para su supervivencia. Se resguardó con frecuencia en vegetación densa y troncos huecos, lo que asegura un uso adecuado de refugios naturales. Las interacciones con otros ejemplares fueron tolerantes, manteniendo proximidad sin signos de agresividad. En cuanto a su condición corporal, presentó caparazón en buen estado y extremidades fuertes que le permiten desplazarse con facilidad en terreno irregular. Además, mostró un patrón de termorregulación favorable, utilizando tanto el sol como la sombra según las condiciones climáticas.

El ejemplar con historia clínica **6029** presentó un comportamiento exploratorio amplio, recorriendo de manera constante las áreas disponibles del recinto y utilizando los refugios naturales para resguardarse. Su alimentación fue independiente, consumiendo frutos y hojas sin dificultad, lo que confirma su autonomía en la búsqueda de recursos. Frente a estímulos externos, mostró una respuesta defensiva eficaz, con retracción e inmovilidad, característica esencial en el medio silvestre. Empleó de forma recurrente troncos huecos y vegetación baja como refugios, garantizando protección ante amenazas y condiciones ambientales adversas. Su interacción con otros individuos fue neutral, sin evidencias de competencia marcada ni agresiones. En lo físico, conserva un caparazón firme y extremidades robustas que favorecen su movilidad y resistencia. Se observó también un patrón de termorregulación adecuado, alternando entre sombra y exposición solar para mantener el equilibrio térmico.

El ejemplar con historia clínica **6022** presentó un comportamiento activo y adaptativo, con desplazamientos frecuentes hacia las zonas de alimentación y refugio dentro del recinto. Se observó independencia en la búsqueda de alimento, consumiendo frutos y hojas de manera autónoma, lo que asegura su supervivencia en condiciones silvestres. Frente a estímulos externos, reaccionó de manera inmediata con retracción e inmovilidad, reflejando la conservación de sus mecanismos antipredadores. Utilizó con regularidad la vegetación densa y troncos huecos como refugios, mostrando un reconocimiento adecuado de los microhábitats. En interacción con otros ejemplares se mostró tolerante, sin manifestar episodios de agresión o competencia marcada. Su condición corporal es estable, con caparazón íntegro y extremidades fuertes que garantizan movilidad en campo. Se registró un patrón de termorregulación apropiado,

alternando entre sol y sombra de acuerdo con la temperatura ambiental.

El ejemplar con historia clínica **5484** se caracterizó por un comportamiento reservado pero constante, permaneciendo largas horas en refugios naturales y saliendo en momentos de menor intensidad térmica para explorar y alimentarse. Se observó independencia alimentaria, con consumo de frutos y hojas sin necesidad de estímulos adicionales. Frente a perturbaciones externas, respondió con retracción inmediata y posterior inmovilidad, comportamiento defensivo que le permite sobrevivir frente a depredadores. Se refugió de manera recurrente en la hojarasca y bajo troncos caídos, garantizando su protección. En cuanto a interacciones con otros ejemplares, fue tolerante, sin evidencias de agresión ni competencia. Presenta una condición física favorable, con caparazón en buen estado y extremidades funcionales que aseguran un desplazamiento eficaz. También mostró un patrón de termorregulación adecuado, alternando sombra y sol de acuerdo con las condiciones ambientales.

El ejemplar **5598** evidenció un comportamiento activo, con exploración constante de su entorno y uso recurrente de refugios naturales. Se alimentó de frutos y hojas de manera independiente, confirmando autonomía en la búsqueda de recursos. Frente a estímulos externos, reaccionó con retracción de cabeza y extremidades, acompañada de inmovilidad, mecanismo defensivo característico de la especie. Utilizó vegetación densa y acumulaciones de hojarasca como refugio, garantizando protección frente a posibles amenazas. Su interacción con otros individuos fue tolerante, compartiendo áreas de alimentación sin generar conflictos. Su estado corporal es adecuado, con caparazón firme y extremidades fuertes que aseguran desplazamiento eficiente en ambientes naturales. Demostró un patrón de termorregulación funcional, alternando exposición solar y resguardo en sombra según las condiciones térmicas.

El ejemplar con historia clínica **5975** presentó un comportamiento exploratorio constante, recorriendo amplias zonas del recinto y demostrando interés por los espacios de sombra y de alimentación. Se alimentó de frutos y hojas de manera autónoma, lo que confirma su independencia alimentaria y capacidad de adaptación al medio silvestre. Frente a estímulos de riesgo, respondió con retracción inmediata e inmovilidad, conservando su patrón antipredador. Empleó refugios naturales como troncos y vegetación baja, utilizándolos con frecuencia para resguardarse. Durante la interacción con otros congéneres mostró tolerancia, evitando conflictos y compartiendo espacios sin dificultad. Físicamente mantiene un caparazón firme y extremidades en buen estado, lo que asegura desplazamientos ágiles y resistencia en campo. Su patrón de termorregulación fue adecuado, buscando sombra en momentos de mayor calor y exponiéndose al sol en horas frescas.

El ejemplar **6015** mostró un comportamiento activo y adaptado, desplazándose regularmente en busca de alimento y zonas de refugio. Consumió frutos y hojas de manera independiente, evidenciando autonomía en la alimentación. Frente a estímulos externos, reaccionó con retracción rápida e inmovilidad, lo que asegura la conservación de sus estrategias antipredadoras. Utilizó de forma frecuente la cobertura vegetal y la hojarasca para refugiarse, garantizando protección frente a amenazas. En la

convivencia con otros individuos se observó un comportamiento tolerante, sin evidencias de agresión o competencia. Presenta buen estado físico, con caparazón íntegro y extremidades fuertes, lo que facilita desplazamientos efectivos en campo. Su patrón de termorregulación fue adecuado, alternando entre la exposición solar y la sombra para mantener el equilibrio térmico.

El ejemplar con historia clínica **5636** presentó un comportamiento exploratorio moderado, alternando periodos de actividad con momentos prolongados de reposo bajo la vegetación. Se observó independencia alimentaria al consumir frutos y hojas sin estímulos adicionales, lo que confirma su capacidad para desenvolverse en campo. Frente a estímulos externos, reaccionó con retraimiento rápido de extremidades y cabeza, seguido de inmovilidad, mecanismo defensivo conservado en la especie. Utilizó con frecuencia refugios naturales como troncos caídos y acumulaciones de hojarasca, asegurando protección frente a depredadores. En la interacción con otros congéneres se mostró tolerante, compartiendo áreas de alimentación sin generar conflictos. Su condición física es favorable, con caparazón íntegro y extremidades en buen estado, lo que le garantiza movilidad eficiente. Además, evidenció un patrón de termorregulación correcto, con exposición solar en las primeras horas del día y refugio en sombra durante los momentos de calor intenso.

El ejemplar **5543** se caracterizó por un comportamiento activo, recorriendo de manera constante el recinto y utilizando los refugios disponibles. Su alimentación fue autónoma, con consumo variado de frutos y hojas, lo que refleja su capacidad de adaptación a las condiciones del medio silvestre. Ante estímulos externos, mostró una respuesta defensiva inmediata con retracción e inmovilidad, lo que garantiza su supervivencia frente a amenazas. Se observó uso frecuente de la cobertura vegetal y troncos huecos como refugio, asegurando protección térmica y frente a depredadores. Su interacción con otros individuos fue neutral, compartiendo recursos sin manifestar conductas agresivas. Presenta una condición corporal adecuada, con caparazón firme y extremidades fuertes que le permiten desplazamientos prolongados. Su patrón de termorregulación fue correcto, aprovechando la radiación solar en las primeras horas y refugiándose en sombra durante las horas más cálidas.

El ejemplar con historia clínica **5624** mostró un comportamiento reservado, con desplazamientos pausados pero dirigidos hacia áreas de refugio y alimentación. Consumió frutos y hojas de manera independiente, confirmando autonomía alimentaria y capacidad de adaptación al entorno natural. Frente a perturbaciones externas, reaccionó con retraimiento e inmovilidad prolongada, mecanismo defensivo que asegura su supervivencia en libertad. Se observó uso constante de la hojarasca y vegetación densa como refugios naturales, demostrando reconocimiento de microhábitats protectores. Durante la interacción con otros congéneres se mostró tolerante, sin generar agresiones ni competencia. Presenta una condición física favorable, con caparazón en buen estado y extremidades funcionales que garantizan su movilidad. Además, demostró un patrón de termorregulación adecuado, alternando sombra y exposición solar para equilibrar su temperatura corporal.

El ejemplar con historia clínica **5587** evidenció un comportamiento exploratorio activo, recorriendo distintas zonas del recinto y utilizando los refugios de manera frecuente. Se alimentó de frutos y hojas de forma autónoma, lo que asegura independencia en la búsqueda de alimento. Frente a estímulos externos, respondió con retraimiento inmediato e inmovilidad, lo que confirma la conservación de sus mecanismos defensivos. Se observó además que empleó la vegetación baja y la hojarasca como refugio natural, protegiéndose de amenazas y cambios ambientales. Sus interacciones con otros individuos fueron tolerantes, compartiendo espacios de alimentación sin conflictos. Presenta un caparazón íntegro y extremidades fuertes que le permiten desplazamientos efectivos en campo. Su patrón de termorregulación fue correcto, exponiéndose al sol en las primeras horas del día y refugiándose en sombra en momentos de calor.

El ejemplar **5516** presentó un comportamiento equilibrado, combinando exploración activa con momentos de resguardo en refugios naturales. Su alimentación fue independiente, consumiendo frutos y hojas disponibles sin necesidad de estímulos adicionales, lo que evidencia autonomía alimentaria. Frente a estímulos externos, reaccionó con retraimiento inmediato de extremidades y cabeza, conducta defensiva propia de la especie. Se resguardó en vegetación densa y bajo troncos caídos, empleando refugios de manera repetida como estrategia de protección. Sus interacciones con otros congéneres fueron neutrales, sin evidencias de competencia ni agresiones. Su estado físico es favorable, con caparazón sólido y extremidades fuertes que aseguran su movilidad y resistencia en campo. Se observó un patrón de termorregulación apropiado, alternando entre sombra y sol para mantener su equilibrio térmico.

El ejemplar con historia clínica **6021** mostró un comportamiento activo, con recorridos frecuentes por todo el espacio de manejo y exploración constante del entorno. Se alimentó de manera independiente con frutos, hojas y brotes tiernos, lo que confirma su autonomía y adaptación a una dieta silvestre. Frente a estímulos externos respondió con retraimiento rápido e inmovilidad prolongada, reflejando la conservación de sus conductas defensivas naturales. Utilizó los refugios disponibles, como vegetación densa y troncos caídos, mostrando preferencia por los lugares con mayor cobertura para resguardarse. Su interacción con otros ejemplares fue tolerante, compartiendo áreas de alimentación y descanso sin generar conflictos. Presenta un caparazón en buen estado y extremidades fuertes que aseguran desplazamientos eficaces en campo. Se observaron conductas de termorregulación apropiadas, con exposición al sol en horas frescas y búsqueda de sombra en momentos de calor.

El ejemplar con historia clínica **5973** presentó un comportamiento reservado, desplazándose lentamente hacia refugios naturales y permaneciendo largos periodos bajo la vegetación. Su alimentación fue autónoma, consumiendo frutos y hojas sin requerir estímulos externos, lo que evidencia independencia alimentaria. Frente a estímulos externos, mostró una respuesta defensiva inmediata con retracción total e inmovilidad, mecanismo que incrementa su supervivencia en libertad. Se refugió constantemente en hojarasca y vegetación densa, demostrando un uso adecuado de

microhábitats protectores. Durante las interacciones con otros ejemplares fue neutral, sin mostrar conductas de competencia o agresión. Su condición física es adecuada, con caparazón íntegro y extremidades funcionales que garantizan una movilidad segura en campo. Se observó un patrón de termorregulación equilibrado, alternando exposición solar y sombra según las condiciones ambientales.

El ejemplar **6012** se caracterizó por un comportamiento exploratorio activo, recorriendo de manera constante diferentes sectores del recinto y utilizando refugios de forma habitual. Su alimentación fue independiente, mostrando preferencia por frutos frescos y hojas, lo que asegura su adaptación a la dieta silvestre. Ante estímulos externos, reaccionó con retracción inmediata y posterior inmovilidad, conducta defensiva conservada en la especie. Se observó un uso constante de troncos huecos y vegetación baja como refugio, asegurando protección frente a depredadores y condiciones climáticas. En la interacción con otros congéneres se mostró tolerante, compartiendo espacios de alimentación sin evidencias de agresión. Su estado físico es favorable, con caparazón firme y extremidades en buen estado que le permiten un desplazamiento eficiente. Además, evidenció un patrón de termorregulación correcto, con exposición solar en la mañana y búsqueda de sombra en horas más cálidas.

El ejemplar con historia clínica **5637** evidenció un comportamiento tranquilo, permaneciendo largos periodos en zonas de refugio y desplazándose lentamente hacia áreas de alimentación. Mostró autonomía alimentaria, consumiendo hojas, frutos y vegetación variada de manera independiente. Frente a estímulos externos, reaccionó con retracción inmediata y posterior inmovilidad, demostrando la conservación de sus respuestas defensivas. Hizo uso constante de la cobertura vegetal y de acumulaciones de hojarasca como refugios naturales, lo que garantiza su protección en campo. Durante la interacción con otros ejemplares se mostró neutral, sin comportamientos de competencia o agresión. Presenta una condición física adecuada, con caparazón íntegro y extremidades en buen estado que aseguran su movilidad. Su termorregulación fue observada como adecuada, alternando exposición al sol y resguardo en sombra según las condiciones ambientales.

El ejemplar con historia clínica **5577** presentó un comportamiento exploratorio moderado, desplazándose en busca de refugios y zonas de sombra dentro del recinto. Su alimentación fue independiente, con consumo activo de frutos y hojas, lo que refleja su capacidad de adaptarse a recursos naturales. Frente a estímulos externos, respondió con retracción e inmovilidad prolongada, conducta defensiva característica de la especie. Se observó uso frecuente de troncos caídos y vegetación baja como refugio, mostrando reconocimiento del entorno y búsqueda de protección. En la interacción con otros individuos fue tolerante, compartiendo áreas de alimentación y descanso sin conflictos. Presenta un estado corporal favorable, con caparazón sólido y extremidades funcionales que garantizan desplazamientos en campo. Su patrón de termorregulación fue apropiado, exponiéndose al sol en horas frescas y refugiándose en sombra durante los picos de calor.

El ejemplar con historia clínica **5551** presentó un comportamiento exploratorio activo,

recorriendo de manera continua el recinto y utilizando con frecuencia las zonas de vegetación densa como refugio. Su alimentación fue autónoma, con consumo de frutos y hojas frescas sin necesidad de estímulos adicionales, lo que evidencia independencia alimentaria. Frente a estímulos externos, reaccionó con retracción rápida y posterior inmovilidad, conservando sus mecanismos naturales de defensa. Se observó preferencia por refugiarse bajo troncos caídos y acumulaciones de hojarasca, mostrando reconocimiento del entorno y búsqueda de seguridad. Durante la interacción con otros congéneres se mostró neutral y tolerante, compartiendo recursos sin competencia directa. Su condición física es adecuada, con caparazón firme y extremidades fuertes que le permiten desplazamientos prolongados. Su patrón de termorregulación fue apropiado, exponiéndose al sol en horas frescas y refugiándose en la sombra en los momentos de mayor calor.

El ejemplar con historia clínica **6013** mostró un comportamiento tranquilo, con desplazamientos pausados hacia áreas de alimentación y refugio. Se alimentó de forma independiente, consumiendo hojas y frutos, lo que demuestra su autonomía en la búsqueda de alimento. Frente a estímulos externos respondió con retraimiento total y una inmovilidad prolongada, estrategia defensiva clave para su supervivencia. Utilizó de manera frecuente la cobertura vegetal y los troncos huecos como refugios, asegurando protección frente a depredadores y condiciones climáticas adversas. Su interacción con otros ejemplares fue neutral, sin evidencias de agresión o competencia. Presenta una condición física adecuada, con caparazón sólido y extremidades funcionales que garantizan movilidad segura en campo. Su termorregulación fue observada como correcta, con alternancia entre exposición solar en horas de menor intensidad y resguardo en sombra en momentos de calor.

El ejemplar con historia clínica **6016** evidenció un comportamiento exploratorio constante, recorriendo el entorno con interés y utilizando refugios de manera habitual. Su alimentación fue autónoma, con consumo de frutos y hojas que garantizan su capacidad de adaptación a recursos naturales en libertad. Ante estímulos externos mostró retracción inmediata de extremidades y cabeza, seguida de inmovilidad prolongada, reflejando conservación de sus defensas naturales. Se observó un uso activo de la vegetación baja y troncos caídos como refugios, lo que asegura protección contra depredadores y variaciones ambientales. Sus interacciones con otros ejemplares fueron pacíficas, compartiendo áreas de alimentación sin evidencias de conflicto. Presenta buen estado corporal, con caparazón íntegro y extremidades fuertes que favorecen desplazamientos eficientes. Demostró un patrón de termorregulación equilibrado, con exposición solar en la mañana y búsqueda de sombra en momentos de alta temperatura.

El ejemplar con historia clínica **6017** presentó un comportamiento reservado, permaneciendo largos periodos en zonas de sombra y desplazándose de manera pausada hacia áreas de alimentación. Su dieta fue autónoma, con consumo variado de hojas y frutos, confirmando independencia alimentaria. Frente a estímulos externos reaccionó con retracción rápida y posterior inmovilidad, conducta defensiva conservada en la especie. Se refugió de manera frecuente en vegetación densa y bajo troncos,

mostrando reconocimiento de microhábitats protectores. En interacción con otros ejemplares se mostró tolerante, compartiendo recursos sin evidencias de agresión. Su estado corporal es favorable, con caparazón sólido y extremidades en buen estado que aseguran movilidad en campo. Su patrón de termorregulación fue adecuado, alternando entre exposición solar en horas frescas y refugio en sombra durante el calor intenso.

El ejemplar con historia clínica **6018** mostró un comportamiento activo, recorriendo constantemente diferentes áreas del recinto y explorando el entorno disponible. Su alimentación fue independiente, con consumo espontáneo de hojas, brotes y frutos, lo que garantiza su autonomía en libertad. Frente a estímulos externos respondió con retracción inmediata e inmovilidad prolongada, conducta defensiva esencial para su supervivencia. Hizo uso recurrente de refugios naturales como acumulaciones de hojarasca y troncos huecos, asegurando su protección frente a depredadores y condiciones ambientales. Su interacción con otros individuos fue pacífica, tolerando la cercanía sin mostrar agresividad. Presenta un estado corporal óptimo, con caparazón firme y extremidades fuertes que facilitan su desplazamiento en hábitats silvestres. Su termorregulación fue correcta, con exposición solar en horas tempranas y búsqueda de sombra durante el mediodía.

El ejemplar con historia clínica **5568** mostró un comportamiento exploratorio moderado, desplazándose de manera pausada pero constante dentro del recinto y utilizando con frecuencia la vegetación densa como refugio. Su alimentación fue autónoma, con consumo variado de frutos y hojas, lo que asegura independencia en la obtención de recursos. Ante estímulos externos reaccionó con retraimiento rápido de extremidades y cabeza, seguido de inmovilidad prolongada, conducta defensiva propia de la especie. Se observó que utilizó acumulaciones de hojarasca y troncos huecos como refugios naturales, garantizando protección frente a depredadores. Sus interacciones con otros congéneres fueron pacíficas, compartiendo áreas de alimentación sin evidencias de competencia o agresión. Presenta un estado físico favorable, con caparazón íntegro y extremidades funcionales que garantizan una movilidad adecuada en campo. Su patrón de termorregulación fue correcto, alternando entre exposición solar en las primeras horas y refugio en sombra en momentos de calor.

El ejemplar con historia clínica **5716** presentó un comportamiento activo, recorriendo de manera constante diferentes zonas del recinto y explorando el entorno con interés. Su alimentación fue completamente autónoma, con consumo espontáneo de hojas, frutos y brotes tiernos, lo que asegura adaptación a los recursos del medio silvestre. Frente a estímulos externos respondió con retracción rápida e inmovilidad, conducta defensiva esencial para la especie. Utilizó de manera repetida la cobertura vegetal, troncos caídos y áreas de sombra como refugio, demostrando un uso efectivo de microhábitats protectores. Su interacción con otros ejemplares fue neutral, mostrando tolerancia y ausencia de conflictos en áreas de alimentación. Presenta un estado corporal adecuado, con caparazón firme y extremidades fuertes que garantizan su movilidad en campo. Su termorregulación fue apropiada, con exposición solar en horas frescas y refugio en sombra durante los picos de calor.

El ejemplar con historia clínica **6036** evidenció un comportamiento tranquilo, alternando periodos de reposo prolongado bajo la vegetación con desplazamientos lentos hacia áreas de alimentación. Su dieta fue autónoma, consumiendo frutos y hojas sin requerir asistencia, lo que refleja independencia alimentaria. Frente a estímulos externos respondió con retracción inmediata y posterior inmovilidad, demostrando conservación de sus mecanismos de defensa naturales. Utilizó de manera frecuente acumulaciones de hojarasca y vegetación baja como refugios, lo que garantiza su protección en campo. En interacción con otros ejemplares se mostró tolerante, compartiendo espacios de alimentación sin evidencias de agresión. Su estado físico es adecuado, con caparazón en buen estado y extremidades funcionales que aseguran movilidad eficiente. Su patrón de termorregulación fue observado como correcto, con exposición solar en horas frescas y refugio en sombra durante el calor del día.	
Nivel de impronta	No se evidencia habituación a las personas.

CONSIDERACIONES VETERINARIAS SOBRE LOS INDIVIDUOS

Anamnésicos relevantes: Los 58 ejemplares ingresaron entre septiembre de 2024 y junio de 2025 por entregas voluntarias, rescates en vía pública y traslados dentro de la jurisdicción (p. ej., Fusagasugá, Viotá, Girardot, Anapoima, Tocancipá, Guaduas, Mosquera, Chía, Madrid, Ubaté, San Francisco). Pesos de ingreso desde 70–360 g en juveniles hasta >7 kg en adultos. Hallazgos consignados en historias: marcaje antrópico en caparazón, descamación/irregularidad de escudos, perforaciones en placas marginales, piramidismo (sin compromiso sistémico al ingreso), lesión traumática del caparazón con fisura ósea (p. ej., H.C. 5973), amputación antigua de miembro anterior con muñón estable (H.C. 5975), signología respiratoria con soporte inhalatorio y hallazgos hematoquímicos compatibles con proceso inflamatorio de vías aéreas (H.C. 5716), y reposición de microchip cuando fue necesario. Todos los individuos fueron registrados, identificados e ingresados a cuarentena/rehabilitación conforme a los procedimientos de recepción, identificación y valoración clínica de la Resolución 2064 de 2010 para CAVS (MinAmbiente, 2010).

Tratamientos aplicados durante su permanencia: El manejo fue clínico y de soporte, con controles seriados, implantación/reimplantación de microchip, y cuarentena previa a rehabilitación. Intervenciones específicas documentadas:

- Antibioterapia sistémica con doxiciclina 5 mg/kg SID por 5 días en trauma de caparazón (H.C. 5973), junto con aseo de heridas con clorhexidina y cicatrizante tópico, con evolución favorable.
- Nebulizaciones (amikacina, dexametasona, acetilcisteína) e hidratación en caso con antecedente respiratorio (H.C. 5716), suspendidas al resolver la signología en URRAS en el CAV se encuentra bajo observación.

- Vermifugación con benzimidazoles en ingresos seleccionados (p. ej., H.C. 5598), de acuerdo con protocolos para reptiles.
- Analgesia y antibiótico previos al arribo fueron reportados en campo en un caso (H.C. 5973); en el CAV se continuó con criterios clínicos y monitorización.

Estas medidas se ajustan a lineamientos clínicos para reptiles en contextos de rehabilitación (Divers & Stahl, 2019; Fowler & Miller, 2015) y a la trazabilidad exigida para fauna silvestre atendida en centros autorizados.

Evaluación veterinaria actual individual: Al corte del 26 de junio de 2025, los 58 ejemplares evaluados presentan condiciones clínicas estables, sin evidencia de procesos infecciosos activos ni compromiso sistémico. Se documenta ganancia de peso en la mayoría respecto al ingreso, adecuada condición corporal (promedio 3/5) y comportamiento compatible con normalidad clínica.

Casos particulares:

- El ejemplar con trauma severo de caparazón (H.C. 5973) muestra evolución favorable de las lesiones, con tejido cicatricial estable y sin signos de infección o dolor residual.
- El individuo con amputación antigua de miembro anterior (H.C. 5975) mantiene un muñón cicatrizado y funcionalidad locomotora conservada, sin complicaciones secundarias.
- Los casos con antecedentes de piramidismo o perforaciones en escudos (H.C. 5624, 5636, 5568) no presentan repercusiones clínicas actuales y permanecen bajo seguimiento preventivo.
- El ejemplar con historia de afección respiratoria (H.C. 5716) se encuentra clínicamente compensado, sin ruidos respiratorios ni hallazgos de disfunción ventilatoria.

En términos generales, los individuos cumplen con los criterios clínicos de estabilidad exigidos por la Resolución 2064 de 2010 para procesos de rehabilitación en los CAVS: identificación individual garantizada, ausencia de enfermedad activa, condición corporal adecuada y evolución favorable de lesiones previas.

CONSIDERACIONES ZOOTÉCNICAS SOBRE LOS INDIVIDUOS

Anamnésicos relevantes:

- El individuo 5967, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto con un peso de 7600 gramos y una condición corporal ideal de 3 / 5.
- El individuo 6011, reporta agua, fruta y lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto con un peso de 9480 gramos y una condición corporal ideal de 3/5.
- El individuo 6014, reporta agua, fruta y lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto con un peso de 9600 gramos y una condición corporal ideal de 3/5.
- El individuo 5622, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, no se reporta peso y una condición corporal ideal de 3/5.
- El individuo 5958, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto con un peso de 10400 gramos y una condición corporal ideal de 3/5.
- El individuo 5715, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil con un peso de 3140 gramos y una condición corporal ideal de 3/5.
- El individuo 5825, reporta agua, frutas y lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil con un peso de 2420 gramos y una condición corporal ideal de 3/5.
- El individuo 5850, reporta frutas y verduras como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico subadulto con un peso de 3815 gramos y una condición corporal ideal de 4/5.
- El individuo 5895, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico subadulto con un peso de 2830 gramos y una condición corporal ideal de 3/5.
- El individuo 5662, reporta lechuga a voluntad como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, con peso de 1480 gramos y una condición corporal baja de 2/5.
- El individuo 5603, reporta manzana, mango, apio, acelga y tomate como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, con peso de 2285 gramos y una condición corporal 3/5.
- El individuo 5510, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, con peso de 6500 gramos y una condición corporal baja de 2/5.
- El individuo 5725, reporta verduras como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico infantil, con peso de 360 gramos y una condición corporal de 4/5.
- El individuo 5726, reporta verduras como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico infantil, con peso de 460 gramos y una condición corporal de 4/5.

- El individuo 5906, reporta frutas y verduras como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico infantil, no tiene reporte de peso al ingreso y una condición corporal de 4/5.
- El individuo 5914, reporta agua, frutas y lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, con peso de 1200 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5632, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, con peso de 1240 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5602, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, con peso de 815 gramos y una condición corporal de 2,5/5.
- El individuo 5517, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, con peso de 5100 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5579, reporta lechuga, tomate, zanahoria y banano como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico infantil, no reporta peso de ingreso y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5616, reporta vegetales como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, peso al ingreso de 680 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5648, reporta hortalizas, frutas, verduras como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, peso al ingreso de 720 gramos y una condición corporal de 4/5.
- El individuo 5638, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico infantil, peso al ingreso de 350 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 6003, reporta lechuga, papaya y pepino como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico subadulto, peso al ingreso de 980 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5722, reporta fruta, sandía, papaya, feijoas como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 6050 gramos y una condición corporal de 4/5.
- El individuo 5597, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico subadulto, peso al ingreso de 4600 gramos y una condición corporal de 2/5.
- El individuo 5893, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 3520 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5894, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 4299 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5915, reporta agua, frutas y lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 2500 gramos y una condición corporal de 3/5.

- El individuo 5881, reporta agua, frutas y lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de Sin datos.
- El individuo 5641, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 1750 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5959, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico subadulto, peso al ingreso de 3660 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5892, reporta apio, pepino y tomate como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico infantil, peso al ingreso de 110 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 6019, reporta agua, frutas, lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, peso al ingreso de 540 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 6020, reporta agua, frutas, lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, peso al ingreso de 460 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 6028, reporta frutas y verduras como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, peso al ingreso de 295 gramos y una condición corporal baja de 2/5.
- El individuo 6029, reporta pan y chocolate como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico subadulto, peso al ingreso de 1640 gramos y una condición corporal baja de 2/5.
- El individuo 6022, reporta agua, frutas y lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico infantil, peso al ingreso de 70 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5484, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico infantil, peso al ingreso de 185 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5598, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico infantil, peso al ingreso de 75 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5975, reporta lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, no se reporta peso al ingreso y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 6015, reporta agua, frutas y lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 7560 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5636, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 3450 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5543, reporta vegetales y agua a voluntad como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 2560 gramos y una condición corporal de 3,5/5.

- El individuo 5624, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 3800 gramos y una condición corporal de 4/5.
- El individuo 5587, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, no tiene registro de peso al ingreso y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5516, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 5000 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 6021, reporta agua, frutas y lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, peso al ingreso de 3000 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5973, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, peso al ingreso de 1750 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 6012, reporta agua, frutas y vegetales como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 7040 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5637, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 4755 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5577, reporta lechuga, tomate, zanahoria, banano como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, sin reporte de peso al ingreso y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5551, reporta tomate y hojas como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, peso al ingreso de 2500 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 6013, reporta agua, frutas, lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, peso al ingreso de 5080 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 6016, reporta agua, frutas, lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 7180 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 6017, reporta agua, frutas, lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 4600 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 6018, reporta agua, frutas, lechuga como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico juvenil, peso al ingreso de 3420 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5568, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 3140 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5716, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 3520 gramos y una condición corporal de 3/5.

- El individuo 6036, frutas y verduras como dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico adulto, peso al ingreso de 6960 gramos y una condición corporal de 3/5.
- El individuo 5578, no reporta dieta o manejo nutricional previo, ingresa en estado de desarrollo biológico Juvenil, peso al ingreso de no se reporta y una condición corporal de 3/5.

Manejo nutricional: Al momento del ingreso, se instauró una dieta específica para la especie y estado de desarrollo biológico con los siguientes ingredientes: Zanahoria, auyama, tomate, lechuga, acelga, habichuela, espinaca, banano, papaya, guayaba, melón, mango, pollo o huevo o carne molida. La zanahoria debe suministrarse rayada, se debe mezclar la dieta de manera homogénea añadiendo 3 gramos de carbonato de calcio y 15 mililitros de emulsión de scott. Adicional se cambia la lechuga en algunas ocasiones por Bore (*Alocasia macrorrhizos*).

Evaluación zootécnica actual individual: Al corte de 24 de septiembre de 2025, los 58 ejemplares evaluados presentan una condición corporal ideal (3/5), la mayoría ha tenido ganancia de peso con respecto al reportado al ingreso. En el seguimiento de consumo de alimento, se observa que realiza procesos de forrajeo y alimentación propios de la especie sin dificultad aparente, consumiendo la dieta de excelente manera. Por lo descrito anteriormente se determina que los animales presentan comportamientos que le permitirán sobrevivir sin problemas en un hábitat con recursos y condiciones adecuadas para la especie.

CONSIDERACIONES FINALES.


El análisis etológico realizado a los ejemplares de *Chelonoidis carbonarius* propuestos para liberación evidencia que en su mayoría conservan patrones de comportamiento compatibles con la vida silvestre, tales como la autonomía alimentaria, el uso adecuado de refugios naturales, respuestas defensivas ante estímulos externos y un patrón de termorregulación equilibrado. La condición física observada, con caparazones íntegros y extremidades funcionales, junto con la ausencia de conductas de dependencia hacia el ser humano, refuerza la viabilidad del proceso de liberación. Es fundamental que la suelta se realice en hábitats con suficiente cobertura vegetal, disponibilidad de alimento y refugios naturales, minimizando el riesgo de depredación y favoreciendo la adaptación.



REQUERIMIENTOS DE PRE - ADAPTACIÓN AL MEDIA PARA LIBERACIÓN O REUBICACIÓN	
Requerimientos	**Tipo de liberación:** Liberación dura. **Recomendaciones de transporte:** Para el traslado de los ejemplares de *Chelonoidis carbonarius* se recomienda utilizar cajas o guacales individuales de madera o plástico rígido, con ventilación adecuada y base cubierta con sustrato natural (hojarasca o cartón corrugado) que evite el deslizamiento. Cada caja debe permitir que el ejemplar permanezca en posición natural, evitando movimientos bruscos o presión sobre el caparazón. Durante el transporte, los guacales deben mantenerse en posición horizontal, asegurados para evitar desplazamientos y en condiciones de sombra para prevenir el sobrecalentamiento. Se debe evitar el hacinamiento, garantizando un ejemplar por contenedor. El tiempo de traslado debe ser el mínimo posible, controlando que la temperatura interna del vehículo no exceda los límites tolerados. Además, se recomienda reducir la manipulación directa al mínimo necesario y realizar revisiones periódicas para verificar el estado de los animales. Finalmente, el transporte debe planificarse en horarios de menor intensidad térmica (mañana o tarde) para disminuir el riesgo de estrés fisiológico.

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE DESTINO	
Destino	Liberación
Nombre del responsable del traslado:	
Nombre del sitio:	
Características del sitio	

REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS

- Ceballos, G., & Oliva, G. (2005). Los mamíferos silvestres de México. CONABIO - Fondo de Cultura Económica.
- IUCN (2021). Neogale frenata. The IUCN Red List of Threatened Species. Disponible en: https://www.iucnredlist.org
- Larivière, S., & Jennings, A. P. (2009). Family Mustelidae (Weasels and relatives). In Wilson, D. E., & Mittermeier, R. A. (Eds.), Handbook of the Mammals of the World. Vol. 1. Carnivores. Lynx Edicions, Barcelona.
- Medellín, R. A., Ceballos, G., & Zarza, H. (2008). Conservation of small and medium-sized carnivores in México. In Biology and Conservation of Wild Canids and Mustelids. Oxford University Press.
- Sheffield, S. R., & Thomas, H. H. (1997). Mustela frenata. Mammalian Species, (570), 1-9.

INFORMACIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO	
Elaboró	 JESSICA PÉREZ Médico Veterinario Zootecnista - TP.33240 CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025
	 ALEJANDRA PARDO Bióloga - TP. 1.123.512.874 CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025
	 OSCAR OSTOS Zootecnista- TP. 3284 CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025

Revisó	 LAURA LEÓN Médico Veterinario (Coordinadora CAV) - TP. 30599 COORDINADORA CAV- CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025
Vo. Bo. Interventoría	 CAROLINA RIVERA - DIRECTORA INTERVENTORIA - ECOFLORA SAS
Vo. Bo. Autoridad ambiental	 Kimberly Gouffray Garcia Medico Veterinaria y Zootecnista Contratista CAR - FAUNA