ACTA

FECHA: 16 de marzo del 2026

HORA: 2:00 pm

LUGAR: Jardín Infantil Emanuel

TEMA: consejería sala materna

ASISTENTES: componente de sala amiga, madres de sala materna

ORDEN DEL DÍA:

- Saludo
- consejería
- Toma de evidencias (fotos) firma del acta cierre

DESARROLLO:

En el día de hoy lunes 16 de marzo del 2026 siendo la 2:00 pm el comité de lactancia materna y la madre de familia la señora Lili johana Sanchez se reúnen para realizar la consejería acerca del uso de biberon y chupos, Pues se ha evidenciado que el niño está usando biberón en casa por la forma en la cual consume sus alimentos y la posición de la boca al introducirla en la boca.

Antes de empezar una sesión de extracción de leche de forma manual es importante tener en cuenta:

- Lavarse siempre las manos antes de manipular el pecho.
- Efectuar un masaje en el pecho.
- Si es dentro del jardín infantil en la SAFL debe utilizar gorro y tapabocas.

Se indica que los hábitos del niño durante sus primeros meses de vida pueden impactar en su salud. Por eso debes estar alerta ante conductas como el uso del biberón y el chupete por mucho tiempo.

Powered by CamScanner

Es cierto que el chupo y el biberón lo suelen usar como medios para tranquilizar al niño cuando está inquieto. Sin embargo, cuando estos se usan por más de 12 meses, puede provocar los problemas que a continuación citaremos.

Dificultad para enseñar al niño a controlar los movimientos de su lengua

Cuando el niño succiona su biberón o el chupete, la lengua se coloca de tal forma que absorba el líquido o la pieza. Sin embargo, al momento de enseñar al niño a comer alimentos sólidos o para hablar, puede tener problemas para coordinar los movimientos de la lengua.

Infecciones del oído

Los niños que pasan mucho tiempo con el chupete suelen acostumbrarse a respirar más por la boca que por la nariz. Por naturaleza, nuestra nariz cuenta con una membrana mucosa y vellos que filtran el aire que respiramos. Pero un niño que respira por la boca suele absorber todos los elementos presentes en el aire sin ser filtrados. Como consecuencia puede sufrir infecciones en el oído.

Caries en los dientes de leche

Si el niño ya presenta sus primeros dientes de leche, la exposición excesiva a la lactosa puede crear el ambiente necesario para la multiplicación de bacterias. Esto, a su vez, causará caries que afectará al diente que a futuro será el definitivo.

Maloclusiones en los dientes

Al succionar el biberón o el chupete durante muchos meses causará deformaciones en la mandíbula y los dientes superiores. Es aquí donde surgen la mordida cruzada y la abierta. En ambos casos se pierde la simetría que permite una mordida adecuada.

Si el pequeño no puede masticar bien sus alimentos, causará dificultades en sus procesos internos de digestión. Como consecuencia, será necesario consultar al dentista para corregir la formación de los dientes de los niños.

Dificultad para hablar

Si el niño no puede dominar los movimientos de su lengua por causa del uso excesivo del chupete entonces tendrá dificultades para pronunciar las palabras. Además, es necesario dejar que el niño se exprese con sus balbuceos y sonidos vocales, lo cual no es posible si usa con frecuencia el biberón, además de afectar el vínculo afectivo entre madre e hijo, traer nuevos costos para la canasta familiar entre ellos.

Se genera el compromiso de utilizar cuchara y vaso, vaso pitillo para quitar progresivamente el biberón y así evitar diferentes problemas de salud.

Powered by CamScanner

Compromisos:


Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
RETIRAR DE MANERA INMEDIATA EL BIBERON Y REMPLAZAR POR VASO PITILLO	LILI JOHANNA SANCHEZ	INMEDIATA

CONVOCATORIA.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Jenny Urrego Peña	Profesional en atención a la primera infancia	J.I.C Emanuel	
Lili Johana Sanchez	Mamá	J.I.C Emanuel	

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



ELABORADO POR: COMPONENTE LACTANCIA MATERNA

JENNY URREGO PROF. EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA.

Powered by CamScanner