ACTA N° 04

FECHA: 10 DE MARZO DE 2026

HORA: 7:00 am

LUGAR: Jardín infantil fana

TEMA: CONSEJERÍA A PADRES DE FAMILIA (Transición del biberón)

ASISTENTES: padres de familia del jardín infantil fana.

ORDEN DEL DÍA: anticipación de la actividad, desarrollo de la actividad y evidencias.

DESARROLLO:

Siendo las 7:00 a.m. del 10 de marzo de 2026, se inició la consejería dirigida a los padres de familia en el Jardín Infantil FANA, con el propósito de orientar sobre la transición del biberón hacia el uso del vaso y la importancia de promover hábitos de alimentación saludables.

Durante el encuentro se explicó que el uso prolongado del biberón puede generar algunas consecuencias como riesgo de caries, afectaciones en la salud bucal y dificultades en el fortalecimiento de la musculatura oral, por lo que se recomendó iniciar progresivamente el uso del vaso o taza entrenadora para favorecer la autonomía en los niños.

Durante el diálogo se realizaron preguntas como ¿en qué momentos del día utilizan el biberón en casa? y ¿han intentado ofrecer el vaso? Algunos padres manifestaron que el biberón se utiliza principalmente en la noche para dormir, mientras que otros comentaron que han comenzado a introducir el vaso durante el día de manera gradual.

Asimismo, se brindaron recomendaciones como disminuir poco a poco el uso del biberón, ofrecer líquidos en vaso durante el día y acompañar el proceso con paciencia. Al finalizar la consejería, se hizo entrega a los padres de un folleto informativo relacionado con el tema para reforzar las orientaciones brindadas.

Finalmente, se agradeció la participación de las familias, resaltando la importancia del trabajo conjunto entre el hogar y el jardín infantil para favorecer el bienestar de los niños.

Powered by CamScanner

Anexos

Malformación Dentaria

El uso del biberón puede causar maloclusión dentaria (incorrecta alineación de los dientes)



Afecta el desarrollo del lenguaje

Debido a las malformaciones dentarias, se pueden presentar problemas en el lenguaje dificultando la pronunciación de ciertas palabras.



RECOMENDACIONES

- Alimentar al bebe con leche materna hasta los 6 meses, luego se empieza la alimentacion complementaria.
- La lactancia materna genera muchos beneficios para el bebe y su madre, en todo su desarrollo desde el lenguaje, cognicion,afecto, evita enfermedades y mejora el sistema inmune.
- La lactancia materna permite bajar de peso rapido, demorará el inicio de sus periodos menstruales, disminuirá el riesgo de enfermedades, como diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer de ovarios y de mama, osteoporosis, enfermedades del corazón y obesidad.
- Si se va a suministrar leche materna extraída, se puede mediante vaso o cuchara, para que el bebé reciba el alimento de la forma más parecida fisiológicamente a la toma directa del pecho de leche materna.

DESVENTAJAS DEL USO DEL BIBERÓN





Desventajas de uso del biberon o chupete

Utensilio para la lactancia artificial que consiste en una botella pequeña de cristal u otra materia , con una tetina generalmente de goma elastica , para la succión.

Succion del bebé

La succión natural que realiza el bebé estimula el pezón de la madre a producir leche

Se modifica cuando no se realiza el cierre completo de los labios y movimientos de la lengua que se mueve hacia adelante y genera presión hacia el paladar, controlando y regulando el flujo de leche materna.

Pezones agrietados o doloridos

Debido al uso de l tetero, e produce incomodidad al succionar generando una mala posición del niño a en el momento de lactar.

Confundir al bebé

El chupón hace que el niño únicamente deba abrir un poco la boca, morder fuerte y absorber la leche sin mucho esfuerzo. La combinación simultánea de ambos métodos de alimentación, hace que el recién nacido se confunda y sea incapaz de diferenciar el tipo de succión que debe emplear en cada caso.



Infecciones Gastrointestinales

Cuando se higienizan los teteros y no se realiza de la manera correcta, muchos gérmenes quedan en estos objetos ingresan al cuerpo del bebé provocando:

-Cólicos
-Diarrea
-Constipación



Destete Temprano

se produce cuando ocurre una interrupción en el amamantamiento sin que el bebé esté maduro para asumirlo. Como consecuencia, reacciona con rabia, angustia y llanto.

Afecta el binomio madre-hijo

El contacto estrecho entre madre e hijo en el amantamineto genera apego, perimiendoque se establezca una buena relación entre ambos desde el inicio.

Disminución de la Lactancia

Al usar biberón, se deja de amamantar con la misma frecuencia, provocando que no se estimule suficiente la glándula, y esta disminuya su producción.



Powered by CamScanner

Compromisos:


Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el día

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
María Sanchez	Acudiente	Fanq	
Yolanda Nieves	Hogar	Persona	
Ina Ibargüen	Profesional API	Fanq	

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner