

Esquema completo de vacunación

Ponle el brazo a la vacunación



Edad	Vacuna	Dosis	Enfermedad que previene
Recién nacido	BCG Hepatitis B	Única Recién Nacido	Meningitis tuberculosa Hepatitis B (garantizar en las primeras 12 horas del RN)
A los 2 meses	Pentavalente (DPT-Hib-Hep B)	Primera	Difteria- Tosferina- Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b. Hepatitis B)
	Antipolio Inactivo (VIP)	Primera	Parálisis flácida asociada a Poliomieltitis
	Rotavirus	Primera	Gastroenteritis asociadas al Rotavirus
	Neumococo Conjugado	Primera	Infecciones respiratorias asociadas a Streptococcus pneumoniae (neumonía, otitis, meningitis y bacteriemias)
A los 4 meses	Pentavalente (DPT-Hib-Hep B)	Segunda	Difteria- Tosferina-Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b. Hepatitis B
	Antipolio Inactivo (VIP)	Segunda	Parálisis flácida asociada a Poliomieltitis
	Rotavirus	Segunda	Gastroenteritis asociadas al Rotavirus
	Neumococo Conjugado	Segunda	Infecciones respiratorias asociadas a Streptococcus pneumoniae (neumonía, otitis, meningitis y bacteriemias)
A los 6 meses de edad	Pentavalente (DPT-Hib-Hep B)	Tercera	Difteria- Tosferina-Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b. Hepatitis B
	Antipolio Inactivo (VIP)	Tercera	Parálisis flácida asociada a Poliomieltitis
	Influenza estacional	Primera	Enfermedades respiratorias causadas por el virus de la influenza
7 meses	Influenza estacional	Segunda	Enfermedades respiratorias causadas por el virus de la influenza
9 meses	Fiebre amarilla	Única	Fiebre amarilla
A los 12 meses	Triple viral	Primera	Sarampión, Rubéola y Paperas
	Varicela	Primera	Varicela
	Neumococo Conjugado	Refuerzo	Infecciones respiratorias asociadas a Streptococcus pneumoniae (neumonía, otitis, meningitis y bacteriemias)
	Hepatitis A	Única	Hepatitis A
A los 18 meses	Pentavalente (DPT-Hib-Hep B)	Primer Refuerzo	Difteria- Tosferina-Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b. Hepatitis B
	Antipolio Inactivo (VIP)	Primer refuerzo	Parálisis flácida asociada a Poliomieltitis
	Triple viral	Refuerzo	Sarampión, Rubéola y Paperas

Edad	Vacuna	Dosis	Enfermedad que previene
A los 5 años	DPT	2do refuerzo	Difteria-Tosferina-Tétanos
	Antipolio Inactivo (VIP)	2do refuerzo	Parálisis flácida asociada a Poliomieltitis
	Varicela	Refuerzo	Varicela
9 a 17 años	Virus del Papiloma Humano (VPH) en niñas, niños y adolescentes	Única	Cánceres asociados al Virus del Papiloma Humano y otras infecciones
Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años. Toxoide tetánico y diférico del adulto (Td)		5 dosis: Td1: Día 0 Td2: al mes de Td1 Td3: a los 6 meses de Td2 Td4: al año de Td3 Td5: al año de Td4 Refuerzo cada 10 años	Difteria, Tétanos neonatal
Gestantes	Influenza estacional	Única anual a partir de la semana 14	Enfermedades respiratorias asociadas al virus de la influenza
	Tdap (Tétanos, Difteria, Tosferina acelular)	Única por cada gestación. Entre la semana 26 y preferiblemente antes de la semana 36	Tétanos neonatal, difteria y Tos ferina neonatal
	Virus sincitial Respiratorio	Única por cada gestación. Entre la semana 28 y preferiblemente antes de la semana 36	Contra que previene el VRS Infecciones respiratorias en niños, bronquiolitis y neumonía
	Influenza estacional	Anual	Enfermedades respiratorias asociadas al virus de la influenza
Adultos de 60 años y +	Neumococo polisacárido	Única	Enfermedades causadas por la bacteria Streptococcus pneumoniae

¡Ante la presencia de brotes el esquema infantil y para gestantes se adelantó de manera temporal!

Las vacunas que anteriormente se aplicaban a los:

- 2 meses ahora se administrarán a la **6 semana**.
- 4 meses, se administra a los **3 meses**.
- 6 meses, se administra a los **4 meses y medio**.

Se mantiene el refuerzo con pentavalente a los 18 meses y a los 5 años con DPT.

- Vacuna Tdap para gestantes desde la **semana 20**.



SECRETARÍA DE SALUD

Población sin Antecedente vacunal

Ponle
el brazo a la,
vacunación



De 12 a 23 meses

- **1 dosis** de BCG si pertenece a población indígena o rural dispersa.
- **3 dosis** de Antipolio VIP con intervalo mínimo de 4 semanas.
- **3 dosis** de pentavalente (DPT 1- HB 1- Hib 1) con intervalo mínimo de 4 semanas y **1 dosis** de refuerzo a un año de la tercera dosis.
- **1 dosis** de Triple Viral (SRP) + 1 refuerzo con intervalo de 6 meses; si la primera dosis se aplicó a partir de los 17 meses, manejar intervalo mínimo de 1 mes con el refuerzo.
- **1 dosis** única de fiebre amarilla.
- **1 dosis** contra la hepatitis A.
- **2 dosis** de neumococo conjugado, con un intervalo mínimo de 6 semanas.
- **2 dosis** de influenza estacional con intervalo mínimo de 4 semanas.
- **1 dosis** de vacuna contra varicela.

De 24 meses a 4 años 11 meses y 29 días

- **1 dosis** de BCG si pertenece a población indígena o rural dispersa.
- **3 dosis** de Antipolio Inactivo - VIP con intervalo mínimo de 4 semanas y una dosis de refuerzo con Antipolio Inactivo - VIP al año de las terceras dosis.
- **1 dosis** de pentavalente (DPT 1, HB 1, Hib 1).

Se completa con:

- **2 dosis** de DPT con intervalo mínimo de 4 semanas + 1 refuerzo al año de la tercera dosis.
- **2 dosis** de HB (hepatitis B) monovalente con intervalo mínimo de 4 semanas.
- **1 dosis** Triple Viral (SRP) + 1 refuerzo mínimo de las 4 semana.
- **1 dosis** única de fiebre amarilla.
- **1 dosis** de hepatitis A.
- **1 dosis** de neumococo conjugada.
- **1 dosis** de varicela.

De 5 años a 5 años 11 meses y 29 días

- **1 dosis** de BCG, si pertenece a población indígena o rural dispersa.
- **3 dosis** de antipolio inactivado (VIP), con un intervalo mínimo de 4 semanas, y un refuerzo al año de la tercera dosis, antes de cumplir los 6 años.
- **1 dosis** de pentavalente (DPT1, HB1, Hib1).
- **2 dosis** de DPT con un intervalo mínimo de 4 semanas, más un refuerzo al año de la tercera dosis de DPT, y un segundo refuerzo al año del primer refuerzo, siempre y cuando no se haya sobrepasado los 6 años de edad. Si el niño/a tiene 6 años, aplicar TD pediátrico o TdaP; y a partir de los 7 años, aplicar Td.
- **2 dosis** de hepatitis B (HB), con un intervalo mínimo de 4 semanas.
- **1 dosis** de triple viral (SRP), más un refuerzo a las 4 semanas.
- **1 dosis** única de fiebre amarilla.
- **1 dosis** de hepatitis A.
- **1 dosis** de neumococo conjugada.
- **1 dosis** de varicela, más un refuerzo con un intervalo mínimo de 3 meses.

Importante

- **A partir de los 11 años** si no tiene dosis de Triple Viral – SRP, su EPS debe garantizar la vacuna dispuesta en el Plan Básico de Salud (PBS).
- La vacuna contra varicela se garantiza a toda la cohorte nacida a partir del **primero de julio de 2014** así sobrepasen lo 6 años de edad.
- La vacuna contra Hepatitis A se garantiza a toda la cohorte nacida a partir del **primero de enero de 2012**.
- Se debe garantizar la vacunación antirrábica en post exposición, esquema día 0, 3, 7 y 14.

Tenga en cuenta que:

- **Rotavirus:** Aplicar primera dosis entre 2 meses hasta 3 meses 21 días y 2da dosis hasta 11 meses 29 días. Sin primera no hay segunda.
- **Influenza:** De 6 a 23 meses garantizar la *primovacunación* con 2 dosis, en intervalo mínimo de 4 semanas. Aplicar 1 dosis anual entre los 12 y 23 meses si cuentan con *primovacunación*.
- **Neumococo polisacárido e influenza estacional:** Personas con comorbilidad podrán recibir una dosis desde los 2 años hasta los 59 años.
- **VPH:** Personas Inmunocomprometidas deben recibir 2 dosis desde los 9 a 17 años. Con intervalo de 6 meses.
- **Tdap:** (Tétanos, Difteria, Tosferina acelular): Las gestantes residentes o provenientes de zonas dispersas o indígenas aplicar la vacuna a partir de la semana 20 de gestación.

*La información resumida en esta pieza no reemplaza la lectura y conocimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

- Se debe asegurar la vacunación sin barreras a la población residente en el territorio colombiano sin importar su status migratorio.
- No está indicado reiniciar esquemas de vacunación por lo que siempre se debe revisar y continuar la vacunación con base en el antecedente vacunal.



¡Conoce nuestros
puntos de vacunación!

SECRETARÍA DE SALUD