PRE - TEST

Nombre: Delcy Joanna Barriga.

1. A los menores de 2 años se les tomas medidas con
   - (-) Infantometro y pesa bebes
   - Tallímetro y pesa bebes
   - Infantometro y balanza
2. ¿El perímetro braquial se toma
   - Desde el nacimiento hasta los 5 años
   - Desde los 6 meses
   - Desde el año
   - (-) Desde los 6 meses a los 5 años
3. Un IMC de 31.5 en un adulto es:
   - Obesidad grado 1
   - (-) Sobrepeso
   - IMC Adecuado
   - Obesidad grado 2
4. Cuál es la tabla para la medición de las gestantes:
   - (-) Grafica de atalah
   - Grafica de gestantes
   - Curvas de gestantes
   - Ninguna de las anteriores
5. ¿El perímetro cefálico se toma desde el nacimiento y hasta que edad?
   - 3 años
   - 1 año
   - (-) 5 años
   - 10 años
6. El indicador para conocer si un menor de 5 años tiene desnutrición aguda es:
   - (-) Peso para la talla
   - Talla para la edad
   - Peso para la edad
7. ¿Cuál es la fórmula que se envía a nivel domiciliario para el manejo de la desnutrición aguda?
   - F75
   - (-) FTLC
8. ¿Todos los niños con desnutrición aguda moderada o severa deben ser tratados a nivel intrahospitalario?
   - F____ V X
9. ¿La notificación del menor de 5 años con desnutrición aguda es inmediata?
   - F____ V X

Scanned with CamScanner

PRE - TEST

Nombre: CAROLINA ALVAREZ CHAUTA.

1. A los menores de 2 años se les tomas medidas con
   - X Infantometro y pesa bebes
   - Tallímetro y pesa bebes
   - Infantometro y balanza
2. ¿El perímetro braquial se toma
   - Desde el nacimiento hasta los 5 años
   - Desde los 6 meses
   - Desde el año
   - X Desde los 6 meses a los 5 años
3. Un IMC de 31.5 en un adulto es:
   - X Obesidad grado 1
   - Sobrepeso
   - IMC Adecuado
   - Obesidad grado 2
4. Cuál es la tabla para la medición de las gestantes:
   - X Grafica de atalah
   - Grafica de gestantes
   - Curvas de gestantes
   - Ninguna de las anteriores
5. ¿El perímetro cefálico se toma desde el nacimiento y hasta que edad?
   - X 3 años
   - 1 año
   - 5 años
   - 10 años
6. El indicador para conocer si un menor de 5 años tiene desnutrición aguda es:
   - X Peso para la talla
   - Talla para la edad
   - Peso para la edad
7. ¿Cuál es la fórmula que se envía a nivel domiciliario para el manejo de la desnutrición aguda?
   - X F75
   - FTLC
8. ¿Todos los niños con desnutrición aguda moderada o severa deben ser tratados a nivel intrahospitalario?
   - F___ V X
9. ¿La notificación del menor de 5 años con desnutrición aguda es inmediata?
   - F___ V X

6.

Scanned with CamScanner

PRE - TEST

Nombre: Lara Vanessa Diaz Gil

1. A los menores de 2 años se les tomas medidas con
   - Infantometro y pesa bebes
   - Tallímetro y pesa bebes
   - Infantometro y balanza
2. ¿El perímetro braquial se toma
   - Desde el nacimiento hasta los 5 años
   - Desde los 6 meses
   - Desde el año
   - Desde los 6 meses a los 5 años
3. Un IMC de 31.5 en un adulto es:
   - Obesidad grado 1
   - Sobrepeso
   - IMC Adecuado
   - Obesidad grado 2
4. Cuál es la tabla para la medición de las gestantes:
   - Grafica de atalah
   - Grafica de gestantes
   - Curvas de gestantes
   - Ninguna de las anteriores
5. ¿El perímetro cefálico se toma desde el nacimiento y hasta que edad?
   - 3 años
   - 1 año
   - 5 años
   - 10 años
6. El indicador para conocer si un menor de 5 años tiene desnutrición aguda es:
   - Peso para la talla
   - Talla para la edad
   - Peso para la edad
7. ¿Cuál es la fórmula que se envía a nivel domiciliario para el manejo de la desnutrición aguda?
   - F75
   - FTLC
8. ¿Todos los niños con desnutrición aguda moderada o severa deben ser tratados a nivel intrahospitalario?
   - F X V ___
9. ¿La notificación del menor de 5 años con desnutrición aguda es inmediata?
   - F ___ V X

10

Scanned with CamScanner

POST - TEST

Nombre: laura Vanessa Diaz

10. A los menores de 2 años se les tomas medidas con
    - Infantometro y pesa bebes
    - Tallímetro y pesa bebes
    - Infantometro y balanza
11. ¿El perímetro braquial se toma
    - Desde el nacimiento hasta los 5 años
    - Desde los 6 meses
    - Desde el año
    - Desde los 6 meses a los 5 años
12. Un IMC de 31.5 en un adulto es:
    - Obesidad grado 1
    - Sobrepeso
    - IMC Adecuado
    - Obesidad grado 2
13. Cuál es la tabla para la medición de las gestantes:
    - Grafica de atalah
    - Grafica de gestantes
    - Curvas de gestantes
    - Ninguna de las anteriores
14. ¿El perímetro cefálico se toma desde el nacimiento y hasta que edad?
    - 3 años
    - 1 año
    - 5 años
    - 10 años
15. El indicador para conocer si un menor de 5 años tiene desnutrición aguda es:
    - Peso para la talla
    - Talla para la edad
    - Peso para la edad
16. ¿Cuál es la fórmula que se envía a nivel domiciliario para el manejo de la desnutrición aguda?
    - F75
    - FTLC
17. ¿Todos los niños con desnutrición aguda moderada o severa deben ser tratados a nivel intrahospitalario?
    - F X V ___
18. ¿La notificación del menor de 5 años con desnutrición aguda es inmediata?
    - F ___ V X

Scanned with CamScanner

POST - TEST

Nombre: Carolina Alvarez chauta

10. A los menores de 2 años se les tomas medidas con
    - X Infantometro y pesa bebes
    - Tallímetro y pesa bebes
    - Infantometro y balanza
11. ¿El perímetro braquial se toma
    - Desde el nacimiento hasta los 5 años
    - Desde los 6 meses
    - Desde el año
    - X Desde los 6 meses a los 5 años
12. Un IMC de 31.5 en un adulto es:
    - Obesidad grado 1
    - Sobrepeso
    - IMC Adecuado
    - X Obesidad grado 2
13. Cuál es la tabla para la medición de las gestantes:
    - X Grafica de atalah
    - Grafica de gestantes
    - Curvas de gestantes
    - Ninguna de las anteriores
14. ¿El perímetro cefálico se toma desde el nacimiento y hasta que edad?
    - 3 años
    - 1 año
    - X 5 años
    - 10 años
15. El indicador para conocer si un menor de 5 años tiene desnutrición aguda es:
    - X Peso para la talla
    - Talla para la edad
    - Peso para la edad
16. ¿Cuál es la fórmula que se envía a nivel domiciliario para el manejo de la desnutrición aguda?
    - F75
    - X FTLC
17. ¿Todos los niños con desnutrición aguda moderada o severa deben ser tratados a nivel intrahospitalario?
    - F X V ____
18. ¿La notificación del menor de 5 años con desnutrición aguda es inmediata?
    - F ____ V X

Scanned with CamScanner

POST - TEST

9.0

Nombre: Delcy Johanna Baliga.

10. A los menores de 2 años se les tomas medidas con
    - (-) Infantometro y pesa bebes
    - Tallímetro y pesa bebes
    - Infantometro y balanza
11. ¿El perimetro braquial se toma
    - Desde el nacimiento hasta los 5 años
    - Desde los 6 meses
    - Desde el año
    - (-) Desde los 6 meses a los 5 años
12. Un IMC de 31.5 en un adulto es:
    - (-) Obesidad grado 1
    - Sobrepeso
    - IMC Adecuado
    - Obesidad grado 2
13. Cuál es la tabla para la medición de las gestantes:
    - (-) Grafica de atalah
    - Grafica de gestantes
    - Curvas de gestantes
    - Ninguna de las anteriores
14. ¿El perímetro cefálico se toma desde el nacimiento y hasta que edad?
    - 3 años
    - 1 año
    - (-) 5 años
    - 10 años
15. El indicador para conocer si un menor de 5 años tiene desnutrición aguda es:
    - (-) .Peso para la talla
    - Talla para la edad
    - Peso para la edad
16. ¿Cuál es la fórmula que se envía a nivel domiciliario para el manejo de la desnutrición aguda?
    - F75
    - (-) FTLC
17. ¿Todos los niños con desnutrición aguda moderada o severa deben ser tratados a nivel intrahospitalario?
    - F X V ___
18. ¿La notificación del menor de 5 años con desnutrición aguda es inmediata?
    - F ___ V X

Scanned with CamScanner