FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Nombre del producto: MYECORT ®

Caracteristicas Generales	Especificación
DESCRIPCION Y ASPECTO:	Caja x 30 Tabletas en Blister Aluminio /PVDC Blanco c/u por 10 Tabletas.
1. PRINCIPIO ACTIVO	Dexametasona
2. CONCENTRACIÓN	4 mg
3. FORMA FARMACEUTICA	Tabletas
4. VÍA DE ADMINISTRACIÓN	Oral
5. CATEGORÍA TERAPÉUTICA	Corticosteroide
6. ENVASE	
6.1 Descripción	Blíster en Aluminio / PVDC BLANCO
7. EMPAQUE	
7.1 Descripción	Caja cartulina plegadiza color blanco , azul,negro.
7.2 Medidas	Largo 8.5 cms Alto 3.5 cms Ancho 1.8 cms Peso 8.7 gr
7.3 Color franja	Ninguno
7.4 Sello de seguridad	SI _____ NO X
8. INSERTO	SI _____ NO X
9. REGISTRO SANITARIO	
9.1 Número	INVIMA 2020M-0016294-R1
9.2 Vigente hasta	4/01/2026
9.3 Fabricante	COLOMPACK S.A.
9.4 Indicaciones	Corticoide sistémico
9.5 Contraindicaciones y advertencias:	Úlcera péptica, infecciones fungosas sistémicas, osteoporosis grave,psicosis o antecedentes de las mismas.Admínistrese con precaución en pacientes con isuficiencia cardíaca congestiva grave, diabetes mellitus, hipertensión arterial, tuberculosis activa a menos que se utilicen medicamentos quimioterapéuticos. Emabrazo, lactancia,geriatria, pediatria. Si se presenta alguna reacción de hipersensibilidad al inicio o durante el tratamiento dejar de administrar el medicamento . ADVERTENCIAS: No se recomienda el uso crónico en niños porque puede inhibir el crecimiento. El alcohol puede potenciar los efectos ulcerogénicos de este medicamento. Los pacientes especialmente niños, no deben ser expuestos al contagio de sarampion o varicela o recibir vacunas. En diabeticos se puede incrementar la concentración de Glucosa Sanguínea.
9.6 Vida útil	Treinta y seis (36) meses a partir de la fecha de fabricación.
9.7 Condiciones de almacenamiento	Conservese a temperatura inferior a 30°C en su envase y empaque original.
10. CODIFICACION	
	Codigo Barras: 742832533256 Código CUM: 2008878603 Código ATC: H02AB02
11. ESTABILIDAD	El producto se mantiene estable por 36 meses si es almacenado a una temperatura de hasta 30 °C , en su envase y empaque originales.
13. TOXICIDAD	
13.1 Citotóxico	SI _____ NO X

