NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM

INFORME RADIOGRAFICO

FECHA:	12/02/2026	DR (A):	N/R
MASCOTA:	PRINCESA	EDAD:	10 AÑOS
ESPECIE:	CANINO	SEXO:	HEMBRA
RAZA:	MIX	PROPIETARIO:	ALCALDIA
ESTUDIO:	RADIOLOGICO		

Motivo del estudio: PROCESO NEOPLASICO MAMARIO Y NECROTICO

Hallazgos radiográficos:

En la región esternal y tejidos blandos ventrales torácicos se identifica aumento de volumen de los tejidos blandos, con presencia de zonas radiolúcidas intratisulares compatibles con gas, hallazgo sugestivo de necrosis tisular con infección secundaria o proceso inflamatorio asociado. No se observan signos radiográficos de destrucción ósea esternal en las proyecciones evaluadas.
En el parénquima pulmonar se aprecia un patrón bronquial difuso, con mineralización de las paredes bronquiales, compatible con cambios inflamatorios crónicos de la vía aérea. En el pulmón izquierdo se identifica un nódulo pulmonar focal, de densidad de tejidos blandos, hallazgo que en el contexto clínico es sugestivo de posible implante metastásico, aunque no puede descartarse granuloma u otra etiología nodular sin estudios complementarios.
Se observan además zonas de patrón alveolar tenue, sin consolidación lobar extensa ni derrame pleural en este estudio.
La silueta cardíaca presenta un VHS estimado de 9.8, valor dentro de límites normales para la conformación del paciente.
A nivel de la columna torácica y toracolumbar se identifican cambios compatibles con espondilosis deformante en T8–T9–T10 y T12–T13–L1–L2–L3, caracterizados por proliferación ósea marginal ventral. Se observa además colapso del espacio intervertebral T12–T13, hallazgo compatible con enfermedad degenerativa discal crónica.


Conclusión:

1. Los hallazgos radiográficos son compatibles con proceso neoplásico mamario con necrosis y probable infección secundaria, evidenciado por aumento de tejidos blandos esternales con presencia de gas intratisular.
2. El nódulo pulmonar en el pulmón izquierdo es altamente sospechoso de metástasis pulmonar, considerando el antecedente de neoplasia mamaria. Las zonas de patrón alveolar tenue pueden corresponder a proceso inflamatorio concomitante o cambios reactivos.
3. La silueta cardíaca se encuentra dentro de parámetros normales. Los cambios vertebrales corresponden a enfermedad degenerativa crónica incidental.


NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM

Recomendaciones:

Se recomienda tomografía computarizada de tórax para una estadificación pulmonar más sensible y caracterización detallada del nódulo pulmonar. Para los tejidos blandos esternales, se sugiere ultrasonido o tomografía computarizadapara valorar extensión profunda y descartar compromiso óseo no evidente radiográficamente. La interpretación final debe integrarse con el estadio clínico oncológico completo del paciente.




NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM



TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277
DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM



DR. Deibert Alfonso Díaz R.
Médico veterinario Zootecnista F.U.S.M
Esp. Diplm. En imágenes diagnosticas C.U.R.
M.P. 25644