BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON
DIGERATI

INFORME DE RADIOGRAFIA

Fecha: 14 enero 2026
Paciente: CHINA
Especie: Felino
Raza: Mestizo
Sexo: Hembra
Edad: 2 años
Peso: 3 Kg.
Estado Reproductivo: Esterilizado
Historia clínica N°: 06
Tenedor: Andrea Sandoval

Estudio Radiográfico

- Región evaluada: Cráneo
- Proyecciones:
  - Laterolateral izquierda (LL izq)
  - Laterolateral derecha (LL der)
- Sin sedación

Anamnesis

Paciente felina joven que presenta aparición súbita de inflamación a nivel de la región frontal, con evolución de un día para otro. Se reporta ulceración superficial reciente, sin descarga purulenta, con presencia únicamente de sangrado leve. No se ha realizado consulta previa.

Hallazgos Radiográficos por Región

Cráneo (estructuras óseas)

- Los huesos del cráneo (frontal, parietales, nasales y maxilares) presentan contornos corticales continuos y bien definidos.
- No se identifican fracturas, fisuras, áreas de osteólisis ni proliferación ósea reactiva.
- La tabla externa del hueso frontal no muestra irregularidades ni interrupciones evidentes.
- No se observan signos radiográficos compatibles con osteomielitis o lesión ósea agresiva.

Cavidad nasal y senos

- Las cavidades nasales visibles presentan opacidad aérea conservada, sin ocupación de tejido blando ni desplazamiento de los cornetes.
- No se evidencian niveles hidroaéreos ni alteraciones óseas asociadas.
- Senos frontales sin cambios radiográficos evidentes.

Órbitas y región retroorbitaria

- Las órbitas se observan simétricas, con bordes óseos íntegros.

- No se identifican masas retrobulbares ni desplazamientos del globo ocular en las proyecciones disponibles.

Tejidos blandos

- Se aprecia un aumento de volumen de tejidos blandos a nivel de la región frontal, de bordes relativamente definidos, sin presencia de gas ni mineralizaciones.
- No se observan cuerpos extraños radiopacos en la zona evaluada.
- El aumento de volumen se limita a tejidos blandos superficiales, sin compromiso óseo subyacente.

Interpretación y Opinión Radiológica

Los hallazgos radiográficos indican un aumento de volumen de tejidos blandos en la región frontal, sin alteraciones óseas asociadas.

La ausencia de lesiones líticas, proliferativas o reacciones periostales sugiere que el proceso es extraóseo, probablemente de origen inflamatorio, traumático o infeccioso superficial.

Dentro de los diagnósticos diferenciales, se consideran:

- Traumatismo de tejidos blandos con formación de hematoma o edema.
- Absceso subcutáneo incipiente, especialmente en fase temprana, antes de generar cambios óseos visibles.
- Reacción inflamatoria local secundaria a mordedura, arañazo o cuerpo extraño no radiopaco.
- Menos probable, pero a descartar clínicamente: proceso infeccioso profundo en estadios iniciales.

No se evidencian signos radiográficos que sugieran compromiso óseo, neoplasia agresiva o extensión intracraneal.

Recomendaciones

- Correlacionar con examen clínico dermatológico de la región afectada.
- Monitorear la evolución de la lesión (aumento de tamaño, calor, dolor, aparición de secreción).
- Considerar ecografía de tejidos blandos para evaluar la presencia de contenido líquido, abscedación u otros.
- Reevaluación radiográfica si la lesión progresa o si aparecen signos sistémicos.
- Manejo clínico según criterio médico, basado en la evolución y hallazgos complementarios.

Este informe radiográfico evalúa exclusivamente estructuras óseas y tejidos blandos visibles; la radiografía no permite caracterizar de forma definitiva procesos inflamatorios o infecciosos superficiales. Debe interpretarse en conjunto con la evaluación clínica.