BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON
# DIGERATI

## INFORME DE RADIOGRAFIA

Fecha: 21 enero 2026
Paciente: JULIA
Especie: Canino
Raza: Beagle
Sexo: Hembra
Edad: 12 años
Peso: 13 Kg.
Estado Reproductivo: Esterilizado
Historia clínica N°: 06
Tenedor: Myriam Yagama

Estudio Radiográfico

- Región evaluada: Miembro anterior izquierdo (hombro y codo)
- Proyecciones:
  - Mediolateral (ML) de codo
  - Craneocaudal / ventrodorsal de hombros (comparativa)
- Sin sedación

Anamnesis

Paciente canina geriátrica, posparto reciente (último parto: 18 de diciembre), con antecedente de lesión previa en el miembro anterior izquierdo a nivel de hombro. Presenta dolor al incorporarse. Se remite para evaluación radiográfica del miembro anterior izquierdo.

**Hallazgos Radiográficos por Región**

Articulación escapulohumeral (hombro izquierdo)

- La articulación escapulohumeral izquierda muestra alteración de la congruencia articular, con remodelación ósea de la cabeza humeral.
- Se observan irregularidades del contorno subcondral, con áreas de esclerosis subcondral leve a moderada.
- Presencia de osteofitos periarticulares, compatibles con cambios degenerativos crónicos.
- El espacio articular se aprecia ligeramente disminuido en comparación con el lado contralateral.
- No se evidencian fracturas ni luxación aguda.

Escápula

- La escápula izquierda presenta estructura ósea conservada, sin signos de fractura.
- Se aprecia discreta reacción ósea en el borde glenoideo, asociada a enfermedad articular degenerativa.
- No se observan lesiones líticas ni proliferativas agresivas.

Articulación del codo izquierdo

- En la proyección mediolateral del codo se identifican cambios degenerativos articulares, caracterizados por: - Osteofitos periarticulares. - Esclerosis subcondral.
  - Irregularidad del contorno articular.
- No se observan signos radiográficos de fractura, luxación ni procesos agudos.
- Cambios compatibles con osteoartrosis crónica, acorde a la edad del paciente.

Tejidos blandos

- Los tejidos blandos periarticulares del hombro y codo izquierdos muestran discreto aumento de volumen, sin gas ni mineralizaciones.
- No se identifican masas de tejidos blandos mineralizadas en la región evaluada.

**Interpretación y Opinión Radiológica**

Los hallazgos radiográficos son compatibles con enfermedad articular degenerativa crónica (osteoartrosis) que compromete de forma más evidente la articulación escapulohumeral izquierda, con extensión al codo izquierdo.

La presencia de:

- Remodelación de la cabeza humeral
- Osteofitos periarticulares
- Disminución del espacio articular

explica clínicamente el dolor al incorporarse y la claudicación referida, especialmente en una paciente geriátrica con antecedentes de uso crónico del miembro.

No se identifican signos radiográficos de lesión traumática aguda ni procesos óseos agresivos.

**Recomendaciones**

- Correlacionar con examen ortopédico completo, evaluando rango de movimiento y dolor articular.
- Manejo multimodal del dolor y la osteoartrosis según criterio clínico.
- Considerar fisioterapia y control de peso para disminuir la carga articular.
- Seguimiento clínico; estudios adicionales solo si hay empeoramiento o signos neurológicos asociados.

Este informe radiográfico evalúa exclusivamente estructuras óseas y articulares del miembro anterior izquierdo. Debe interpretarse en conjunto con la evaluación clínica del paciente.