

IEC EVENTOS TRANSMISIBLES

Tabla. Numero de Investigaciones de campo eventos transmisibles Subred Sur Occidente Convenio 3 de diciembre -2024 a 30 de septiembre 2025

MES	IEC Alto impacto				IEC Control			
	Kennedy	Bosa	Fontibón	Puente Aranda	Kennedy	Bosa	Fontibón	Puente Aranda
dic-24	41	15	7	5	20	6	2	5
ene-25	18	17	13	10	11	11	6	3
feb-25	40	17	9	28	9	10	6	3
mar-25	53	22	15	6	17	18	4	1
abr-25	71	52	25	15	15	6	2	6
may-25	59	46	33	18	12	10	2	1
jun-25	74	43	26	18	18	12	9	2
jul-25	57	57	18	16	23	9	4	4
ago-25	67	36	20	17	11	5	7	6
sep-25	52	35	24	18	16	12	7	2

Fuente: Informes de Gestión mensuales Convenio PSPIC Subred Sur Occidente 3 de diciembre a 30 de septiembre 2025

La investigación epidemiológica de campo (IEC) es un insumo para la caracterización de los eventos transmisibles, el análisis de los determinantes y la evaluación de la efectividad de las acciones implementadas individuales y colectivas tomando las medidas en salud pública y demás precauciones sanitarias para prevenir, mitigar, controlar o eliminar la propagación de un evento que afecte o pueda afectar la salud de la población, igualmente es necesario realizar acciones de educación, asesoría, seguimiento a la adherencia al tratamiento, seguimiento a los programas e identificación de contactos y convivientes.

En eventos de alto impacto dentro de esta intervención hay eventos que requieren contención mediante bloqueos, identificación de la fuente de infección y contactos, acciones de bloqueos, profilaxis y vacunación, las cuales deben darse en las primeras 48 horas para los de eliminación y erradicación e IRAG inusitado y 72 h en el caso de tosferina. Para el caso de los eventos en control las IEC pueden realizarse máximo 7 días posteriores a la notificación.

Los eventos que se consideran de alto impacto son:

- En eliminación y erradicación: Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, Sarampión, Rubeola, Síndrome de Rubéola Congénita.
- Tétanos Neonatal,

- Tosferina,
- Meningitis Neumococcica, Meningocócica y por Haemophilus influenzae, Difteria
- Evento adverso posterior a la vacunación grave
- Fiebre Tifoidea y Paratifoidea
- varicela y parotiditis en gestantes e inmunocomprometidos
- MISC
- MPOX
- Mortalidad por eventos transmitidos por vectores
- Mortalidad por accidentes ofídicos o mordedura por animales venenosos, morbilidad de ETV, fiebre amarilla (estos dos últimos eventos se pueden solicitar según directriz del referente distrital).
- Rabia,
- TB farmacorresistente y TB en cárceles y otros conglomerados,
- IRAG inusitada y mortalidad por COVID
- Hepatitis de origen desconocido y otros eventos emergentes o de alerta nacional o internacional que puedan surgir.

Los eventos que se consideran en control son:

- Micobacterias (Tuberculosis todas las formas y lepra)
- Hepatitis A
- Tétanos accidental
- EAPV (solo aplica únicamente visita al punto de vacunación)
- Meningitis de origen bacteriano por otros agentes etiológicos diferentes a las que se realizan por alto impacto