Evaluación Paciente politraumatizado

20-03-2026

Nombre: Yuliana Andrea Colorado Ortiz

1. ¿Cuál es el propósito principal de analizar aspectos como la severidad de los daños, medidas de protección y distancias en una escena de trauma?

A) Determinar el tratamiento definitivo del paciente en el lugar del accidente
B) Estimar la gravedad de las lesiones y comprender la cinemática del trauma
C) Identificar únicamente los daños materiales del accidente
D) Establecer responsabilidades legales de los involucrados

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los principios del manejo inicial del paciente con trauma?

A) Priorizar la atención estética de las lesiones visibles antes de evaluar funciones vitales
B) Realizar el tratamiento definitivo inmediatamente sin necesidad de reevaluaciones
C) Organizar el equipo, priorizar lesiones que amenazan la vida y reevaluar constantemente al paciente
D) Limitar la evaluación únicamente a la lesión principal para evitar pérdida de tiempo

3. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en un paciente politraumatizado inconsciente?

A) Presencia de cuerpos extraños en la vía aérea
B) Acumulación de secreciones y sangre
C) Desplazamiento posterior de la lengua por pérdida del tono muscular
D) Edema de la vía aérea por trauma

4. En el manejo del paciente traumatizado, ¿qué se debe hacer cuando las condiciones del paciente son críticas?

A) Inmovilizar únicamente la fractura más evidente
B) Postergar la inmovilización hasta llegar al hospital
C) Estabilizar todas las fracturas en bloque e inmovilizar al paciente en una tabla larga
D) Permitir la movilización del paciente para evaluar el dolor

5. Por qué es importante diferenciar el shock hipovolémico del cardiogénico en el paciente traumatizado?

A) Porque el shock cardiogénico no requiere tratamiento inmediato
B) Porque ambos tienen el mismo manejo clínico
C) Porque el shock cardiogénico requiere intervención inmediata y manejo específico
D) Porque el shock hipovolémico es siempre bien tolerado

Evaluación Paciente politraumatizado

20-03-2026

Nombre: Paola Andrea Tascón

1. ¿Cuál es el propósito principal de analizar aspectos como la severidad de los daños, medidas de protección y distancias en una escena de trauma?

A) Determinar el tratamiento definitivo del paciente en el lugar del accidente
B) Estimar la gravedad de las lesiones y comprender la cinemática del trauma
C) Identificar únicamente los daños materiales del accidente
D) Establecer responsabilidades legales de los involucrados

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los principios del manejo inicial del paciente con trauma?

A) Priorizar la atención estética de las lesiones visibles antes de evaluar funciones vitales
B) Realizar el tratamiento definitivo inmediatamente sin necesidad de reevaluaciones
C) Organizar el equipo, priorizar lesiones que amenazan la vida y reevaluar constantemente al paciente
D) Limitar la evaluación únicamente a la lesión principal para evitar pérdida de tiempo

3. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en un paciente politraumatizado inconsciente?

A) Presencia de cuerpos extraños en la vía aérea
B) Acumulación de secreciones y sangre
C) Desplazamiento posterior de la lengua por pérdida del tono muscular
D) Edema de la vía aérea por trauma

4. En el manejo del paciente traumatizado, ¿qué se debe hacer cuando las condiciones del paciente son críticas?

A) Inmovilizar únicamente la fractura más evidente
B) Postergar la inmovilización hasta llegar al hospital
C) Estabilizar todas las fracturas en bloque e inmovilizar al paciente en una tabla larga
D) Permitir la movilización del paciente para evaluar el dolor

5. Por qué es importante diferenciar el shock hipovolémico del cardiogénico en el paciente traumatizado?

A) Porque el shock cardiogénico no requiere tratamiento inmediato
B) Porque ambos tienen el mismo manejo clínico
C) Porque el shock cardiogénico requiere intervención inmediata y manejo específico
D) Porque el shock hipovolémico es siempre bien tolerado

Evaluación Paciente politraumatizado

20-03-2026

Nombre: Fabian Hernandez

1. ¿Cuál es el propósito principal de analizar aspectos como la severidad de los daños, medidas de protección y distancias en una escena de trauma?

A) Determinar el tratamiento definitivo del paciente en el lugar del accidente
X) Estimar la gravedad de las lesiones y comprender la cinemática del trauma
C) Identificar únicamente los daños materiales del accidente
D) Establecer responsabilidades legales de los involucrados

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los principios del manejo inicial del paciente con trauma?

A) Priorizar la atención estética de las lesiones visibles antes de evaluar funciones vitales
B) Realizar el tratamiento definitivo inmediatamente sin necesidad de reevaluaciones
X) Organizar el equipo, priorizar lesiones que amenazan la vida y reevaluar constantemente al paciente
D) Limitar la evaluación únicamente a la lesión principal para evitar pérdida de tiempo

3. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en un paciente politraumatizado inconsciente?

A) Presencia de cuerpos extraños en la vía aérea
B) Acumulación de secreciones y sangre
X) Desplazamiento posterior de la lengua por pérdida del tono muscular
D) Edema de la vía aérea por trauma

4. En el manejo del paciente traumatizado, ¿qué se debe hacer cuando las condiciones del paciente son críticas?

A) Inmovilizar únicamente la fractura más evidente
B) Postergar la inmovilización hasta llegar al hospital
X) Estabilizar todas las fracturas en bloque e inmovilizar al paciente en una tabla larga
D) Permitir la movilización del paciente para evaluar el dolor

5. Por qué es importante diferenciar el shock hipovolémico del cardiogénico en el paciente traumatizado?

A) Porque el shock cardiogénico no requiere tratamiento inmediato
B) Porque ambos tienen el mismo manejo clínico
X) Porque el shock cardiogénico requiere intervención inmediata y manejo específico
D) Porque el shock hipovolémico es siempre bien tolerado

Evaluación Paciente politraumatizado

20-03-2026

Nombre: Joselin Martinez.

1. ¿Cuál es el propósito principal de analizar aspectos como la severidad de los daños, medidas de protección y distancias en una escena de trauma?

A) Determinar el tratamiento definitivo del paciente en el lugar del accidente
✓ B) Estimar la gravedad de las lesiones y comprender la cinemática del trauma
C) Identificar únicamente los daños materiales del accidente
D) Establecer responsabilidades legales de los involucrados

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los principios del manejo inicial del paciente con trauma?

A) Priorizar la atención estética de las lesiones visibles antes de evaluar funciones vitales
B) Realizar el tratamiento definitivo inmediatamente sin necesidad de reevaluaciones
✓ C) Organizar el equipo, priorizar lesiones que amenazan la vida y reevaluar constantemente al paciente
D) Limitar la evaluación únicamente a la lesión principal para evitar pérdida de tiempo

3. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en un paciente politraumatizado inconsciente?

A) Presencia de cuerpos extraños en la vía aérea
B) Acumulación de secreciones y sangre
✓ C) Desplazamiento posterior de la lengua por pérdida del tono muscular
D) Edema de la vía aérea por trauma

4. En el manejo del paciente traumatizado, ¿qué se debe hacer cuando las condiciones del paciente son críticas?

A) Inmovilizar únicamente la fractura más evidente
B) Postergar la inmovilización hasta llegar al hospital
✓ C) Estabilizar todas las fracturas en bloque e inmovilizar al paciente en una tabla larga
D) Permitir la movilización del paciente para evaluar el dolor

5. Por qué es importante diferenciar el shock hipovolémico del cardiogénico en el paciente traumatizado?

A) Porque el shock cardiogénico no requiere tratamiento inmediato
B) Porque ambos tienen el mismo manejo clínico
✓ C) Porque el shock cardiogénico requiere intervención inmediata y manejo específico
D) Porque el shock hipovolémico es siempre bien tolerado

Evaluación Paciente politraumatizado

20-03-2026

Nombre: [illegible]

1. ¿Cuál es el propósito principal de analizar aspectos como la severidad de los daños, medidas de protección y distancias en una escena de trauma?

A) Determinar el tratamiento definitivo del paciente en el lugar del accidente
B) Estimar la gravedad de las lesiones y comprender la cinemática del trauma
C) Identificar únicamente los daños materiales del accidente
D) Establecer responsabilidades legales de los involucrados

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los principios del manejo inicial del paciente con trauma?

A) Priorizar la atención estética de las lesiones visibles antes de evaluar funciones vitales
B) Realizar el tratamiento definitivo inmediatamente sin necesidad de reevaluaciones
C) Organizar el equipo, priorizar lesiones que amenazan la vida y reevaluar constantemente al paciente
D) Limitar la evaluación únicamente a la lesión principal para evitar pérdida de tiempo

3. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en un paciente politraumatizado inconsciente?

A) Presencia de cuerpos extraños en la vía aérea
B) Acumulación de secreciones y sangre
C) Desplazamiento posterior de la lengua por pérdida del tono muscular
D) Edema de la vía aérea por trauma

4. En el manejo del paciente traumatizado, ¿qué se debe hacer cuando las condiciones del paciente son críticas?

A) Inmovilizar únicamente la fractura más evidente
B) Postergar la inmovilización hasta llegar al hospital
C) Estabilizar todas las fracturas en bloque e inmovilizar al paciente en una tabla larga
D) Permitir la movilización del paciente para evaluar el dolor

5. Por qué es importante diferenciar el shock hipovolémico del cardiogénico en el paciente traumatizado?

A) Porque el shock cardiogénico no requiere tratamiento inmediato
B) Porque ambos tienen el mismo manejo clínico
C) Porque el shock cardiogénico requiere intervención inmediata y manejo específico
D) Porque el shock hipovolémico es siempre bien tolerado

Evaluación Paciente politraumatizado

20-03-2026

Nombre: Ubert J. Cuadalpud

1. ¿Cuál es el propósito principal de analizar aspectos como la severidad de los daños, medidas de protección y distancias en una escena de trauma?

A) Determinar el tratamiento definitivo del paciente en el lugar del accidente
B) Estimar la gravedad de las lesiones y comprender la cinemática del trauma
C) Identificar únicamente los daños materiales del accidente
D) Establecer responsabilidades legales de los involucrados

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los principios del manejo inicial del paciente con trauma?

A) Priorizar la atención estética de las lesiones visibles antes de evaluar funciones vitales
B) Realizar el tratamiento definitivo inmediatamente sin necesidad de reevaluaciones
C) Organizar el equipo, priorizar lesiones que amenazan la vida y reevaluar constantemente al paciente
D) Limitar la evaluación únicamente a la lesión principal para evitar pérdida de tiempo

3. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en un paciente politraumatizado inconsciente?

A) Presencia de cuerpos extraños en la vía aérea
B) Acumulación de secreciones y sangre
C) Desplazamiento posterior de la lengua por pérdida del tono muscular
D) Edema de la vía aérea por trauma

4. En el manejo del paciente traumatizado, ¿qué se debe hacer cuando las condiciones del paciente son críticas?

A) Inmovilizar únicamente la fractura más evidente
B) Postergar la inmovilización hasta llegar al hospital
C) Estabilizar todas las fracturas en bloque e inmovilizar al paciente en una tabla larga
D) Permitir la movilización del paciente para evaluar el dolor

5. Por qué es importante diferenciar el shock hipovolémico del cardiogénico en el paciente traumatizado?

A) Porque el shock cardiogénico no requiere tratamiento inmediato
B) Porque ambos tienen el mismo manejo clínico
C) Porque el shock cardiogénico requiere intervención inmediata y manejo específico
D) Porque el shock hipovolémico es siempre bien tolerado

Evaluación Paciente politraumatizado

20-03-2026

Nombre: Juan David Abello

1. ¿Cuál es el propósito principal de analizar aspectos como la severidad de los daños, medidas de protección y distancias en una escena de trauma?

A) Determinar el tratamiento definitivo del paciente en el lugar del accidente
B) Estimar la gravedad de las lesiones y comprender la cinemática del trauma
C) Identificar únicamente los daños materiales del accidente
D) Establecer responsabilidades legales de los involucrados

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los principios del manejo inicial del paciente con trauma?

A) Priorizar la atención estética de las lesiones visibles antes de evaluar funciones vitales
B) Realizar el tratamiento definitivo inmediatamente sin necesidad de reevaluaciones
C) Organizar el equipo, priorizar lesiones que amenazan la vida y reevaluar constantemente al paciente
D) Limitar la evaluación únicamente a la lesión principal para evitar pérdida de tiempo

3. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en un paciente politraumatizado inconsciente?

A) Presencia de cuerpos extraños en la vía aérea
B) Acumulación de secreciones y sangre
C) Desplazamiento posterior de la lengua por pérdida del tono muscular
D) Edema de la vía aérea por trauma

4. En el manejo del paciente traumatizado, ¿qué se debe hacer cuando las condiciones del paciente son críticas?

A) Inmovilizar únicamente la fractura más evidente
B) Postergar la inmovilización hasta llegar al hospital
C) Estabilizar todas las fracturas en bloque e inmovilizar al paciente en una tabla larga
D) Permitir la movilización del paciente para evaluar el dolor

5. Por qué es importante diferenciar el shock hipovolémico del cardiogénico en el paciente traumatizado?

A) Porque el shock cardiogénico no requiere tratamiento inmediato
B) Porque ambos tienen el mismo manejo clínico
C) Porque el shock cardiogénico requiere intervención inmediata y manejo específico
D) Porque el shock hipovolémico es siempre bien tolerado