Evaluación Trauma craneocefalico

20- 03 - 2026

Nombre: Joselin Martínez.

1. ¿Cuáles son los tres elementos básicos contenidos dentro del cráneo?

A) Músculos, huesos y nervios
✓ B) Masa cerebral, vasos sanguíneos y líquido cefalorraquídeo
C) Piel, tejido subcutáneo y vasos linfáticos
D) Cerebelo, médula espinal y nervios periféricos

2. ¿Cuál es el valor mínimo de presión arterial media (PAM) necesario para mantener una adecuada perfusión cerebral?

A) 70 mmHg
B) 100 mmHg
✓ C) 90 mmHg
D) 60 mmHg

3. En un paciente con trauma craneoencefálico (TCE), ¿qué hallazgo pupilar debe considerarse un signo de posible hernia cerebral?

A) Pupilas reactivas y simétricas
B) Pupilas isocóricas con reflejo normal
✓ C) Pupila fija o no reactiva (unilateral o bilateral)
D) Midriasis bilateral reactiva

4. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una de las complicaciones más frecuentes en el manejo del paciente traumatizado?

✓ A) Falla en el manejo de la vía aérea
B) Hipoglucemia
C) Deshidratación
D) Infección nosocomia

5. Cuál es la importancia principal del manejo adecuado del trauma craneoencefálico en el ámbito prehospitalario?

A) Reducir el costo del tratamiento hospitalario
B) Evitar el traslado del paciente
✓ C) Disminuir las lesiones secundarias y su impacto en el paciente
D) Aumentar la rapidez del diagnóstico definitivo

Evaluación Trauma craneocefalico

20- 03 - 2026

Nombre: [illegible]

1. ¿Cuáles son los tres elementos básicos contenidos dentro del cráneo?

A) Músculos, huesos y nervios
B) Masa cerebral, vasos sanguíneos y líquido cefalorraquídeo
C) Piel, tejido subcutáneo y vasos linfáticos
D) Cerebelo, médula espinal y nervios periféricos

2. ¿Cuál es el valor mínimo de presión arterial media (PAM) necesario para mantener una adecuada perfusión cerebral?

A) 70 mmHg
B) 100 mmHg
C) 90 mmHg
D) 60 mmHg

3. En un paciente con trauma craneoencefálico (TCE), ¿qué hallazgo pupilar debe considerarse un signo de posible hernia cerebral?

A) Pupilas reactivas y simétricas
B) Pupilas isocóricas con reflejo normal
C) Pupila fija o no reactiva (unilateral o bilateral)
D) Midriasis bilateral reactiva

4. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una de las complicaciones más frecuentes en el manejo del paciente traumatizado?

A) Falla en el manejo de la vía aérea
B) Hipoglucemia
C) Deshidratación
D) Infección nosocomia

5. Cuál es la importancia principal del manejo adecuado del trauma craneoencefálico en el ámbito prehospitalario?

A) Reducir el costo del tratamiento hospitalario
B) Evitar el traslado del paciente
C) Disminuir las lesiones secundarias y su impacto en el paciente
D) Aumentar la rapidez del diagnóstico definitivo

Evaluación Trauma craneocefalico

20- 03 - 2026

Nombre: Ulises T. Guadalupe Peña

1. ¿Cuáles son los tres elementos básicos contenidos dentro del cráneo?

A) Músculos, huesos y nervios
B) Masa cerebral, vasos sanguíneos y líquido cefalorraquídeo
C) Piel, tejido subcutáneo y vasos linfáticos
D) Cerebelo, médula espinal y nervios periféricos

2. ¿Cuál es el valor mínimo de presión arterial media (PAM) necesario para mantener una adecuada perfusión cerebral?

A) 70 mmHg
B) 100 mmHg
C) 90 mmHg
D) 60 mmHg

3. En un paciente con trauma craneoencefálico (TCE), ¿qué hallazgo pupilar debe considerarse un signo de posible hernia cerebral?

A) Pupilas reactivas y simétricas
B) Pupilas isocóricas con reflejo normal
C) Pupila fija o no reactiva (unilateral o bilateral)
D) Midriasis bilateral reactiva

4. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una de las complicaciones más frecuentes en el manejo del paciente traumatizado?

A) Falla en el manejo de la vía aérea
B) Hipoglucemia
C) Deshidratación
D) Infección nosocomia

5. Cuál es la importancia principal del manejo adecuado del trauma craneoencefálico en el ámbito prehospitalario?

A) Reducir el costo del tratamiento hospitalario
B) Evitar el traslado del paciente
C) Disminuir las lesiones secundarias y su impacto en el paciente
D) Aumentar la rapidez del diagnóstico definitivo

Evaluación Trauma craneocefalico

20- 03 - 2026

Nombre: Juan David Abello

1. ¿Cuáles son los tres elementos básicos contenidos dentro del cráneo?

A) Músculos, huesos y nervios
B) Masa cerebral, vasos sanguíneos y líquido cefalorraquídeo
C) Piel, tejido subcutáneo y vasos linfáticos
D) Cerebelo, médula espinal y nervios periféricos

2. ¿Cuál es el valor mínimo de presión arterial media (PAM) necesario para mantener una adecuada perfusión cerebral?

A) 70 mmHg
B) 100 mmHg
C) 90 mmHg
D) 60 mmHg

3. En un paciente con trauma craneoencefálico (TCE), ¿qué hallazgo pupilar debe considerarse un signo de posible hernia cerebral?

A) Pupilas reactivas y simétricas
B) Pupilas isocóricas con reflejo normal
C) Pupila fija o no reactiva (unilateral o bilateral)
D) Midriasis bilateral reactiva

4. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una de las complicaciones más frecuentes en el manejo del paciente traumatizado?

A) Falla en el manejo de la vía aérea
B) Hipoglucemia
C) Deshidratación
D) Infección nosocomia

5. Cuál es la importancia principal del manejo adecuado del trauma craneoencefálico en el ámbito prehospitalario?

A) Reducir el costo del tratamiento hospitalario
B) Evitar el traslado del paciente
C) Disminuir las lesiones secundarias y su impacto en el paciente
D) Aumentar la rapidez del diagnóstico definitivo

20- 03 - 2026

Nombre: Yuliana Andrea Colorado

1. ¿Cuáles son los tres elementos básicos contenidos dentro del cráneo?

A) Músculos, huesos y nervios
B) Masa cerebral, vasos sanguíneos y líquido cefalorraquídeo
C) Piel, tejido subcutáneo y vasos linfáticos
D) Cerebelo, médula espinal y nervios periféricos

2. ¿Cuál es el valor mínimo de presión arterial media (PAM) necesario para mantener una adecuada perfusión cerebral?

A) 70 mmHg
B) 100 mmHg
C) 90 mmHg
D) 60 mmHg

3. En un paciente con trauma craneoencefálico (TCE), ¿qué hallazgo pupilar debe considerarse un signo de posible hernia cerebral?

A) Pupilas reactivas y simétricas
B) Pupilas isocóricas con reflejo normal
C) Pupila fija o no reactiva (unilateral o bilateral)
D) Midriasis bilateral reactiva

4. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una de las complicaciones más frecuentes en el manejo del paciente traumatizado?

A) Falla en el manejo de la vía aérea
B) Hipoglucemia
C) Deshidratación
D) Infección nosocomia

5. Cuál es la importancia principal del manejo adecuado del trauma craneoencefálico en el ámbito prehospitalario?

A) Reducir el costo del tratamiento hospitalario
B) Evitar el traslado del paciente
C) Disminuir las lesiones secundarias y su impacto en el paciente
D) Aumentar la rapidez del diagnóstico definitivo

Evaluación Trauma craneocefalico

20- 03 - 2026

Nombre: Paola Andrea Tascón

1. ¿Cuáles son los tres elementos básicos contenidos dentro del cráneo?

A) Músculos, huesos y nervios
B) Masa cerebral, vasos sanguíneos y líquido cefalorraquídeo
C) Piel, tejido subcutáneo y vasos linfáticos
D) Cerebelo, médula espinal y nervios periféricos

2. ¿Cuál es el valor mínimo de presión arterial media (PAM) necesario para mantener una adecuada perfusión cerebral?

A) 70 mmHg
B) 100 mmHg
C) 90 mmHg
D) 60 mmHg

3. En un paciente con trauma craneoencefálico (TCE), ¿qué hallazgo pupilar debe considerarse un signo de posible hernia cerebral?

A) Pupilas reactivas y simétricas
B) Pupilas isocóricas con reflejo normal
C) Pupila fija o no reactiva (unilateral o bilateral)
D) Midriasis bilateral reactiva

4. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una de las complicaciones más frecuentes en el manejo del paciente traumatizado?

A) Falla en el manejo de la vía aérea
B) Hipoglucemia
C) Deshidratación
D) Infección nosocomia

5. Cuál es la importancia principal del manejo adecuado del trauma craneoencefálico en el ámbito prehospitalario?

A) Reducir el costo del tratamiento hospitalario
B) Evitar el traslado del paciente
C) Disminuir las lesiones secundarias y su impacto en el paciente
D) Aumentar la rapidez del diagnóstico definitivo

Evaluación Trauma craneocefalico

20- 03 - 2026

Nombre: Fabian hernandez

1. ¿Cuáles son los tres elementos básicos contenidos dentro del cráneo?

A) Músculos, huesos y nervios
B) Masa cerebral, vasos sanguíneos y líquido cefalorraquídeo
C) Piel, tejido subcutáneo y vasos linfáticos
D) Cerebelo, médula espinal y nervios periféricos

2. ¿Cuál es el valor mínimo de presión arterial media (PAM) necesario para mantener una adecuada perfusión cerebral?

A) 70 mmHg
B) 100 mmHg
C) 90 mmHg
D) 60 mmHg

3. En un paciente con trauma craneoencefálico (TCE), ¿qué hallazgo pupilar debe considerarse un signo de posible hernia cerebral?

A) Pupilas reactivas y simétricas
B) Pupilas isocóricas con reflejo normal
C) Pupila fija o no reactiva (unilateral o bilateral)
D) Midriasis bilateral reactiva

4. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una de las complicaciones más frecuentes en el manejo del paciente traumatizado?

A) Falla en el manejo de la vía aérea
B) Hipoglucemia
C) Deshidratación
D) Infección nosocomia

5. Cuál es la importancia principal del manejo adecuado del trauma craneoencefálico en el ámbito prehospitalario?

A) Reducir el costo del tratamiento hospitalario
B) Evitar el traslado del paciente
C) Disminuir las lesiones secundarias y su impacto en el paciente
D) Aumentar la rapidez del diagnóstico definitivo