



INFORME DE CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Institución Educativa Primitivo leal– Sabaneta
Fecha del informe: 23/5/2026

1. Introducción

El presente informe detalla las acciones realizadas en el marco del plan de Control y Manejo Integrado de Plagas (CMIP) en la Institución Educativa Primitivo leal ubicado en el municipio de Sabaneta, con el objetivo de identificar, intervenir y mitigar la presencia de plagas que representen un riesgo para la salud de la comunidad educativa y afecten las condiciones de salubridad del entorno.

2. Hallazgos

Durante la inspección y monitoreo de las instalaciones de la institución, se identificaron los siguientes hallazgos relevantes:

- **Presencia de roedores:** Se encontró evidencia de actividad de roedores (rastros, excrementos y madrigueras)
- **Presencia de mosquitos:** Se identificó proliferación de mosquitos en áreas con acumulación de agua, especialmente en sectores con vegetación densa y contenedores expuestos a la intemperie.
- **Cucarachas:** No se evidenció presencia de cucarachas durante el proceso de inspección.
- **Hormigas:** Actividad notable en cuartos de corredores.

Fumigaciones el cazador nit. 900974881-6

(604) 3227983 304545042
admfumigacioneselcazador@gmail.com
fumigacioneselcazador@gmail.com
Cra 42c 56b sur 35 int. 202
Sabaneta-Antioquia-Colombia

fumigacioneselcazador.com.co

@fumigacioneselcazador

fumigacioneselcazador

5. Conclusiones

El desarrollo del plan de control permitió mitigar significativamente la actividad de roedores y reducir los focos de proliferación de mosquitos. No se presentó evidencia de cucarachas. Se recomienda continuar con un enfoque preventivo y educativo para garantizar un entorno saludable y seguro en la institución.

6. Anexos



[Handwritten signature]
Rector

Fumigaciones el cazador nit. 900974881-6

(604) 3227983 304545042
admfumigacioneselcazador@gmail.com
fumigacioneselcazador@gmail.com
Cra 42c 56b sur 35 int. 202
Sabaneta-Antioquia-Colombia

 fumigacioneselcazador.com.co

 @fumigacioneselcazador

 fumigacioneselcazador



RASTOP

Seguro y efectivo en una sola dosis

Rastop, es un efectivo rodenticida monodósico de segunda generación, formulado con Bromadiolona como ingrediente activo, el cual presenta un excelente grado de control y un alto grado de seguridad para animales no objetivos y animales domésticos.

Rastop, es efectivo en una sola dosis, mata todo tipo de ratas y ratones, urbanos y silvestres al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.



Rastop mata a los roedores en pocos días, sin producir rechazos en la colonia. Ya que posee una fórmula muy apetecida, debido a su atractivo olor, sabor y textura siendo por ello el raticida de mejor y más rápida aceptación entre los roedores.

Rastop se encuentra formulado como **Bloques**, **Mini Bloques**, **Pellets**, **Molienda** y **Pasta**. Posee además benzoato de denatonio, una sustancia amargante que evita la ingesta humana accidental.

► RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar en lugares donde observa presencia o tránsito de roedores.

- **USO:** Casas, edificios, hoteles, hospitales, restaurantes, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.
- **LUGAR:** Interiores y exteriores de instalaciones afectadas.

► MODO DE ACCION

Rastop es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protrombina, generando el control de los roedores que lo consumen en un período de 2 a 3 días posterior al consumo.

► DOSIS

RASTOP Pellet: Para uso en *Interiores*

Uso	Lugar	Dosis
Casas, edificios, hoteles, hospitales, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.	Interiores: cocinas, lavaderos, entretechos, bodegas, despensas o lugares resguardados.	Ratas: 2 - 4 sachet de 10 g. cada 5 - 10 metros lineales. Ratones: 2 sachet de 10 g. cada 2 - 5 metros lineales.



RASTOP Bloque - Minibloque: Para uso en *Exteriores*

Uso	Lugar	Dosis
Casas, edificios, hoteles, hospitales, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.	Exteriores como: desagües, alcantarillas, canaletas, subterráneos, acequias, canales, tanques, orillas de río, lagunas y otros.	Ratas: 1 - 2 bloques o 2 - 4 minibloques cada 5 - 10 metros lineales. Ratones: 1 bloque o 2 minibloques cada 2 - 5 metros lineales.

RASTOP Pasta: Para uso en *Interiores y Exteriores*, con alta oferta de alimentos

Uso	Lugar	Dosis
Casas, edificios, hoteles, hospitales, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.	Interiores y exteriores como: desagües, alcantarillas, canaletas, subterráneos, acequias, canales, tanques, orillas de río, lagunas y otros.	Ratas: 2 - 4 sachet de 10 g. cada 5 - 10 metros lineales. Ratones: 2 sachet de 10 g. cada 2 - 5 metros lineales.

RASTOP Molienda: Uso *Interior* con alta oferta de alimentos alternativos

Uso	Lugar	Dosis
Casas, edificios, hoteles, hospitales, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.	Interiores: cocinas, lavaderos, entretechos, bodegas, despensas o lugares resguardados.	Ratas: 1 - 2 sachet de 20 g. cada 5 - 10 metros lineales. Ratones: 1 sachet de 20 g. cada 2 - 5 metros lineales.

RASTOP

Composición	Bromadiolona 0,005% + Benzoato de Denatonio			
Formatos	Pasta	Bloque	Molienda	Pellet
Registro ISP	P-598/16	P-89/19	P-446/16	P-729/15
Clase Toxicológica	Clase III OMS		Clase IV OMS	

TENOPA®

Insecticida piretroide de amplio espectro

Registros

Licencia de Venta ICA No. 7329-MV

Registro Salud Pública: RGSP-173-2002

COMPOSICION GARANTIZADA

Ingrediente activo:.....Alfacipermetrina + Flufenoxuron

Concentración:30g/L + 30g/L

Formulación:Suspension Concentrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TENOPA SC se aplica por el sistema aspersión previa dilución en agua, con equipos convencionales de aspersión, teniendo precaución de cubrir espacios de difícil acceso y grietas donde habitan o circulan los insectos; a las siguientes dosis:

Control	Dilución	Area a tratar	Dosis (mg i.a. / m ²)
Ataque	10 ml / L	20 m ²	15 / 15
Mantenimiento	5 ml / L	20 m ²	7.5 / 7.5

TENOPA SC es un insecticida de baja toxicidad para las especies benéficas, para las aves y para los mamíferos y se degrada biológicamente con bastante facilidad en el ambiente. Alfacipermetrina es tóxica para los peces, mientras que el componente Flufenoxuron regulador del crecimiento solo tiene efecto sobre los insectos, sin ocasionar daños a mamíferos.

El producto debe usarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Ideal para el manejo estratégico de la resistencia a los insecticidas



TENOPA®

Manejo Integral

El óptimo control de las plagas incluye además de su efectiva eliminación con fumigaciones profesionalmente ejecutadas, acciones de mejoramiento ambiental para eliminar sus criaderos y actividades de saneamiento para limitar su acostumbrada capacidad de proliferación.

Las fumigaciones como única estrategia de control, conducirán a una segura recuperación de la población de los insectos plaga.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfono 01 8000 916012 ó (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Servicio integral al cliente BASF 018000 52227306 (1) 6342020.
Titular del Registro: BASF Química Colombiana S.A.



- Entregue el envase vacío y con triple lavado en los sitios autorizados por el programa de campo limpio de recolección de la cámara procutivos de la ANDI.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Banda Azul - CATEGORIA TOXICOLOGICA III: Medianamente tóxico

Calle 99 N° 69 C 32 PBX: 6322260- Bogotá D. C. Colombia



INFORME DE CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Institución Educativa Primitivo leal– Sabaneta
Fecha del informe: 6/6/2026

1. Introducción

El presente informe detalla las acciones realizadas en el marco del plan de Control y Manejo Integrado de Plagas (CMIP) en la Institución Educativa Primitivo leal ubicado en el municipio de Sabaneta, con el objetivo de identificar, intervenir y mitigar la presencia de plagas que representen un riesgo para la salud de la comunidad educativa y afecten las condiciones de salubridad del entorno.

2. Hallazgos

Durante la inspección y monitoreo de las instalaciones de la institución, se identificaron los siguientes hallazgos relevantes:

- **Presencia de roedores:** Se encontró evidencia de actividad de roedores (rastros, excrementos y madrigueras)
- **Presencia de mosquitos:** Se identificó proliferación de mosquitos en áreas con acumulación de agua, especialmente en sectores con vegetación densa y contenedores expuestos a la intemperie.
- **Cucarachas:** Se evidenció presencia de cucarachas durante el proceso de inspección.
- **Hormigas:** Actividad notable en cuartos de corredores.

Fumigaciones el cazador nit. 900974881-6

(604) 3227983 304545042
admfumigacioneselcazador@gmail.com
fumigacioneselcazador@gmail.com
Cra 42c 56b sur 35 int. 202
Sabaneta-Antioquia-Colombia

fumigacioneselcazador.com.co

@fumigacioneselcazador

fumigacioneselcazador

3. Acciones Realizadas

En cumplimiento del protocolo de Manejo Integrado de Plagas, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

3.1 Control de roedores:

- Instalación de estaciones cebaderas en puntos estratégicos de la zona verde.
- Eliminación de refugios potenciales (maleza densa, acumulación de materiales y escombros).
- Revisión y reforzamiento de cerramientos para evitar el ingreso de roedores a zonas internas.

3.2 Control de mosquitos:

- Drenaje de aguas estancadas y limpieza de canales de desagüe.
- Aplicación de larvicidas biológicos en áreas susceptibles a criaderos.
- Sensibilización a la comunidad educativa sobre la importancia de mantener secos los recipientes expuestos.

4. Recomendaciones


- Mantener un programa mensual de monitoreo y control preventivo.
- Reforzar labores de poda y mantenimiento de zonas verdes.
- Realizar campañas educativas sobre prevención de plagas y correcta disposición de residuos.

Fumigaciones el cazador nit. 900974881-6

5. Conclusiones

El desarrollo del plan de control permitió mitigar significativamente la actividad de roedores y reducir los focos de proliferación de mosquitos. No se presentó evidencia de cucarachas. Se recomienda continuar con un enfoque preventivo y educativo para garantizar un entorno saludable y seguro en la institución.

6. Anexos





Fumigaciones el cazador nit. 900974881-6

(604) 3227983 304545042
admfumigacioneselcazador@gmail.com
fumigacioneselcazador@gmail.com
Cra 42c 56b sur 35 int. 202
Sabaneta-Antioquia-Colombia

fumigacioneselcazador.com.co

@fumigacioneselcazador

fumigacioneselcazador



Rector

Fumigaciones el cazador nit. 900974881-6

(604) 3227983 304545042
admfumigacioneselcazador@gmail.com
fumigacioneselcazador@gmail.com
Cra 42c 56b sur 35 int. 202
Sabaneta-Antioquia-Colombia

fumigacioneselcazador.com.co

@fumigacioneselcazador

fumigacioneselcazador

FICHA TÉCNICA
ATONIT
5 EC®

Insecticida Piretroide

Concentrado Emulsionable (EC)

Registro para uso en Salud Pública: RGSP 198-2003

Concepto Toxicológico: MP-13398-2003

Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Tipo: Insecticida

Ingrediente activo: Lambdacihalotrina

Grupo Químico: Piretroide

Concentración: 5 %

Modo de acción: Por contacto e ingestión.

Categoría toxicológica: Cat. III

Presentación: Envase de 1 L

Fórmula:

Cada Litro de producto contiene:

Lambdacihalotrina..... 50 g

Excipientes c.s.p. 1 L

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

ATONIT 5EC® es un potente y eficaz insecticida piretroide de cuarta generación. Su excepcional perfil insecticida lo hacen ideal para tratamientos de choque, en recintos con alta carga de insectos. La forma física de la lambdacihalotrina, así como su estructura química, le confieren una alta potencia insecticida, haciéndolo un producto de primera elección para el control de todo tipo de insectos rastreros y voladores como cucarachas, hormigas, moscas, zancudos, polillas, gorgojos, termitas, pulgas y arañas y garrapatas, entre otros.

ATONIT 5EC® está formulado con una mezcla de refinados excipientes, lo que favorece su efecto de derribo (knock down), su efecto expulsivo inmediato (flushing out) y, por sobre todo, su prolongado efecto residual, tanto en aplicaciones en interiores como en exteriores.

Es un producto ideal para el establecimiento de programas de Control Integrado de Plagas, en edificios, explotaciones pecuarias, instalaciones de industrias alimenticias, bodegas, plantas agroindustriales, zonas turísticas, salud pública y domésticas, en general.

BENEFICIOS:

- Efectivo insecticida de amplio espectro de acción.
- Posee un notable efecto expulsivo y de volteo.
- Con excelente persistencia en las zonas tratadas.
- Presenta un amplio rango de seguridad para el hombre y animales de sangre caliente.
- No se acumula en el medio ambiente.
- Su principal acción es sobre estados inmaduros y adultos.

RECOMENDACIONES DE USO:

ATONIT 5EC® actúa por contacto e ingestión, alterando el paso de los iones de sodio y potasio a nivel de la pared celular de las neuronas. Este mecanismo genera una hiperactividad que provoca la inmovilidad y la muerte de los insectos expuestos.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Tipo de aplicación	Plaga	Área de aplicación	Dosis
Aspersión manual o a motor	Insectos Voladores	Interior	4 – 6 cc en 1 L de agua para 20 m ²
		Exterior	6 cc en 1 L de agua para 20 m ²
	Insectos Rastreros	Interior	6 – 8 cc en 1 L de agua para 20 m ²
		Exterior	8 cc en 1 L de agua para 20 m ²
Termonebulización, Nebulización Ultra bajo Volumen	Todo tipo de insectos rastreros y voladores	Interior	15 cc en 1 L de agua, kerosene o aceite mineral para 1.000 m ³
		Exterior	20 cc en 1 L de agua, kerosene o aceite mineral para 10.000 m ²

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:

- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protección facial completa o de nariz y boca, gafas y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua, ni insectos benéficos.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Mantenga el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez ocupado todo el producto, realice triple lavado del envase, perforélo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones vigentes.

- Para aplicaciones en exteriores evite contaminar fuentes de agua con el producto o sus residuos, respetando una franja de seguridad mínimo de 10 metros

ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo cerca de alimentos o medicamentos. Manéjese con cuidado para evitar derrames, si ello ocurre cúbralo con algún material absorbente y luego elimínelo según la legislación vigente.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

Síntomas de intoxicación:

De ocurrir algún malestar o algún signo de intoxicación durante la aplicación, el operario debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.

De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, se pueden presentar síntomas de intoxicación no específicos tales como: náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea, irritación ocular y dificultad respiratoria; frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto.

Primeros Auxilios:

- En caso de ingestión: No provoque el vómito, ya que este producto posee solventes que pueden irritar las vías digestivas. Dé carbón activado y diríjase a un centro asistencial, procurando llevar la etiqueta de este producto.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada y lave la zona afectada con agua y jabón, procurando un buen lavado. Este producto puede generar reacciones alérgicas.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.
- En caso de inhalación: saque a la persona afectada al aire libre.

ANTÍDOTO:

No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático bajo supervisión médica.

- Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación.
- ATONIT 5EC® disponible en presentación de frasco x 1 L
- Efectúe triple lavado a los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org
- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Importado y Distribuido por:

Anasac Colombia Ltda - Sanidad Ambiental
Km 3,5 vía Bogotá - Siberia Centro Empresarial Metropolitano,
Modulo 2. Bodega 40
Tels: PBX (57) (1) 821 90 39.
Cota - Cundinamarca - Colombia
www.anasac.com.co

Formulado por:

AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)
Camino Noviciado Norte, lote 73-B. Lampa, Chile
Tel: +562-24706800 – Fax: +562-24869100
www.anasac.cl

- El presente documento, anula versiones anteriores.