Evaluación Shock Hipovolemico

29-05-2026

Nombre: Juan Abello

1. **¿Cuáles son los dos grandes grupos en los que se clasifica el choque hipovolémico según el sistema comprometido?**

   A) Choque cardiogénico y distributivo
   B) Choque hemorrágico y choque por deshidratación
   C) Choque séptico y anafiláctico
   D) Choque obstructivo y neurogénico

2. **¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del equipo necesario para la atención inicial del choque hipovolémico en el ámbito prehospitalario?**

   A) Tensiómetro
   B) Termómetro ambiental
   C) Estetoscopio fetal
   D) Martillo de reflejos

3. **¿Qué debe hacerse con los pacientes cuya hemorragia no puede ser contenida en el lugar de atención primaria debido a su localización?**

   A) Mantenerlos en observación hasta estabilización espontánea
   B) Administrar líquidos únicamente y esperar respuesta
   C) Trasladarlos de forma precoz para manejo quirúrgico
   D) Iniciar tratamiento antibiótico inmediato

4. **¿Cuál es el objetivo principal de la cirugía de "control de daño" en el manejo del paciente con hemorragia?**

   A) Realizar una corrección anatómica completa inmediata
   B) Contener rápidamente el sangrado con medidas temporales
   C) Administrar tratamiento farmacológico prolongado
   D) Evitar cualquier intervención quirúrgica

5. **¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una de las medidas que más mejora la supervivencia en el manejo del choque hipovolémico en el contexto extrahospitalario?**

   A)Administración exclusiva de analgésicos antes del traslado
   B) Reanimación hipotensiva y reanimación hemostática según indicación
   C) Esperar la confirmación diagnóstica antes de cualquier intervención
   D) Uso de antibióticos de amplio espectro de forma rutinaria

Scanned with CamScanner

Evaluación Shock Hipovolemico

29-05-2026

Nombre: Yuliana Andrea Colorado Ortiz

1. **¿Cuáles son los dos grandes grupos en los que se clasifica el choque hipovolémico según el sistema comprometido?**

   A) Choque cardiogénico y distributivo
   X) Choque hemorrágico y choque por deshidratación
   C) Choque séptico y anafiláctico
   D) Choque obstructivo y neurogénico

2. **¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del equipo necesario para la atención inicial del choque hipovolémico en el ámbito prehospitalario?**

   X) Tensiómetro
   B) Termómetro ambiental
   C) Estetoscopio fetal
   D) Martillo de reflejos

3. **¿Qué debe hacerse con los pacientes cuya hemorragia no puede ser contenida en el lugar de atención primaria debido a su localización?**

   A) Mantenerlos en observación hasta estabilización espontánea
   B) Administrar líquidos únicamente y esperar respuesta
   X) Trasladarlos de forma precoz para manejo quirúrgico
   D) Iniciar tratamiento antibiótico inmediato

4. **¿Cuál es el objetivo principal de la cirugía de "control de daño" en el manejo del paciente con hemorragia?**

   A) Realizar una corrección anatómica completa inmediata
   X) Contener rápidamente el sangrado con medidas temporales
   C) Administrar tratamiento farmacológico prolongado
   D) Evitar cualquier intervención quirúrgica

5. **¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una de las medidas que más mejora la supervivencia en el manejo del choque hipovolémico en el contexto extrahospitalario?**

   A)Administración exclusiva de analgésicos antes del traslado
   X) Reanimación hipotensiva y reanimación hemostática según indicación
   C) Esperar la confirmación diagnóstica antes de cualquier intervención
   D) Uso de antibióticos de amplio espectro de forma rutinaria

Scanned with CamScanner

Evaluación Shock Hipovolemico

29-05-2026

Nombre: Hebert Junior Cuadalpud Peña

1. **¿Cuáles son los dos grandes grupos en los que se clasifica el choque hipovolémico según el sistema comprometido?**

   A) Choque cardiogénico y distributivo
   B) Choque hemorrágico y choque por deshidratación
   C) Choque séptico y anafiláctico
   D) Choque obstructivo y neurogénico

2. **¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del equipo necesario para la atención inicial del choque hipovolémico en el ámbito prehospitalario?**

   A) Tensiómetro
   B) Termómetro ambiental
   C) Estetoscopio fetal
   D) Martillo de reflejos

3. **¿Qué debe hacerse con los pacientes cuya hemorragia no puede ser contenida en el lugar de atención primaria debido a su localización?**

   A) Mantenerlos en observación hasta estabilización espontánea
   B) Administrar líquidos únicamente y esperar respuesta
   C) Trasladarlos de forma precoz para manejo quirúrgico
   D) Iniciar tratamiento antibiótico inmediato

4. **¿Cuál es el objetivo principal de la cirugía de "control de daño" en el manejo del paciente con hemorragia?**

   A) Realizar una corrección anatómica completa inmediata
   B) Contener rápidamente el sangrado con medidas temporales
   C) Administrar tratamiento farmacológico prolongado
   D) Evitar cualquier intervención quirúrgica

5. **¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una de las medidas que más mejora la supervivencia en el manejo del choque hipovolémico en el contexto extrahospitalario?**

   A) Administración exclusiva de analgésicos antes del traslado
   B) Reanimación hipotensiva y reanimación hemostática según indicación
   C) Esperar la confirmación diagnóstica antes de cualquier intervención
   D) Uso de antibióticos de amplio espectro de forma rutinaria

Scanned with CamScanner

Evaluación Shock Hipovolemico

29-05-2026

Nombre: Jimy 1. 0510

1. **¿Cuáles son los dos grandes grupos en los que se clasifica el choque hipovolémico según el sistema comprometido?**

   A) Choque cardiogénico y distributivo
   B) Choque hemorrágico y choque por deshidratación
   C) Choque séptico y anafiláctico
   D) Choque obstructivo y neurogénico

2. **¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del equipo necesario para la atención inicial del choque hipovolémico en el ámbito prehospitalario?**

   A) Tensiómetro
   B) Termómetro ambiental
   C) Estetoscopio fetal
   D) Martillo de reflejos

3. **¿Qué debe hacerse con los pacientes cuya hemorragia no puede ser contenida en el lugar de atención primaria debido a su localización?**

   A) Mantenerlos en observación hasta estabilización espontánea
   B) Administrar líquidos únicamente y esperar respuesta
   C) Trasladarlos de forma precoz para manejo quirúrgico
   D) Iniciar tratamiento antibiótico inmediato

4. **¿Cuál es el objetivo principal de la cirugía de "control de daño" en el manejo del paciente con hemorragia?**

   A) Realizar una corrección anatómica completa inmediata
   B) Contener rápidamente el sangrado con medidas temporales
   C) Administrar tratamiento farmacológico prolongado
   D) Evitar cualquier intervención quirúrgica

5. **¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una de las medidas que más mejora la supervivencia en el manejo del choque hipovolémico en el contexto extrahospitalario?**

   A)Administración exclusiva de analgésicos antes del traslado
   B) Reanimación hipotensiva y reanimación hemostática según indicación
   C) Esperar la confirmación diagnóstica antes de cualquier intervención
   D) Uso de antibióticos de amplio espectro de forma rutinaria

Scanned with CamScanner

Evaluación Shock Hipovolemico

29-05-2026

Nombre: Paola Andrea Tascón

1. **¿Cuáles son los dos grandes grupos en los que se clasifica el choque hipovolémico según el sistema comprometido?**

   A) Choque cardiogénico y distributivo
   B) Choque hemorrágico y choque por deshidratación
   C) Choque séptico y anafiláctico
   D) Choque obstructivo y neurogénico

2. **¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del equipo necesario para la atención inicial del choque hipovolémico en el ámbito prehospitalario?**

   A) Tensiómetro
   B) Termómetro ambiental
   C) Estetoscopio fetal
   D) Martillo de reflejos

3. **¿Qué debe hacerse con los pacientes cuya hemorragia no puede ser contenida en el lugar de atención primaria debido a su localización?**

   A) Mantenerlos en observación hasta estabilización espontánea
   B) Administrar líquidos únicamente y esperar respuesta
   C) Trasladarlos de forma precoz para manejo quirúrgico
   D) Iniciar tratamiento antibiótico inmediato

4. **¿Cuál es el objetivo principal de la cirugía de "control de daño" en el manejo del paciente con hemorragia?**

   A) Realizar una corrección anatómica completa inmediata
   B) Contener rápidamente el sangrado con medidas temporales
   C) Administrar tratamiento farmacológico prolongado
   D) Evitar cualquier intervención quirúrgica

5. **¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una de las medidas que más mejora la supervivencia en el manejo del choque hipovolémico en el contexto extrahospitalario?**

   A)Administración exclusiva de analgésicos antes del traslado
   B) Reanimación hipotensiva y reanimación hemostática según indicación
   C) Esperar la confirmación diagnóstica antes de cualquier intervención
   D) Uso de antibióticos de amplio espectro de forma rutinaria

Scanned with CamScanner

Evaluación Shock Hipovolemico

29-05-2026

Nombre: Alexander Vargas

1. **¿Cuáles son los dos grandes grupos en los que se clasifica el choque hipovolémico según el sistema comprometido?**

   A) Choque cardiogénico y distributivo
   B) Choque hemorrágico y choque por deshidratación
   C) Choque séptico y anafiláctico
   D) Choque obstructivo y neurogénico

2. **¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del equipo necesario para la atención inicial del choque hipovolémico en el ámbito prehospitalario?**

   A) Tensiómetro
   B) Termómetro ambiental
   C) Estetoscopio fetal
   D) Martillo de reflejos

3. **¿Qué debe hacerse con los pacientes cuya hemorragia no puede ser contenida en el lugar de atención primaria debido a su localización?**

   A) Mantenerlos en observación hasta estabilización espontánea
   B) Administrar líquidos únicamente y esperar respuesta
   C) Trasladarlos de forma precoz para manejo quirúrgico
   D) Iniciar tratamiento antibiótico inmediato

4. **¿Cuál es el objetivo principal de la cirugía de "control de daño" en el manejo del paciente con hemorragia?**

   A) Realizar una corrección anatómica completa inmediata
   B) Contener rápidamente el sangrado con medidas temporales
   C) Administrar tratamiento farmacológico prolongado
   D) Evitar cualquier intervención quirúrgica

5. **¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una de las medidas que más mejora la supervivencia en el manejo del choque hipovolémico en el contexto extrahospitalario?**

   A)Administración exclusiva de analgésicos antes del traslado
   B) Reanimación hipotensiva y reanimación hemostática según indicación
   C) Esperar la confirmación diagnóstica antes de cualquier intervención
   D) Uso de antibióticos de amplio espectro de forma rutinaria

Scanned with CamScanner