ACTA DE REUNION

MUNICIPIO DE RICAURTE		
Actividad # 08	Fecha de realización: 01 al 30 de junio 2026	Hora: 8:00 A.M 4:00 P.M
Tema tratado Educaciones, Promoción y Prevención Leishmaniasis y Enfermedad de Chagas		
Grupo beneficiario: ZONA URBANA		
Lugar	# Población programada	# Población cubierta:
ZONA URBANA	20	19

Objetivo General	"Realizar acciones de Información a las las familias visitadas, con el fín de promover la salud y la cultura de autocuidado para la detección temprana de riesgos asociados a : *Enfermedades prevalentes de la infancia enfocado AIEPI, materno-perinatal , salud ambiental (enfermedades zoonoticas y enfermedades transmitidas por vectores como dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, chagas, leishmaniasis), salud mental y convivencia social, sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, vida saludable, enfermedades transmisibles, salud en el entorno laboral, gestión diferencial de las poblaciones vulnerables acerca de deberes y derechos en salud. (Indígenas, - Negros, Afrodescendientes, Raizales palanqueros-NARP, y RrOM o gitanos, discapacidad, víctimas del conflicto armado, desmovilizados, reinsertados, migrante), promoción de la vacunación en la población objeto del programa ampliado de inmunizaciones – PAI y demás riesgos identificados en el microterritorio. "		
Objetivos Específicos	Fomentar prácticas de autocuidado y detección temprana. Brindar información a la comunidad sobre medidas preventivas frente a enfermedades transmisibles.		
Recursos Utilizados	Técnicos	Humanos AUXILIAR DE ENFERMERIA	Material tablet
Descripción Detallada del Desarrollo de La actividad	**La leishmaniasis** es una enfermedad parasitaria causada por protozoos del género Leishmania y transmitida por la picadura de insectos flebótomos hembra (conocidos popularmente como Jejenes, toritos o mosquitos palha). A nivel global, se manifiesta en tres formas principales: cutánea (la más común, con úlceras en la piel), muco cutánea y visceral (la más grave		

ACTA DE REUNION

Potencialmente mortal).Formas clínicas de la enfermedad-Leishmaniasis cutánea: Es la variante más frecuente. Se caracteriza por la aparición de llagas o úlceras indoloras en la piel en el lugar de la picadura, las cuales pueden tardar meses en sanar y dejar cicatrices permanentes. Leishmaniasis muco cutánea: Ocurre cuando el parásito se propaga y daña las membranas mucosas de la nariz, la boca y la garganta, causando lesiones des figurantes.

Leishmaniasis visceral: Es la forma más grave. Los parásitos afectan órganos internos como el bazo, el hígado y la médula ósea. Sin el tratamiento oportuno, suele ser mortal. Sus síntomas incluyen fiebre prolongada, pérdida de peso, agrandamiento del abdomen y anemia.

La infección no se transmite de persona a persona ni directamente por animales domésticos, sino exclusivamente a través de la picadura del insecto vector. El mosquito adquiere el parásito al picar a mamíferos infectados (como roedores o perros) y luego lo inocula en humanos. Para prevenir la enfermedad,

Las recomendaciones principales incluyen: Protección personal: Uso de repelentes contra insectos (especialmente los que contienen DEET) y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo.

Uso de barreras: Instalar mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas, y dormir bajo toldillos impregnados con insecticida.

Control del entorno: Mantener limpios los patios y alrededores de las viviendas para evitar que el mosquito se reproduzca en materia orgánica en descomposición.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico se confirma mediante pruebas de laboratorio que pueden incluir frotis directos de las lesiones, cultivos o pruebas moleculares como la PCR. El tratamiento varía según el tipo de leishmaniasis, la especie del parásito y la región geográfica. Suele consistir en terapias antiparasitarias específicas, y en los casos viscerales, medicamentos como la anfotericina liposoma son la primera línea de defensa Recomendada

ACTA DE REUNION

De igual manera entre las enfermedades zoonoticas y que se trasmiten por medio de vectores encontramos:

La enfermedad de Chagas (o tripanosomiasis americana) es una infección potencialmente mortal causada por el parásito Tripanosoma cruzi. Se transmite principalmente a través de las heces de insectos infectados (conocidos como vinchucas, pitos o chinches besuconas), pero también por transfusiones de sangre, de madre a hijo durante el embarazo o por alimentos contaminados.

Síntomas y fases

Es conocida como "la enfermedad silenciosa" ya que puede no presentar síntomas durante años.

Fase aguda: Ocurre semanas o meses después de la infección. Puede causar fiebre, dolor de cabeza, fatiga e inflamación cerca del lugar de la picadura (como el signo de Romaña, que es el párpado hinchado).

Fase crónica: Si no se trata, el parásito se aloja en el corazón y el sistema digestivo. Puede provocar arritmias, insuficiencia cardíaca, agrandamiento del esófago (megasófago) o del colon (megacolon).

Prevención Las medidas principales incluyen el control de los insectos transmisores (fumigación y mejora de las viviendas), análisis de sangre antes de transfusiones, tamizaje en mujeres embarazadas y buena higiene al preparar los alimentos. Si resides en un país endémico y crees haber estado expuesto, acude a tu centro de salud local para realizarte una prueba de sangre rápida.

DENGUE

El dengue es una infección viral transmitida a los humanos por la picadura de mosquitos infectados (principalmente Aedes aegypti). Se manifiesta con síntomas que van desde una fiebre

ACTA DE REUNION


leve hasta episodios incapacitantes, acompañados de dolor intenso, y es particularmente común en climas tropicales y subtropicales. Síntomas Principales Los signos suelen aparecer entre 4 y 10 días después de la picadura y duran aproximadamente una semana: Fiebre alta y repentina (hasta Dolor de cabeza intenso y dolor detrás de los ojos. Dolores musculares, articulares y óseos. Náuseas, vómitos y aparición de sarpullido. Signos de Alarma (Atención Médica Inmediata)En algunos casos, la enfermedad puede progresar a dengue grave, una complicación potencialmente mortal. Debe buscar atención médica de urgencia si presenta: Dolor abdominal intenso y continuo. Vómitos persistentes o diarrea. Sangrado en encías o nariz, o aparición de moretones. Fatiga extrema, inquietud o irritabilidad. Prevención y Tratamiento No existe un medicamento antiviral específico para curar el dengue, por lo que el tratamiento se centra en el alivio de los síntomas. Evite la automedicación! No tome ibuprofeno ni aspirina, ya que aumentan el riesgo de hemorragias. Control del mosquito: La principal medida preventiva es eliminar los criaderos de mosquitos en el hogar,

evitando la acumulación de agua estancada en llantas, baldes, floreros y otros recipientes. Para más información detallada oguías de atención sanitaria, puede consultar las directrices oficiales del Ministerio de Salud de Colombia o el portal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



ACTA DE REUNION

Hallazgos y Conclusiones	Durante el recorrido se hayo a dos menores de edad sin controles al día el cual se realizó su cambio de IPS primaria para poder poner al día los menores de edad en cuanto su ciclo de vida.	
Aportes y Sugerencias	Involucrar a líderes locales y juntas de acción comunal para mayor participación comunitaria. Uso de tecnologías y redes sociales: Crear contenido educativo digital en formato corto y atractivo, especialmente para jóvenes y adolescentes. Capacitación constante al personal de salud: Es importante actualizar los contenidos educativos y estrategias pedagógicas.	
Material anexo	Presentación en Power Point	
	Registro Fotográfico	x
	Convocatoria	
	Listado de Asistencia	x
	Videos	
	Otros ¿cuál?	



ANDREA WALTERO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
Municipio de Ricaurte



ANDREA CAROLINA CORDOBA
Cargo COORDINADORA PIC ESE CENTRO DE RICAURTE
Municipio de Ricaurte



ZULMA JASLEYDI JAUREGUI
Jefe Enfermera PIC Municipio de Ricaurte

ACTA DE REUNION

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vie, 26 de jun. de 2026 · 5:34 p.m.



Vie, 26 de jun. de 2026 · 5:12 p.m.



Jue, 25 de jun. de 2026 · 4:27 p.m.