PROTOCOLO PARA LIMPIEZA DE BOLSAS DE ALIMENTACIÓN ENTERAL

1. Realice el adecuado lavado de manos de acuerdo al protocolo establecido



2. Aliste los elementos a utilizar: bolsa de alimentación enteral, jabón líquido neutro, solución desinfectante a partir de amonio cuaternario, jarra con agua potable y jeringa de irrigación.




3. Adicione media cucharadita de **jabón líquido y 100 mL de agua** a la bolsa para realizar el proceso de limpieza, suavemente mueva el agua del interior hasta retirar los residuos de alimento, **expulsar el contenido a través de la manguera**. Repetir el proceso de ser necesario




4. **Enjuague 3 veces** la bolsa de alimentación enteral con abundante agua potable, para eliminar los residuos de jabón líquido.



5. **Adicione 100 cc del desinfectante a la bolsa.** Deje actuar la solución durante 5 minutos



6. **Enjuague 3 veces** la bolsa de alimentación enteral con abundante agua potable, para eliminar los residuos de desinfectante líquido, deje secar y guarde la bolsa en un recipiente con tapa.



BOGOTÁ

Repita el mismo proceso con la jeringa de que se utiliza para la irrigación de la sonda de gastrostomía, para lo cual, la única variación será el uso de 10 mL de desinfectante

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


Elaboró N.D. Cesar Vargas

RECOMENDACIONES DE CUIDADO DE LA BOLSA DE ALIMENTACIÓN ENTERAL

1. Para su almacenamiento, utilizar un recipiente con tapa, preferiblemente de dimensiones de 20 cm x 30 cm x 10 cm



2. Al momento de almacenar, es posible doblar el cuerpo de la bolsa, pero la parte que conecta la bolsa con la manguera debe quedar derecha, tal y como se aprecia en la imagen.



La manguera se puede enrollar, siempre y cuando permanezca recta la parte que conecta con la bolsa

3. Realizar el proceso de limpieza y desinfección tan pronto termine el proceso de alimentación



BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Elaboró N.D. Cesar Vargas